

الامتحان الوطني الموحد للمكوريا

الدورة الاستدراكية 2018

-الموضوع-

RS36

٨٠٥٣٦٢٠١٩٠٣٢٤٠٤١ | ٢٠١٤٠٤١ | ٢٠١٤٠٣٢٤ | ٢٠١٤٠٣٢٥
٨٠٣٤٤٧٠٣٩٣٨٠ | ٨٠٣٤٤٧٠٣٩٣٩٠ | ٨٠٣٤٤٧٠٣٩٣٩٠ | ٨٠٣٤٤٧٠٣٩٣٩٠



المملكة المغربية
وزارة التربية الابتدائية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقدير والامتحانات
والتجييز

2

مدة الإنجاز

علوم الحياة والأرض

المادة

3

المعامل

شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية (أ)

الشعبة أو المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة
المكون الأول: استرداد المعرف (5 نقط)

I- أجب (أجب) على ورقة تحريرك عن الأسئلة الآتية :

أ - عرف (ي) المصطلحين الآتيين: الإخصاب - التهجين. (1 ن)

ب - أذكّر (ي) دورين للانقسام الاختزالي في نقل الخبر الوراثي أثناء التوالد الجنسي. (0.5 ن)

ج - أذكّر (ي) مضمون القانون الثالث لـ Mendel. (0.5 ن)

II- يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4.

أنقل (ي) الأزواج الآتية على ورقة تحريرك ثم اكتب (ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراب الصحيح. (2 ن)

(1,) (2,) (3,) (4,)

3- في حالة تزاوج اختباري، نزاج فرداً ذا مظهر خارجي سائد والذى نريد تعرّف نمطه الوراثي مع :
أ - فرد متشابه الاقتران ذي مظهر خارجي سائد؛
ب - فرد متشابه الاقتران ذي مظهر خارجي متّجّ؛
ج - فرد مختلف الاقتران ذي مظهر خارجي سائد؛
د - فرد مختلف الاقتران ذي مظهر خارجي متّجّ.

1 - خلال المرحلة G_1 من طور السكون الذي يسبق الانقسام الاختزالي، يكون كل صبغي مكوناً من:
أ - صبغي واحد ملولب؛
ب - صبغي واحد غير ملولب؛
ج - صبيغيين غير ملولبين؛
د - صبيغيين ملوللين.

4- في حالة مورثتين مرتبطتين، وعلى إثر تزاوج اختباري، نحصل على جيل مكون من:
أ- مظاهر خارجية أبوية ومظاهر خارجية جديدة التركيب بحسب متساوية؛
ب- مظاهر خارجية جديدة التركيب بحسب أكبر من المظاهر الخارجية الأبوية؛
ج- مظاهر خارجية جديدة التركيب بحسب أصغر من المظاهر الخارجية الأبوية؛
د- مظاهر خارجية جديدة التركيب بحسب 100%.

2- عند خلية أم تتضمن 2q من الـ ADN وخلال الطور الانفصالي I من الانقسام الاختزالي تمر كمية الـ ADN :
أ- من 2q إلى q؛
ب- من q إلى 2q؛
ج- من 2q إلى 4q؛
د- من 4q إلى q .

III- يتضمن الجدول أسفله مجموعتين: تمثل المجموعة 1 التغيرات التي يعرفها عدد ونمط الصبغيات بينما تمثل المجموعة 2 بعض الأطوار التي تحدث خلالها هذه التغيرات.

أنقل (ي) على ورقة تحريرك الأزواج المبينة أسفله وانسب (ي) لكل رقم من المجموعة 1، الحرف الذي يناسبه من المجموعة 2: (1 ن)

(1,) (2,) (3,) (4,)

المجموعة 2

المجموعة 1

- | | |
|------------------|--|
| أ- الاستوائية I | 1- أزواج من الصبغيات المتماثلة متفردة في شكل رباعيات |
| ب- التمهيدية I | 2- توجد الجزيئات المركبة للصبغيات المتماثلة من جهتي الصفيحة الاستوائية |
| ج- النهائية II | 3- صبغيات متفردة بصبيغيين |
| د- الاستوائية II | 4- صبغيات غير متماثلة بصبغي واحد |

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين الأول: (5 نقط)

لإبراز دور الانقسام الاختزالي والإخصاب في الحفاظ على ثبات الصيغة الصبغية وتتنوع المظاهر الخارجية عبر الأجيال، وكذا دراسة كيفية انتقال بعض الأمراض الوراثية عند الإنسان نقترح المعطيات الآتية:

I- تعرف دورة النمو عند الإنسان (الوثيقة 1) تعاقب ظاهرتين: الانقسام الاختزالي المسؤول عن إنتاج أمشاج ذكرية (الحيوانات المنوية) أو أمشاج أنثوية (خلايا بيضية)، والإخصاب المسؤول عن تشكيل بيضة. تتعرض هذه البيضة لانقسامات غير مباشرة متتالية تعطي فرداً جديداً.

1- حدد (ي) الصيغة الصبغية لكل من الخلايا a و b و c. (0.75 ن)

2- أنتجز (ي) الدورة الصبغية للإنسان محدداً (محددة) نمطها. (1.25 ن)



II- تترجم الطلاسيميا β -thalassémie عن خلل في تركيب السلسلة β للخضاب الدموي. تمثل الوثيقة 2 شجرة نسب عائلتين بعض أفرادها مصابون بهذا المرض.

3- باستغلالك للوثيقة 2:

أ- حدد (ي) معللاً (معللة) إجابتك كيفية انتقال هذا المرض. (0.75 ن)

ب- أعط (ي) النمط الوراثي لكل من الأفراد I₁ و I₂ و II₆. (1 ن)

استعمل (ي) الرمز N أو n للحليل المسؤول عن المظاهر الخارجي العادي، والرمز T أو t للحليل المسؤول عن الإصابة بالمرض.



ملحوظة: من أجل التبسيط، أعتمد ترقيم تصاعدي لأفراد نفس الجيل يجمع العائلتين.

الوثيقة 2

4- أ- أحسب (ي) معللاً (معللة) إجابتك احتمال أن يكون كل فرد من الفردين IV₈ و IV₉ مختلفاً الاقتران. (0.5 ن)
ب- في حالة زواج الفردين IV₈ و IV₉، أحسب (ي)، مستعيناً (مستعينة) بشبكة التزاوج، احتمال إنجاب ابن مصاب بمرض الطلاسيميا β . (0.75 ن)


التمرين الثاني: (5 نقط)

لإبراز مدى فعالية الانتقاء الاصطناعي في انتقاء السلالات النقية، نقترح المعطيات الآتية: يرغب مزارع التخصص في إنتاج نوع من النباتات الزهرية البصلية يحقق مبيعات أكثر عند بائعي الزهور. بعد زرع بذور من هذا النوع، حصل المزارع على ساكنة (P₁) ثلث أزهارها ضعيفة التسويق لتوفرها على ساق قصيرة، ما دفعه لدراسة تغير طول ساق الأزهار عند أفراد هذه الساكنة.

يمثل المنهج 1 للوثيقة أسفله مضلع ترددات طول ساق الأزهار عند أفراد الساكنة (P₁).

1- صف (ي) توزيع ترددات طول ساق الأزهار في الساكنة (P₁), ماذا تستنتج (ين) بخصوص هذا التوزيع؟ (1 ن)

للحصول على صنف من النباتات يتميز بأزهار ذات ساق طويلة، قام المزارع بإخضاب ذاتي لازهار تتنمي للساكنة (P₁) لها ساق يتراوح طولها بين 65cm و70cm، فحصل على بذور أعطى إنباتها ساقنة (P₂). يمثل المنحني 2 للوثيقة أسلفه مطلع ترددات طول ساق الأزهار عند أفراد الساكنة (P₂).



2 - أ - صف (ي) توزيع ترددات طول ساق الأزهار في الساكنة (P₂)، ماذا تستنتج (ين) بخصوص الانتقاء الذي قام به المزارع؟ (1.5 ن)

ب - حدد (ي) مدى تطابق نتائج الانتقاء المنجز مع الاستنتاج المرتبط بالإجابة عن السؤال 1 (1 ن)

- بالطريقة نفسها، قام المزارع بإخضاب ذاتي لازهار يتراوح طول ساقها بين 75cm و 80cm عند الساكنة (P₂)، فحصل على بذور أعطى إنباتها ساقنة (P₃).

يتمثل المنحني 3 للوثيقة أعلاه مطلع ترددات طول ساق الأزهار عند أفراد الساكنة (P₃).

3 - استنادا إلى إجابتكم عن السؤال رقم 2، وباستغلال المنحني 3 للوثيقة أعلاه، بين (ي) معيلا (معللة) إجابتكم حدود الانتقاء الذي أنجزه المزارع للرفع من طول ساق الأزهار. (1.5 ن)

التمرين الثالث: (5 نقط)

لمعرفة كيفية تأثير بعض عوامل التغير الوراثي على البنية الوراثية لساكنة معينة، نقترح المعطيات الآتية:

I - في خمسينيات القرن الماضي، وخلال حملات منظمة للقضاء على الجرذان، تم استعمال مضاد قوي لتخثر الدم يسمى الوارفرين (La Warfarine)، كمبييد ضد هذه الجرذان. سُجل إثراها في عدة بلدان وجود جرذان طافرة مقاومة لهذا المبييد. لإبراز مصدر التنوع الوراثي داخل ساكنة الجرذان، تم تحديد متتابلة النوكليوتيدات على مستوى جزء من المورثة VKOR1 ومتتابلة الأحماض الأمينية الناتجة عنه عند الجرذان الحساسة وعند مجموعتين من الجرذان المقاومة للوارفرين. تمثل الوثيقة 1 النتائج المحصلة.

ATA GAT CGA ACC TAA GAA AAG AAG CAG GAC ATG	
Tyr — Leu — Ala — Trp — Ileu — Leu — Phe — Phe — Val — Leu — Tyr	
ATA GTT CGA ACC TAA GAA AAG AAG CAG GAC ATG	
Tyr — Gln — Ala — Trp — Ileu — Leu — Phe — Phe — Val — Leu — Tyr	
ATA GAT CGA ACC TAA GAA AAG AAG CAG GTC ATG	
Tyr — Leu — Ala — Trp — Ileu — Leu — Phe — Phe — Val — Gln — Tyr	

الوثيقة 1

1- باستغلال معطيات الوثيقة 1، قارن (ي) متاليل نوكليوتيدات أجزاء المورثة VKOR1 ومتاليل الأحماض الأمينية عند الجرذان المقاومة للوارفرين مع مثيلاتها عند الجرذان الحساسة للوارفرين. استنتاج (ي) نوع الطفرة. (1 ن)


عند الجرذان الحساسة، يكبح الوارفرين عمل بروتين VKOR1 الذي يتدخل في إنتاج الفيتامين K الضروري لتخثر الدم. يترتب عن هذا الكبح نزيف دموي مميت. لا يؤثر الوارفرين على بروتين VKOR1 عند الجرذان المقاومة للميد التي تستهلك كميات كبيرة من الأغذية الغنية بالفيتامين K لتبقى حية.

2- باستغلالك لما سبق ، وضح (ي) سبب مقاومة الجرذان لميد الوارفرين؟ (1 ن)

II- لتفسير تطور نسبة الجرذان المقاومة للوارفرين داخل الساكنة، تم تتبع هذا التطور في منطقة ببلاد الغال (pays de Galles). تمثل الوثيقة 2 النتائج المحسّلة.

3- صف (ي) تطور النسبة المائوية للجرذان المقاومة للوارفرين قبل وخلال وبعد الحملة المنظمة للقضاء على الجرذان. (1 ن)

4- استنادا إلى ما سبق، فسر (ي) العلاقة بين حدوث الطفرة ودور الانقاء الطبيعي في تغيير البنية الوراثية لساكنة الجرذان بالمنطقة المدروسة. (2 ن)



انتهى