

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبصري (15 نقطة)


التمرين الأول: (5 نقاط)

الحلزونات كائنات حية خنثى (Hermaphrodite)، يتوفّر كل فرد منها على جهازين تناسليين ذكري وأنثوي. لإعطاء خلف يحتاج كل حلزون التزاوج مع حلزون آخر. لدراسة دورة النمو وكذا انتقال بعض الصفات الوراثية عبر التوالي الجنسي عند الحلزونات نقترح المعطين الآتيين:

• المعطى الأول:

تتوفر الحلزونات من نوع *Helix pomatia* على مناسل (مكان تشكّل الأمشاج) مكونة من أنابيب تحتوي على صنفين من الخلايا التناسلية: الخلايا من الصنف a (a₁ و a₂ و a₃) تحتل جوف الأنابيب والخلايا من الصنف b (b₁ و b₂ و b₃) تتواجد في جدار الأنابيب. تمثل الوثيقة 1 رسمًا تخطيطيًّا للاحظة مجهرية لمقطع عرضي أُنجز في مستوى المناسل عند هذا النوع.

تخضع كل خلية (a₁) لانقسامين متتابعين لتعطي أربع خلايا إلى خلية صغيرة (القد). a₃.



بالنسبة للخلايا من الصنف (b)، تترافق المدخرات داخل سيتوبلازم الخلية (b₁) فيكبُر حجمها فتحول إلى خلية (b₂). تخضع هذه الأخيرة لانقسامين متتابعين لتعطي الخلايا (b₃). تلتزم كل خلية (b₃) بخلية (a₃) لتعطي بيضة يتشكل حولها غلاف بروتيني وقوقة. بعد ذلك يحرر الحلزون حفرة في التربة ليضع ما بين 80 و130 بيضة. في غضون 2 إلى 3 أسابيع يفقس البيض ليعطي صغارا بقواقع شفافة. تمثل الوثيقة 2 دورة نمو الحلزون *Helix pomatia*.

- بالاعتماد على المعطيات السابقة وعلمًا أن الحلزون *Helix pomatia* يتميز بـ 54 صبغي، أعط (ي) معللاً إجابتك، الصيغة الصبغية لكل من الخلايا (a₁) و (a₂) و (b₁) و (b₂). (1 ن)
- أنجز(ي) الدورة الصبغية لهذا النوع واستنتج (ي) نمطها. (1 ن)

• المعطى الثاني:

لدراسة انتقال صفتين وراثيتين "لون القوقة" و "وجود أو غياب الأشرطة على القوقة" عند الحلزونات من صنف *Helix pomatia* تم إنجاز تزاوجات باستعمال سلالات مختلفة، P₁ و P₂ و P₃ و P₄.

يقدم الجدول الآتي نتائج ثلاثة تزاوجات تخص السلالتين P₁ بـ "قوىقة ذات أشرطة" و P₂ بـ "قوىقة بدون أشرطة".

التزاوج	الآباء	النتائج
3	2	1
P ₂ × P ₂	P ₁ × P ₂	P ₁ × P ₁
2567 بقواقع بدون أشرطة	2249 بقواقع بدون أشرطة 886 بقواقع ذات أشرطة	100% بقواقع ذات أشرطة

3. باستثمارك لمعطيات الجدول:

أ. حدد (ي) معللاً (معللة) إجابتك، الحليل السادس والحليل المتاح للوراثة المسؤولة عن هذه الصفة. (0.5 ن)

ب. أعط (ي) معللاً (معللة) إجابتك، الأنماط الوراثية للأبوين P_1 و P_2 . (1 ن)


استعمل (ي) الرموز: - A أو a للحليل المسؤول عن وجود الأشرطة على القوقة؛

- S أو s للحليل المسؤول عن غياب الأشرطة على القوقة؛

❖ تحكم في صفة لون القوقة مورثة توجد على شكل ثلاثة حلقات متساوية السيادة: الحليل "J" مسؤول عن اللون الأصفر للقوقة والحليل "R" مسؤول عن اللون الأحمر للقوقة والحليل "B" مسؤول عن اللون البني للقوقة.

أعطى التزاوج بين سلالتين نقيتين: P_3 بقواقع حمراء وبدون أشرطة و P_4 بقواقع بنية و ذات أشرطة، جيلاً F_1 بقواقع حمراء-بنية وبدون أشرطة.

4. باعتبار المورثتين المدروستين مرتبتين وتفصل بينهما مسافة 3.5 cm، حدد (ي) مستعيناً (مستعينة) بشبكة التزاوج، النتائج المنتظرة من تزاوج فرد من F_1 مع فرد من سلالة P_5 بقواقع صفراء وذات أشرطة. (1.5 ن)



التمرين الثاني: (5 نقاط)

الشعير (*Hordeum vulgare*)، من الحبوب التي تزرع بالمغرب والتي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة. يعتبر طول لحية السنبلة عند سنابل الشعير (الوثيقة 1) من بين الصفات الوراثية المتداخلة في تكيف هذا النوع مع الظروف المناخية الجافة. لإبراز أهمية هذه الصفة في الرفع من الإنتاجية الفلاحية للشعير، نقترح المعطيين الآتيين:

• المعطى 1: مكنت قياسات إحصائية لطول لحية السنابل عند ساكنتين P_1 و P_2 من نباتات الشعير، من الحصول على النتائج الإحصائية المقدمة في الوثيقة 2.

مراكز الأقسام ب cm	عدد النباتات
13	12.5
8	12
12	25
11.5	30
11	24
10.5	20

الشكل 1: توزيع طول لحية السنابل عند الساكنة P_1

مراكز الأقسام ب cm	عدد النباتات
15	14.5
9	11
14	56
13.5	12
13	12
12.5	8
12	4

الشكل 2: توزيع طول لحية السنابل عند الساكنة P_2

الوثيقة 2

1. حدد (ي)، معللاً (معللة) إجابتك، نوع التغير المدروس. (0.5 ن)

2. أنجز (ي)، على ورقة تحريرك وعلى نفس المبيان، مضلع الترددات لتوزيع طول لحية السنابل لكل من الساكنتين P_1 و P_2 . (1 ن) استعمل (ي) السلم: 1 cm لكل قسم و 1 cm لكل 10 نباتات.

3. صف (ي) توزيع ترددات طول لحية السنابل عند الساكنتين P_1 و P_2 ، ثم استنتج(ي) ما إذا كانت كل منها متجانسة أو غير متجانسة. (0.75 ن)

4. بالاعتماد على جدول تطبيقي لحساب الثوابت الإحصائية، أحسب (ي) المعدل الحسابي والانحراف النمطي (المعياري) ومجال الثقة $[\bar{X} - \sigma ; \bar{X} + \sigma]$ لتوزيع طول لحية السنابل عند الساكنة P_1 . (1.75 ن)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i f_i (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad \text{و} \quad \bar{x} = \frac{\sum_i (f_i x_i)}{n}$$

نعطي:

• المعطى 2:


- مكنت دراسة الثوابت الإحصائية لتوزيع طول لحية السنابل عند الساكنة P_2 من الحصول على النتائج المقدمة في الوثيقة 3.

- أنجزت دراسة إحصائية لمتغير كمي آخر يسمى وزن ألف حبة (Poids de mille grains) يرمز له بـ PMG عند الساكنتين P_1 و P_2 . تقدم الوثيقة 4 النتائج المحصلة.

5. باستثمار الوثائق 2 و 3 و 4، قارن (ي) الثوابت الإحصائية (المنوال والمعدل الحسابي والانحراف النمطي) لتوزيع طول لحية السنابل بين الساكنتين P_1 و P_2 ، تم استنتاج (ي) العلاقة بين طول لحية السنابل والإنتاجية عند نبات الشعير. (1 ن)

التمرين الثالث: (5 نقاط)

تتوفر أغلب أفراد الفيلة الإفريقية (*Loxodonta africana*)، ذكورا وإناثاً، على قواطع عليا ذات نمو مستمر، تدعى الأنياب (Défenses) كما هو مبين بالوثيقة 1.



تتجلى أهمية الأنبياء أساساً في المنافسة من أجل التزاوج وحماية الصغار والبحث عن الطعام، مما يجعل الفيلة ذات الأنبياء تتغذى بشكل أفضل ويكون لها فرصة أكبر للتواجد.

لتفسير تغير البنية الوراثية لساكنتين أفريقيتين من الفيلة، خلال القرن العشرين، نقترح المعطيات الآتية:

المعطى 1: في بداية القرن العشرين، كانت تجارة العاج سبباً في إبادة أعداد كبيرة من الفيلة التي كانت تُقتل من أجل عاج أنبيابها.

للحماية هذا النوع، اتخذت زامبيا سنة 1989 عدة تدابير تمثل في حظر تجارة العاج وإنشاء محمية طبيعية في جنوب لوانغوا (Luangwa) وتعبئة دوريات مكافحة الصيد الجائر.

تقديم الوثيقة 2 تطور عدد أفراد ساكنة الفيلة والنسب المئوية للإناث بدون أنبياء في زامبيا قبل وبعد إنشاء المحمية.

1. باستثمارك للمعطيات السابقة ومعطيات الوثيقة 2 :

أ. ص (ي) تطور عدد الأفراد ونسبة الإناث بدون أنبياء داخل هذه الساكنة. (0.5 ن)


ب. فسر (ي) تطور نسبة الإناث بدون أنبياء في الساكنة بعد إنشاء المحمية ثم استنتاج (ي) العامل المسؤول عن هذا التطور. (1 ن)

المعطى 2: أدى الصيد المكثف للفيلة في منطقة Addo بجنوب إفريقيا، بين سنتي 1919 و1920، إلى تقليص عدد أفراد الساكنة إلى 11 فردا، نصفهم بدون أنابيب. لحماية هذه الساكنة، أنشأت سنة 1931 محمية طبيعية بمنطقة Addo مكنت من ارتفاع عدد أفراد الساكنة إلى 400 فرد سنة 2015. تمثل الوثيقة 3 تطور نسبة الإناث بدون أنابيب داخل المحمية في الفترة الممتدة ما بين 1931 و2015.

2. باستثمار كل المعطيات السابقة والوثيقة 3:

أ. قارن (ي) نسبة الإناث بدون أنابيب في ساكنة المحمية بين سنتي 1931 و2015. (0.5 ن)

ب. بين (ي) ما إذا كانت ساكنة الفيلة بمحمية Addo ومحمية جنوب Luangwa قد خضعتا لتأثير نفس عامل التغير. (0.75 ن)



يتحكم في نمو الأنابيب عند الفيلة مورثة محمولة على الصبغي الجنسي X. توجد هذه المورثة على شكل حليلين مختلفين:

- الحليل المتواحش السائد «D» مسؤول عن وجود الأنابيب؛
 - الحليل الطافر المترافق «d» مسؤول عن غياب الأنابيب.
- تبين الوثيقة 4 تردد الحليلين «D» و«d» في ساكنة الفيلة بمحمية Addo بجنوب إفريقيا.

3. باعتبار أن الساكنة في سنة 2007 بلغت حالة التوازن حسب قانون Hardy-Weinberg، أحسب (ي) تردد المظاهر الخارجية عند كل من ذكور وإناث هذه الساكنة. (1 ن)

4. بالاعتماد على معطيات التمرين، فسر (ي) تطور البنية الوراثية لساكنة الفيلة بمحمية Addo. (1.25 ن)

انتهى