


## Correction

**1.a.** On observe sur l'écran un étalement du faisceau laser, perpendiculaire à la direction du fil, constitué d'une tache centrale bordée de taches latérales.

**b.** La lumière ne se propage plus de façon rectiligne, le phénomène observé est la **diffraction de la lumière**. Or ce phénomène est caractéristique des ondes, donc **la lumière est de nature ondulatoire**.

**c.** La lumière émise par la source laser est monochromatique : cela signifie que la lumière laser est constituée d'une seule radiation de fréquence fixée (ou de longueur d'onde dans le vide fixée).

**2.**



**3.** L'angle  $\theta$  est l'angle entre le **centre de la tache centrale** et le **centre de la zone de première extinction**. Voir figure ci-dessus.

Le schéma montre que:  $\tan\theta = (L/2) \div D = L / 2D$

$\theta$  étant petit et exprimé en radian, on a  $\tan\theta = \theta$ , donc  $\theta = L / 2D$

**4.** La relation entre les grandeurs  $\theta$ ,  $\lambda$  et  $a$  est:  $\theta = \lambda / a$  avec  $\theta$  en (rad),  $\lambda$  et  $a$  en (m).

**5.** En égalant les deux expressions de  $\theta$ , il vient:  $L/2D = \lambda / a$  soit:  $L = 2\lambda D / a$

**6.** D'après la relation précédente pour  $\lambda$  et  $D$  fixés, la largeur  $L$  "de la tache centrale" est inversement proportionnelle au diamètre  $a$  du fil diffractant.

Donc la tache centrale la plus grande correspond au fil de diamètre le plus petit :

$$\text{figure A} \Leftrightarrow a_1 = 20 \mu\text{m}$$

$$\text{figure B} \Leftrightarrow a_2 = 50 \mu\text{m}$$

**7.**

**7.1.** Le graphe  $L = f(1/a)$  est une droite qui passe par l'origine : donc la largeur  $L$  de la tache centrale est proportionnelle à l'inverse du diamètre du fil, soit  $1/a$ .

L'équation modélisant la droite est de la forme:  $L = k \cdot \frac{1}{a}$  avec  $k$  le coefficient directeur de cette droite.

Ceci est en accord avec l'expression  $L = 2\lambda D \times \frac{1}{a}$  car  $D$  et  $\lambda$  sont constantes, avec  $k = 2\lambda D$ .

**7.2.** Détermination le coefficient directeur  $k$  :

Soient les points  $A (15000 ; 0,028)$  et  $B (25000 ; 0,068)$ :  $k = (0,068 - 0,028) / (25000 - 15000)$   
 $k = 2,67 \cdot 10^{-6}$

L'équation de la droite s'écrit :  $L = 2,67 \times 10^{-6} \cdot \frac{1}{a}$

$$\lambda = 2,67 \cdot 10^{-6} / 2 \times 2,5 = 5,34 \times 10^{-7} \text{ m}$$

**7.3.** C'est une lumière de coloration verte.

**7.4.** La fréquence  $\nu$  de la lumière monochromatique émise par la source laser est:  $\nu = c / \lambda$

$$\nu = 3 \cdot 10^8 / 5,4 \cdot 10^{-7} = 5,5 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$