

الصفحة	1
	4
**	1

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2020
- الموضوع -

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

RS 24



4	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
9	المعامل	شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب)	الشعبة أو المسلك

- المدة الزمنية لإنجاز الموضوع هي 4 ساعات.
- يتكون الموضوع من (4) صفحات مرقمة من 1/4 إلى 4/4
- يتكون الموضوع من أربعة تمارين مستقلة فيما بينها.
- المترشح ملزم بإنجاز التمارين 3 و التمارين 4 و الاختيار بين إما التمارين 1 و إما التمارين 2
- على المترشح أن ينجز في المجموع ثلاثة (3) تمارين:
 - التمرين 1 و يتعلق بالحسابيات (اختياري).
 - و إما
 - التمرين 2 و يتعلق بالبنيات الجبرية (اختياري).
- التمارين 3 و يتعلق بالأعداد العقدية (إجباري)..... 3.5 نقط
- التمارين 4 و يتعلق بالتحليل (إجباري)..... 13 نقطة

لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة كيما كان نوعها

اختر وأنجز إما التمارين 1 و إما التمارين 2

و أنجز إجباريا التمارين 3 و التمارين 4

التمرين 1:(3.5 نقط/اختياري) (إذا انجزت التمارين 1 فلا ينبغي لك أن تتجز التمارين 2)

ليكن p و q عددين أوليين يحققان : $p < q$ و $[pq] = 1$

1-أ) بين أن p و 9 أوليان فيما بينهما. 0.5

ب) استنتج أن: $[p] = 1$ و $9^{p-1} = 1$ و أن $[p] = 1$ و $9^q = 1$ 1

2-أ) بين أن $1 - p$ و q أوليان فيما بينهما. 0.5

ب) باستعمال مبرهنة بوزو ، بين أن: $p = 2$ 0.5

3-أ) باستعمال مبرهنة فيرما ، بين أن : $[q] = 1$ و $9^{q-1} = 1$ 0.5

ب) استنتاج أن: $q = 5$ 0,5

التمرين 2: 3.5 نقط اختياري) (إذا انجزت التمرين 2 فلا ينبغي لك أن تجز التمرين 1)

نرمز بالرمز (\mathcal{M}_3) إلى مجموعة المصفوفات المربعة من الرتبة 3 ذات معاملات حقيقية.

نذكر أن $(\mathcal{M}_3)(+, \circ)$ فضاء متجمهي حقيقي بعده 9 و أن $(\mathcal{M}_3)(+, \circ)$ حلقة غير تبادلية و واحدية

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

صفرها

$$E = \begin{pmatrix} x & -y & -z \\ y & z & 0 \\ z & 0 & x \end{pmatrix} \quad M(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & -y & -z \\ y & z & 0 \\ z & 0 & x \end{pmatrix}$$

نعتبر المجموعة الجزئية: $\mathcal{M}(x, y, z)$

الجزء الأول:

1-أ) بين أن E فضاء متجمهي جزئي للفضاء $(\mathcal{M}_3)(+, \circ)$ 0.25

ب) حدد أساساً للفضاء $(E, +, \circ)$ 0.5

2-أ) تحقق أن: 0.25

$$(x, y, z) \in \mathcal{M}(x, y, z)^3, (x', y', z') \in \mathcal{M}(x, y, z)^3 ; M(x, y, z)' M(x', y', z') = M(xx' - yy', xy' + yx', zz')$$

ب) بين أن $(E, +, \circ)$ حلقة تبادلية 0.5

الجزء الثاني:

نعتبر المجموعة الجزئية F من E للمصفوفات على الشكل $M(x, y, 0)$ حيث $x^2 + y^2 = 1$ 0.25

1- بين أن F زمرة جزئية للزمرة $(E, +)$ 0.25

2- ليكن \mathcal{Z} التطبيق المعرف من \mathbb{C} نحو E بما يلي: 0.25

$$(x, y) \in \mathcal{Z}^2 ; \mathcal{Z}(x+iy) = M(x, y, 0)$$

أ- بين أن \mathcal{Z} تتشاكل من $(\mathbb{C}, +)$ نحو $(E, +)$ 0.25

ب- استنتاج أن (F^*, F) زمرة تبادلية. ($F^* = F - \{O\}$) 0.5

ج- بين أن $(F, +, \circ)$ جسم تبادلي يتم تحديد وحدته. 0.5

$$(M(x, y, 0)) \in F ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = M(x, y, 0) \quad 3- أ) تتحقق أن: O = M(x, y, 0)$$

ب) استنتاج أن لا أحد من عناصر المجموعة الجزئية F يقبل مقلوباً بالنسبة للضرب في $(\mathcal{M}_3)(i)$ 0.25

الصفحة 4	3	RS 24	<p align="center">الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2020 – الموضوع - مادة: الرياضيات- شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب)</p>	
التمرين 3: (5 نقاط/اجباري)				
1- ليكن m عدداً حقيقياً غير منعدم. نعتبر في مجموعة الأعداد العقدية \mathbb{C} ، المعادلتين: $(F): z^3 + 2(1-i)z^2 + (1+m^2 - 4i)z - 2i(1+m^2) = 0$ $(E): z^2 + 2z + 1 + m^2 = 0$ حل في \mathbb{C} المعادلة (E) 0.5 2- أ) بين أن المعادلة (F) تقبل حلًا تخيليًا صرفاً يتم تحديده. 0.25 ب) حل في \mathbb{C} المعادلة (F) 0.5 II- المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعمد منظم مباشر $(O; u, v)$ نعتبر نقطتين: $B(-1-im)$ و $A(-1+im)$ لتكن W منتصف القطعة $[AB]$ و $'A$ منتصف القطعة $[OB]$ و $'B$ منتصف القطعة $[OA]$ الدوران الذي مركزه W و زاويته $\frac{p\theta}{2\theta}$ يحول A إلى (p) و الدوران الذي مركزه $'A$ و زاويته $\frac{q\theta}{2\theta}$ يحول B إلى (q) و الدوران الذي مركزه $'B$ و زاويته $\frac{r\theta}{2\theta}$ يحول O إلى (r) 1- بين أن: $r = \bar{q} = \frac{1-i}{2}(-1-im)$ و $p = -1+m$ 1.5 2- أ) تحقق أن: $q = -ip$ ب) استنتج أن: $OP = QR$ و أن المستقيمين (OP) و (QR) متعمدان. 0.5				
التمرين 4: (13 نقطة/اجباري)				
الجزء الأول: نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $I = [0, 1]$ بما يلي: $f(x) = x \ln(2-x)$ بما يلي: و ليكن (C) تمثيلها المباني في معلم متعمد منظم $(O; i, j)$				
1- أ) بين أن f قابلة للاشتغال على I و أن: $f'(x) = \ln(2-x) - \frac{x}{2-x}$ ب) بين أن الدالة المشتقة f' تناقصية قطعاً على I ج) بين أنه يوجد عدد حقيقي وحيد $a \in I$ بحيث: $f'(a) = 0$ و أن: $f(a) = \frac{a^2}{2-a}$ 2- أ) ادرس تغيرات f ، ثم اعط جدول تغيراتها. ب) بين أن المنحنى (C) مقعر. ج) بين أن: $f(t) \geq f(x) \geq f'(t)(x-t) + f(t)$ د) استنتاج أن لكل x من I : $f(x) \leq x + 1$ و $f(x) \leq x \ln 2$ 3- أنشئ المنحنى (C) (نأخذ: $ i = 2cm$)				0.75 0.5 0.75 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

الصفحة	4	RS 24	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2020 – الموضوع - مادة: الرياضيات- شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب)	
			4- احسب، ب cm^2 ، مساحة جزء المستوى المحصور بالمنحنى و المستقيمات المعرفة بالمعادلات: $x = 0$ $y = 0$ و $x = 1$ الجزء الثاني: ليكن n عدداً صحيحاً طبيعياً أكبر من أو يساوي 2. نعتبر الدالة $f_n(x) = x^n \ln(2-x)$ المعرفة على $I = [0, 1]$ بما يلي: أ- تتحقق أن f_n موجبة على I و أن $f_n(0) = f_n(1)$ 0.5 ب) بين أنه يوجد على الأقل $a \in]0, 1[$ بحيث: $f'_n(a) = 0$ 0.5 2- أ) بين أن f_n قابلة للاشتقاق على I و أن: $f'_n(x) = x^{n-1} g_n(x)$ حيث: $g_n(x) = n \ln(2-x) - \frac{x}{2-x}$ ب) بين أن الدالة g_n تناقصية قطعاً على I ج) استنتج أن a وحيد. 0.5 3- نعتبر المتالية $(a_n)_{n=2}^{\infty}$ المعرفة حسب ما سبق. أ) بين أن: $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a_n) = 0$ 1 ب) بين أن: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2$ 1 ج) بين أن المتالية $(a_n)_{n=2}^{\infty}$ متقاربة. 0.25 د) بين أن: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$ 0.5 الجزء الثالث: لكل عدد صحيح طبيعي $n \geq 3$ ، نضع: $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ 1- بين أن المتالية $(I_n)_{n=2}^{\infty}$ تناقصية، استنتج أنها متقاربة. 0.75 2- باستعمال متكاملة بالأجزاء، بين أن: $I_n = \frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2-x} dx$ 0.5 3- بين أن: $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ ، ثم استنتاج أن: $0 < I_n < \frac{1}{n+1}$ 0.75	

انتهى

.