

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2023

SSSSSSSSSSSSSSSSSS-SSS

الموضوع

RS 24

4h

مقدمة الانجاز

الرياضيات

الحادي

9

الملخص

شعبـة العـلـوم الـرـيـاضـيـة (أ) و (ب)

الشعبة أو المصالك

تعلیمات:

- مدة الاختبار هي أربع ساعات.
- يتضمن موضوع الاختبار أربعة تمارين مستقلة فيما بينها.
- يمكن أن تنجز التمارين حسب الترتيب الذي يختاره المترشح.

- التمرين 1 يتعلّق بالتحليل.....(10 نقطه)
- التمرين 2 يتعلّق بالأعداد العقدية.....(3.5 نقطه)
- التمرين 3 يتعلّق بالبنيات الجبرية.....(3.5 نقطه)
- التمرين 4 يتعلّق بالحسابيات.....(3 نقطه)

لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة **كيفما كان نوعها**

لا يسمح باستعمال اللون الأحمر

التمرين 1 : (10 نقط)

الجزء I:

لكل عدد صحيح طبيعي غير منعدم n ، نعتبر الدالة f_n المعرفة على $[0, +\infty]$ بما يلي :

$$(\forall x \in [0, +\infty]) ; \quad f_n(x) = \sqrt{x} (\ln x)^n \quad \text{و} \quad f_n(0) = 0$$

ولتكن (C_n) منحناها الممثل في معلم متعمد منظم $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1- أ) تتحقق أن: $(\forall x \in [0, +\infty]) ; \sqrt{x} (\ln x)^n = (2n)^n \left(x^{\frac{1}{2n}} \ln \left(x^{\frac{1}{2n}} \right) \right)^n$ ، استنتج أن f_n متصلة على اليمين في 0

0.5

ب) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$

0.25

ج) تتحقق أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x} = (2n)^n \left(\frac{\ln \left(x^{\frac{1}{2n}} \right)}{x^{\frac{1}{2n}}} \right)^n$ ، استنتاج $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x}$ ثم أول

0.75

مبيانيا النتيجة المحصل عليها.

د) احسب، حسب زوجية n ، $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f_n(x)}{x}$ ثم أول مبيانيا النتيجة المحصل عليها.

0.5

2- أ) بين أن f_n قابلة للاشتغال على $[0; +\infty]$ و أن :

$$(\forall x \in [0, +\infty]) ; \quad f_n'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x)^{n-1} (2n + \ln x)$$

0.75

ب) تتحقق أن لكل $n \geq 2$: $f_n'(x) = 0$ تكافئ $x = 1$ أو $x = e^{-2n}$

0.25

ج) ادرس، حسب زوجية n ، منحى تغيرات f_n و اعط جدول تغيراتها.

1

د) بين أنه إذا كان n فرديا و $n \geq 3$ فإن النقطة ذات الأصول 1 هي نقطة انعطاف (C_n)

0.25

الجزء II:

1- ليكن $\beta \in [1, e]$ عددا حقيقيا ثابتا. نعتبر المتالية العددية $(u_n)_{n \geq 1}$ المعرفة بما يلي :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; \quad u_n = f_n(\beta)$$

أ) بين أن: $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; \quad 0 < u_n < \sqrt{e}$

0.25

ب) بين أن المتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ تناقصية.

0.25

ج) حدد $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

0.25

2- أ) بين أنه لكل عدد صحيح n غير منعدم، يوجد عدد حقيقي وحيد $x_n \in [1, e]$ بحيث: $f_n(x_n) = 1$

0.5

ب) بين أن المتالية المعرفة $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ تزايدية، استنتاج أنها متقاربة.

0.75

3- نضع: $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$

أ) بين أن: $1 < \ell \leq e$ 0.5

ب) بين أن: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln x_n)^n = \frac{1}{\sqrt{\ell}}$ 0.25

ج) بين أنه إذا كان $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln(\ln x_n) = -\infty$ فإن $\ell < e$ 0.25

د) استنتج قيمة ℓ 0.25

الجزء III:

نضع لكل $x \in I$ ، $F(x) = \int_x^1 (f_1(t))^2 dt$

1- أ) بين أن الدالة F متصلة على I 0.25

ب) باستعمال متكاملة بالأجزاء مرتين، بين أن:

$$(\forall x \in]0, +\infty[) ; F(x) = -\frac{x^2}{2} \ln^2(x) + \frac{x^2}{2} \ln(x) + \frac{1}{4}(1 - x^2)$$

2- أ) احسب $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x)$ 0.5

ب) استنتاج قيمة $F(0)$ 0.25

ج) احسب، ب cm^3 ، حجم المجسم المولد بدوران جزء المنحني (C_1) الموافق للمجال $[0, 1]$ دورة

كاملة حول محور الأفاسيل. (نأخذ $\|i\| = 1 \text{cm}$) 0.5

التمرين 2: (3.5 نقطة)

يمكن أن ينجز الجزءان I و II بشكل مستقل.

الجزء I:

$$(S): \begin{cases} \sqrt{x} \left(1 + \frac{1}{x+y}\right) = \frac{12}{5} \\ \sqrt{y} \left(1 - \frac{1}{x+y}\right) = \frac{4}{5} \end{cases} \quad \text{نعتبر في } \mathbb{C}^2 \text{ النظمة التالية:}$$

1- ليكن $z = \sqrt{x} + i\sqrt{y}$ حل للنظام (S) . نضع: $(x, y) \in \mathbb{C}^2$

أ) بين أن: $z + \frac{1}{z} = \frac{12}{5} + \frac{4}{5}i$ 0.25

ب) بين أن: $0 = z^2 - \left(\frac{12}{5} + \frac{4}{5}i\right)z + 1$ ، استنتاج القيم الممكنة للعدد z 0.75

$$\left(\frac{28}{25} + \frac{96}{25}i \right) = \left(\frac{2}{5}(4 + 3i) \right)^2 \quad \text{(نلاحظ أن:)}$$

ج) استنتاج قيم الزوج (x, y) 0.25

2- حل في \mathbb{C}^2 النظمة (S) 0.5

الجزء II

المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعمد منظم مباشر $(O; \vec{u}, \vec{v})$

لتكن (U) الدائرة التي مركزها O وشعاعها 1 و $A(a)$ و $B(b)$ و $C(c)$ ثلث نقاط مختلفة مثنى مثنى من (U)

1- بين أن: $(\forall z \in \mathbb{C}) ; |z|=1 \Leftrightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}$ 0.25

2- أ) المستقيم المار من A و الموازي لل المستقيم (BC) يقطع الدائرة (U) في النقطة (P) 0.5

بين أن: $p = \frac{bc}{a}$

ب) المستقيم المار من A و العمودي على المستقيم (BC) يقطع الدائرة (U) في النقطة (Q) 0.5

بين أن: $q = -p$

ج) المستقيم المار من C و الموازي لل المستقيم (AB) يقطع الدائرة (U) في النقطة (R) 0.5

بين أن المستقيمين (PR) و (OB) متعمدان.

التمرين 3.5 (3.5 نقطة)

نذكر أن $(M_3(\mathbb{C}), +, \times)$ حلقة واحدية و غير تبادلية وحدتها

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ليكن $E = \left\{ M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & -c \\ 0 & c & b \end{pmatrix} / (a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \right\}$

1- بين أن E زمرة جزئية للزمرة $(M_3(\mathbb{C}), +)$ 0.25

2- نزود المجموعة $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ بقانون التركيب الداخلي * المعرف بما يلي:

$$\forall ((x, z), (x', z')) \in (\mathbb{C} \times \mathbb{C})^2 ; (x, z) * (x', z') = (x + x', z + z')$$

و نعتبر التطبيق φ المعرف من E نحو $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ بما يلي:

$$\forall (a, b, c) \in \mathbb{C}^3, \varphi(M(a, b, c)) = (a, b + ci)$$

أ) بين أن φ تشكل من $(E, +)$ نحو $(\mathbb{C} \times \mathbb{C}, *)$ و أن $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ زمرة تبادلية. 0.5

ب) استنتاج أن $(*, \mathbb{C} \times \mathbb{C})$ زمرة تبادلية. 0.25

3- نزود $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ بقانون التركيب الداخلي T المعرف بما يلي:

$$\forall ((x, z), (x', z')) \in (\mathbb{C} \times \mathbb{C})^2 ; (x, z)T(x', z') = (x \operatorname{Re}(z') + x' \operatorname{Re}(z), zz')$$

$\operatorname{Re}(z)$ هو الجزء الحقيقي للعدد العقدي z)

أ) بين أن T تبادلية. 0.25

ب) تتحقق أن $(0, 1)$ هو العنصر المحايد للقانون T في $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ 0.25

ج) تتحقق أن $(1, i)T(x, -i) = (0, 1)$ غير تجميعي في $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ 0.5

4- ليكن $G = \{(Im(z), z) / z \in \mathbb{C}\}$

هو الجزء التخييلي للعدد العقدي z)

(أ) بين أن G زمرة جزئية للزمرة $(\mathbb{C} \times \mathbb{C}, *)$ 0.25

(نلاحظ أن $(-Im(z), -z)$ هو مماثل $(Im(z), z)$ بالنسبة لقانون $*$)

ب) ليكن ψ التطبيق المعرف من \mathbb{C}^* نحو $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ بما يلي: 0.25

يبين أن ψ تشكل من $(\mathbb{C} \times \mathbb{C}, *)$ نحو (\mathbb{C}, T)

ج) استنتج أن $(G - \{(0,0)\}, T)$ زمرة تبادلية.

5- بين أن $(G, *, T)$ جسم تبادل.

التمرين 4: (3 نقط)

ليكن p عددا أوليا فرديا. نضع: $S = 1 + p + p^2 + p^3 + \dots + p^{p-1}$

ليكن q عددا أوليا يقسم S

1- أ) بين أن p و q أوليان فيما بينهما.

ب) استنتاج أن: $p^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ 0.25

ج) تحقق أن: $p^p \equiv 1 \pmod{q}$ ، استنتاج أن: $p^p - 1 \equiv (p-1)S \pmod{q}$ 0.5

2- نفترض أن p و q أوليان فيما بينهما.

أ) باستعمال مبرهنة بوزوت (Bézout)، بين أن: $p \equiv 1 \pmod{q}$ 0.75

ب) استنتاج أن $S \equiv 1 \pmod{q}$ 0.25

3- بين أن: $q \equiv 1 \pmod{p}$ 0.75

انتهى