


برهان التزايدات المئوية

I

1- برهان رول

تذكرة: اذا كان لدالة f مطابق نسبي في c وكانت f قابلة للاشتراك في c فان $f'(c) = 0$

لتكن f دالة متصلة على $[a; b]$ وقابلة للاشتراك على $[a; b]$ بحيث



الشكل جانبه يُؤول هندسياً هذه الشروط:

يُظهر من خلال الشكل عن وجود نقطة C من المنحني (C_f) أقصولها ينتمي إلى $[a; b]$ بحيث المماس

لـ $f'(c) = 0$ يوازي محور الأفاسيل أي يوجد c من $[a; b]$ بحيث

برهن هذا

* إذا كانت f ثابتة فان $f'(c) = 0 \forall c \in [a; b]$

- f دالة غير ثابتة ومنه يوجد $x_0 \in [a; b]$ حيث $f(x_0) > f(a) = f(b)$ أو $f(x_0) < f(a) = f(b)$

بما أن f متصلة على $[a; b]$ فان f تقبل قيمة قصوى $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ وقيمة دنيا $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$

لدينا $M \neq f(a) = f(b)$ أو $M \neq f(a) = f(b)$ لأن إذا كان غير ذلك فان f ستكون ثابتة
إذا كان $M \neq f(a) = f(b)$ فإنه يوجد c من $[a; b]$ حيث $f(c) = M$ أي أن f تقبل قيمة قصوى عند c

وحيث f قابلة للاشتراك في c فان $f'(c) = 0$

إذا كان $M \neq f(a) = f(b)$ فإنه يوجد c من $[a; b]$ حيث $f(c) = m$ أي أن f تقبل قيمة دنيا عند c

وحيث f قابلة للاشتراك في c فان $f'(c) = 0$

برهن رول

إذا كانت دالة f معرفة على المجال $[a; b]$ تحقق الشروط التالية:


-1 f متصلة على $[a; b]$

-2 f قابلة للاشتراك على $[a; b]$

-3 $f(a) = f(b)$

فانه يوجد عنصر c من $[a; b]$ حيث $f'(c) = 0$

- ❖ وجود c من $[a; b]$ حيث $f'(c) = 0$ لا يشترط وجود نقطة أخرى k حيث $f'(k) = 0$
- ❖ لتطبيق مبرهنة رول الشروط الثلاث ضرورية
- ❖ معطيات مبرهنة رول شرط كافٍ، لكنها غير لازمة



2- مبرهنة التزايدات المتنفسة

لتكن f دالة متصلة على $[a; b]$ وقابلة للاشتاقاق على $[a; b]$

الشكل جانبه يؤول هندسيا الشرطين:
يظهر من خلال الشكل عن وجود نقطة C من المنحنى (C_f) أقصولها ينتمي إلى $[a; b]$ بحيث المماس لـ (C_f) في C يوازي (AB) أي أن معامليهما الموجهين متساوين $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ يوجد c من $[a; b]$ بحيث

لبرهن هذا

$$g(x) = f(x) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) + f(a) \right]$$

لدينا إذن g دالة متصلة على $[a; b]$ وقابلة للاشتاقاق على $[a; b]$ لدينا $g(a) = g(b) = 0$

اذن حسب مبرهنة رول يوجد عنصر c من $[a; b]$ حيث $g'(c) = 0$

$$\forall x \in [a; b] \quad g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{و منه}$$

إذا كانت دالة f معرفة على المجال $[a; b]$ تحقق الشرطين التاليين:

-1 f متصلة على $[a; b]$

-2 f قابلة للاشتاقاق على $[a; b]$

فانه يوجد عنصر c من $[a; b]$ حيث $(b - a)f'(c) = f(b) - f(a)$

ملاحظات

وجود c من $[a; b]$ حيث $(b - a)f'(c) = f(b) - f(a)$ لا يشترط وجود نقطة أخرى k حيث $(b - a)f'(k) = f(b) - f(a)$

تمرين

$$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \quad |\sin x - \sin y| \leq |x - y|$$

-1- بين أن $\sin x \leq x$ $\forall x \in \mathbb{R}$

-2- استنتج أن $|\sin x| \leq 1$ $\forall x \in \mathbb{R}$

لتكن f و g دالتي معرفتين على المجال $I = [x_0; +\infty)$ و قابلتين للاشتراق على I حيث $f(x_0) = g(x_0)$ و $f'(x) \geq g'(x)$ لكل x من I نعتبر $h = f - g$ على I بتطبيق مبرهنة التزايدات المتهية على h في المجال $[x_0; x]$ حيث $x \in I$ بين أن $f(x) \geq g(x)$ لكل x من I

الجواب

لدينا g متصلة على $[x_0; x]$ و قابلة للاشتراق على $[x_0; x]$ لكل x من I ومنه يوجد عنصر c من $[x_0; x]$ حيث $(x - x_0)h'(c) = h(x) - h(x_0)$ أي $(x - x_0)h'(c) = h(x) - h(x_0)$ أي $(x - x_0)h'(c) = h(x) - h(x_0)$ و بما أن $h'(c) \geq 0$ أي $h'(c) \geq 0$ لكل x من I فإن $h'(c) = f'(c) - g'(c) \geq 0$ ومنه $h(x) \geq h(x_0)$ لكل x من I اذن $f(x) \geq g(x)$ لكل x من I

لتكن f و g دالتي معرفتين على المجال $I = [x_0; +\infty)$ و قابلتين للاشتراق على I

إذا كان $f(x_0) = g(x_0)$ و $f'(x) \geq g'(x)$ لكل x من I فإن $f(x) \geq g(x)$ لكل x من I

ملاحظة: يمكن تعويض المجال I بـ $[a; x_0]$ أو $[x_0; a]$ أو $[a; x_0]$ و الخاصية تبقى صالحة

تمرين

$$\forall x \in \mathbb{R}^+ \quad x - \frac{x^3}{3} \leq \arctan x - 1$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4}$$

تمرين

$$u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$$

نعتبر المتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متقاربة.