

هي : $\mathbb{R} - \{3\}$

4- لتبين أن : $E = [3; +\infty[$ جزء مستقر من $(\mathbb{R}; *)$
نعتبر : $y \in E$

نعتبر الدالة : $f_y(x) = xy - 3(x + y) + 12$

معرفة على $[3; +\infty[$

$$f'_y(x) = y - 3$$

بما أن : $y \in E$ فإن : $f'_y(x) > 0$

إذن : f_y تزايدية على $[3; +\infty[$

و منه : $f_y(3) = 4$ و $\forall x \in E \quad f_y(x) \geq f_y(3)$

إذن : $\forall x \in E \quad f_y(x) > 3$

و منه : $\forall (x; y) \in E^2 \quad f_y(x) > 3$

$\boxed{\forall (x; y) \in E^2 \quad x * y \in E}$ يعني :

إذن : $E = [3; +\infty[$ جزء مستقر من $(\mathbb{R}; *)$

5- لتبين أن : جميع عناصر $\mathbb{R} - \{3\}$ منتظمة بالنسبة للقانون *

العنصر a من $\mathbb{R} - \{3\}$ منظم يعني

$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \begin{cases} a * x = a * y \Rightarrow x = y \\ x * a = y * a \Rightarrow x = y \end{cases}$

بما أن * تبادلي يكفي البرهنة أن :

$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \quad a * x = a * y \Rightarrow x = y$

$a * x = a * y \Leftrightarrow ax - 3(a + x) + 12 = ay - 3(a + y) + 12$

$$\Leftrightarrow ax - 3x = ay - 3y$$

$$\Leftrightarrow (a - 3)(x - y) = 0 ; a \neq 3$$

$$\Leftrightarrow x = y$$

و منه : جميع عناصر $\mathbb{R} - \{3\}$ منتظمة بالنسبة للقانون *

تمرين 2

1- بين أن : الضرب في $(\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); *)$ تجمعي

2- بين أن : الضرب في $(\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); *)$ غير تبادلي

3- بين أن : هو العنصر المحايد في $(\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); *)$

4- بين أن : لا يقبل مماثلا في $(\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); *)$

5- بين أن : غير منظم في $(\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); *)$

الحل

2- لتبين أن : الضرب في $(\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); *)$ غير تبادلي

لدينا :

قانون التركيب الداخلي

تمرين 1

نعتبر قانون التركيب الداخلي * المعرف على \mathbb{R} بما يلي :

$$\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 \quad x * y = xy - 3(x + y) + 12$$

1- بين أن : * تجمعي و تبادلي

2- بين أن * يقبل عنصرا محايدا ثم حده

3- حدد عناصر \mathbb{R} التي تقبل مماثلا بالنسبة للقانون *

4- بين أن : $E = [3; +\infty[$ جزء مستقر من $(\mathbb{R}; *)$

5- بين أن : جميع عناصر $\mathbb{R} - \{3\}$ منتظمة بالنسبة للقانون *

الحل

1- لتبين أن : * تجمعي

نعتبر : $(x; y; z) \in \mathbb{R}^3$

$$(x * y) * z = (xy - 3(x + y) + 12)z - 3((xy - 3(x + y) + 12) + z) + 12$$

$$(x * y) * z = xyz - 3(xz + yz + xy) + 9(x + y + z) - 24$$

$$\boxed{(x * y) * z = x * (y * z)} \quad \text{إذن :}$$

و منه : * تجمعي

- لتبين أن : * تبادلي

نعتبر : $(x; y) \in \mathbb{R}^2$

$$x * y = xy - 3(x + y) + 12 \quad \text{لدينا :}$$

$$= yx - 3(y + x) + 12 \quad \text{إذن :}$$

$$\boxed{x * y = y * x} \quad \text{إذن :}$$

2- لتبين أن * يقبل عنصرا محايدا ثم حده

نعتبر : $e \in \mathbb{R}$ بحيث :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad x * e = e * x = x$$

بما أن * تبادلي يكفي تحديد e بحيث :

$$x * e = x \Leftrightarrow xe - 3(x + e) + 12 = x$$

$$\Leftrightarrow (e - 4)(x - 3) = 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow e - 4 = 0$$

$$\boxed{e = 4} \quad \text{إذن : * يقبل عنصرا محايدا و هو 4}$$

3- عناصر \mathbb{R} التي تقبل مماثلا بالنسبة للقانون *

نعتبر : $x \in \mathbb{R}$

$$x * y = y * x = 4 \quad \text{يعني : } y$$

يما أن * تبادلي يكفي تحديد y بحيث :

$$x * y = 4 \Leftrightarrow xy - 3(x + y) + 12 = 4$$

$$\Leftrightarrow y(x - 3) = 3x - 9$$

$$\boxed{x * y = e \Leftrightarrow y = \frac{3x - 9}{x - 3} ; x \neq 3}$$

مجموعة عناصر \mathbb{R} التي تقبل مماثلا بالنسبة للقانون *

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

4- بين أن $(\mathbb{M}_3(\mathbb{R}); \times)$ لا يقبل مماثلا في $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

5- بين أن $(\mathbb{M}_3(\mathbb{R}); \times)$ غير منتظم في $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

إذن : الضرب في $\mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ غير تبادلي

تمرين 4

بين أن f تشكل في كل حالة

$$f : ([0; +\infty[; \times) \rightarrow (\mathbb{R}; +)$$

$$x \mapsto \ln x$$

$$f : (\mathbb{R}; +) \rightarrow (\mathbb{C}^*; \times)$$

$$x \mapsto e^{ix}$$

$$f : (\mathcal{P}(E); \cup) \rightarrow (\mathcal{P}(E); \cap)$$

$$X \mapsto C_E^X$$

$$f : (\mathcal{P}(E); \cap) \rightarrow (\mathcal{P}(E); \cup)$$

$$X \mapsto C_E^X$$

$$f : (\mathbb{R}; +) \rightarrow (\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); \times)$$

$$x \mapsto \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}$$

احسب $\begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}^n$

الحل

$$f : ([0; +\infty[; \times) \rightarrow (\mathbb{R}; +)$$

$$x \mapsto \ln x$$

نعتبر : $(x; y) \in [0; +\infty[^2$

$$f(xy) = \ln(xy)$$

$$= \ln x + \ln y$$

$$f(xy) = f(x) + f(y)$$

إذن : f تشكل من $(\mathbb{R}; +)$ نحو $[0; +\infty[$

$$f : (\mathcal{P}(E); \cup) \rightarrow (\mathcal{P}(E); \cap)$$

$$X \mapsto C_E^X$$

نعتبر : $(X; Y) \in \mathcal{P}(E)^2$

3- لنبين أن $(\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); \times)$ هو العنصر المحايد في $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

إذن : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ هو العنصر المحايد في $\mathbb{M}_2(\mathbb{R})$

4- لنبين أن $(\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); \times)$ لا يقبل مماثلا في $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a+b & c+d \\ a+b & c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a+b=1 \\ a+b=0 \end{cases} ; \begin{cases} c+d=1 \\ c+d=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 1=0$$

و هذا غير ممكن

إذن : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ لا يقبل مماثلا في $\mathbb{M}_2(\mathbb{R})$

5- لنبين أن $(\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); \times)$ غير منتظم في $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

لدينا : لكن :

تمرين 3

1- بين أن : الضرب في $\mathbb{M}_3(\mathbb{R})$ تجميعي

2- بين أن : الضرب في $\mathbb{M}_3(\mathbb{R})$ غير تبادلي

3- بين أن : هو العنصر المحايد في $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
 f(x+y) &= \begin{pmatrix} \cos(x+y) & -\sin(x+y) \\ \sin(x+y) & \cos(x+y) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \cos x \cos y - \sin x \sin y & -\cos x \sin y - \sin x \cos y \\ \sin x \cos y + \cos x \sin y & -\sin x \sin y + \cos x \cos y \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \cos y & -\sin y \\ \sin y & \cos y \end{pmatrix} \\
 f(x+y) &= f(x) \times f(y)
 \end{aligned}$$

إذن : f تشكل من $(\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); \times)$ نحو $(\mathbb{R}; +)$

$$f(x+y) = f(x) \times f(y)$$

نبين بالترجع أن : $f(nx) = (f(x))^n$

$$\begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos nx & -\sin nx \\ \sin nx & \cos nx \end{pmatrix} : \text{ إذن :}$$

تمرين 5

* قانون تركيب داخلي في G بحيث :
* تجميلي ، يقبل عنصراً محايداً e ، جميع عناصر G تقبل مماثلاً في $(G; *)$ (مماثل a هو a^{-1})

$$\begin{aligned}
 f : G &\rightarrow \mathcal{F} \\
 a &\mapsto f_a
 \end{aligned}
 \quad \text{نعتبر التطبيق :}$$

$$f_a : G \rightarrow G \quad \text{معروف بما يلي :} \quad f_a$$

$$x \mapsto a * x * a^{-1} \quad \text{-1- بين أن :}$$

$$\forall (a; b) \in G^2 \quad f_a \circ f_b = f_{a * b} \quad \text{-2- نعتبر :}$$

$$F = \{f_a / a \in G\}$$

أ- بين أن : * قانون تركيب داخلي في F تجميلي ، يقبل عنصراً محايداً ، جميع عناصر F تقبل مماثلاً في $(F; \circ)$

ب- بين أن : f تشكل من $(G; *)$ نحو $(F; \circ)$

الحل

$$\forall (a; b) \in G^2 \quad f_a \circ f_b = f_{a * b} \quad \text{-1- لنبين أن :}$$

$$x \in G \quad \text{نعتبر :}$$

$$f_a \circ f_b(x) = a * (b * x * b^{-1}) * a^{-1}$$

$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1} \quad \text{بما أن : * تجميلي و}$$

$$a * (b * x * b^{-1}) * a^{-1} = (a * b) * x * (a * b)^{-1} \quad \text{فإن :}$$

$$\forall x \in G \quad f_a \circ f_b(x) = f_{a * b}(x) \quad \text{إذن :}$$

$$\forall (a; b) \in G^2 \quad f_a \circ f_b = f_{a * b} \quad \text{و منه :}$$


$$F = \{f_a / a \in G\} \quad \text{-2- نعتبر :}$$

أ- لنبين أن : * قانون تركيب داخلي في F

$$\forall (a; b) \in G^2 \quad f_a \circ f_b = f_{a * b} \quad \text{من -1- :}$$

وبما أن : * قانون تركيب داخلي في G

$$\begin{aligned}
 f(X \cup Y) &= C_E^{X \cup Y} \\
 &= E - (X \cup Y) \\
 &= (E - X) \cap (E - Y) \\
 &= C_E^X \cap C_E^Y \\
 f(X \cup Y) &= f(X) \cap f(Y) \\
 \text{إذن : } f \text{ تشكل من } (\mathcal{P}(E); \cap) \text{ نحو } (\mathcal{P}(E); \cup)
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 E - (X \cup Y) &= A \\
 E - X &= A \cup Y_1 \\
 E - Y &= A \cup X_1 \\
 (A \cup Y_1) \cap (A \cup X_1) &= A \\
 E - (X \cup Y) &= (E - X) \cap (E - Y) \quad \text{إذن :}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f : (\mathcal{P}(E); \cap) &\rightarrow (\mathcal{P}(E); \cup) \quad -4 \\
 X &\mapsto C_E^X \\
 (X; Y) \in \mathcal{P}(E)^2 &\quad \text{نعتبر :}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(X \cap Y) &= C_E^{X \cap Y} \\
 &= E - (X \cap Y) \\
 &= (E - X) \cup (E - Y) \\
 &= C_E^X \cup C_E^Y \\
 f(X \cap Y) &= f(X) \cup f(Y) \quad \text{إذن : } f \text{ تشكل من } (\mathcal{P}(E); \cup) \text{ نحو } (\mathcal{P}(E); \cap)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f : (\mathbb{R}; +) &\rightarrow (\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); \times) \quad -5 \\
 x &\mapsto \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix} \\
 (x; y) \in \mathbb{R}^2 &\quad \text{نعتبر :}
 \end{aligned}$$

$$f : (\mathbb{R}; +) \rightarrow (\mathbb{M}_2(\mathbb{R}); \times)$$

$$x \mapsto \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}$$

$$(x; y) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{نعتبر :}$$

3- استنتاج خاصيات $(E; \times)$

الحل

1- لنبين أن : f تقابل

$$\left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \right) \in E^2$$

نعتبر :

$$f \left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right) = f \left(\begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \right) \Leftrightarrow a + ib = c + id$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases}$$

$$f \left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right) = f \left(\begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \right) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix}$$

(a) إذن : f تقابل

نعتبر : $c + id \in \mathbb{C}^*$

$$f \left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right) = c + id : \text{ بحيث } \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \in E : \text{ لحدد :}$$

$$f \left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right) = c + id \Leftrightarrow a + ib = c + id$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases}$$

$$f \left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right) = c + id \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix}$$

(b) إذن : f شمولي

من : (a) و (b) تقابل

2- بين أن : f تشكل من $(\mathbb{C}^*; \times)$ نحو $(E; \times)$

$$f \left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \right) \right) = f \left(\begin{pmatrix} ac - bd & -(bc + ad) \\ bc + ad & ac - bd \end{pmatrix} \right) = (ac - bd) + i(bc + ad)$$

$$f \left(\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \right) \right) = (a + bi)(c + di)$$

إذن : f تشكل من $(\mathbb{C}^*; \times)$ نحو $(E; \times)$

3- استنتاج خاصيات $(E; \times)$

بما أن : f تشكل تقابل من $(E; \times)$ نحو $(\mathbb{C}^*; \times)$

فإن : f^{-1} تشكل $(\mathbb{C}^*; \times)$ من نحو $(E; \times)$

و بما أن : قانون تركيب داخلي في \mathbb{C}^*

و تجميلي تبادلي ، يقبل عنصراً محايداً 1 ، جميع عناصر \mathbb{C}^*

تقبل مماثلاً في $(\mathbb{C}^*; \times)$

فإن : $a * b \in G$

إذن : $f_{a*b} \in F$

و منه : $f_a \circ f_b \in F$

إذن : قانون تركيب داخلي في F

- لنبين أن : تجميلي

نعتبر : $(a; b; c) \in G^3$

بما أن : قانون تركيب داخلي في G

$(a * b) * c = a * (b * c)$

$$(f_a \circ f_b) \circ f_c = f_{a * b} \circ f_c$$

$$= f_{(a * b) * c}$$

$$= f_{a * (b * c)}$$

$$= f_a \circ f_{(b * c)}$$

$$(f_a \circ f_b) \circ f_c = f_a \circ (f_b \circ f_c)$$

إذن : تجميلي في F

- لنبين أن : يقبل عنصراً محايداً

$a \in G$: نعتبر

$f_e \circ f_a = f_{e * a} = f_a$ و $f_a \circ f_e = f_{a * e} = f_a$: لدينا

إذن : يقبل عنصراً محايداً و هو

$f_{e^{-1}}$ هو f_a إذن : مماثل

و منه : جميع عناصر F تقبل مماثلاً في $(F; \circ)$

أ- بين أن : جميع عناصر F تقبل مماثلاً في $(F; \circ)$

$a \in G$ و $a^{-1} \in G$: نعتبر

$f_{a^{-1}} \circ f_a = f_{a^{-1} * a} = f_e$ و $f_a \circ f_{a^{-1}} = f_{a * a^{-1}} = f_e$: لدينا

إذن : مماثل f_a هو

و منه : جميع عناصر F تقبل مماثلاً في $(F; \circ)$

ب- بين أن : f تشكل من $(G; *)$ نحو $(F; \circ)$

$(a; b) \in G^2$: نعتبر

$f(a * b) = f_{a * b}$: لدينا

$f(a * b) = f_a \circ f_b$: إذن

إذن : f تشكل من $(G; *)$ نحو $(F; \circ)$

تمرين 6

نعتبر :

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} / (a; b) \in \mathbb{R}^2; (a; b) \neq (0; 0) \right\}$$

$$f : E \rightarrow \mathbb{C}^*$$

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mapsto a + ib$$

نعتبر التطبيق :

1- بين أن : f تقابل

2- بين أن : f تشكل من $(E; \times)$ نحو $(\mathbb{C}^*; \times)$

(مماثل $a+ib$ هو $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$)
فإن : \times قانون تركيب داخلي في E
 \times تجميلي تبادلي ، يقبل عنصراً محايداً
جميع عناصر E تقبل مماثلاً في $(E; \times)$
 $f^{-1}(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\left(\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \right) \text{ هو } \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \text{ (مماثل)}$$