

تمرين 1:

تحت درجة حرارة عالية يتفكك بنتاؤكسيد ثانوي ميثيل (g) إلى $NO_2(g)$ و $O_2(g)$ وفق تفاعل بطيء و كلي معادلته :



من أجل التتبع الزمني لهذا التفاعل نأخذ كمية n_0 من $N_2O_5(g)$ داخل حوجلة مكتملة السد حجمها $V = 0,50\text{ L}$ و نسخن المجموعة تحت درجة حرارة ثابتة $T = 318\text{ K}$.

نربط الحوجلة بمقاييس الضغط لقياس الضغط الكلي داخل الحوجلة بدلالة الزمن. حيث أنه عند $t = 0$ الضغط داخل الحوجلة هو :

$$P_0 = 463,8\text{ hPa}$$

يعطي الجدول التالي النسبة $\frac{P(t)}{P_0}$ بدلالة الزمن :

$t(s)$	0	10	20	40	60	80	100
$\frac{P(t)}{P_0}$	1,000	1,435	1,740	2,047	2,250	2,358	2,422

معطيات :

- ثابتة الغازات الكاملة : $R = 8,31\text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$.
- نعتبر أن جميع الغازات خلال التجربة غازات كاملة.

-1

بين أن : $n_0(N_2O_5) = 8,8 \cdot 10^{-3}\text{ mol}$ -1-1

اعط الجدول الوصفي لتفاعل الحاصل.

استنتج قيمة التقدم الأقصى . x_{\max} -3-1

-2

عبر عن n_G كمية المادة الكلية خلال التحول للغازات المتدخلة في التفاعل بدلالة n_0 و x . -1-2

باستعمال معادلة الحالة للغازات الكاملة بين أن : $\frac{P(t)}{P_0} = 1 + \frac{3x}{n_0}$ -2-2

أحسب النسبة : $\frac{P_{\max}}{P_0}$ -3-2

هل ينتهي التفاعل خلال $s = 100$. علل جوابك -4-2

-3

عرف زمن نصف التفاعل.

-1-3

أحسب قيمة الضغط الكلي داخل الحوجلة عند زمن نصف التفاعل.

-2-3


حدد قيمة زمن نصف التفاعل.

-3-3

تمرين 2:

تتوفر بعض السيارات على منابع صوتية تصدر موجات جيبية ترددتها $f = 680\text{ Hz}$.

نعتبر السيارة متوقفة، و نشغل المنبع الصوتي عند $t = 0$ ، حيث تنتشر الموجات الصوتية في الهواء بالسرعة $v = 340\text{ m.s}^{-1}$ ، يمثل الشكل التالي صورة الموجات عند اللحظة $t = 4T$ (T دور الموجات الصوتية).



- هل الموجة الصوتية طولية أم مستعرضة.

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

- 2 أحسب قيمة التأخر الزمني لنقطة M من وسط الإنتشار بالنسبة للمنبع S علما أن $SM = 51 m$.
- 3 أحسب قيمة دور الموجات الصوتية T .
- 4 أحسب المسافة d التي تقطعها الموجة الأولى خلال المدة $3T$.
- 5 استنتج قيمة طول الموجة λ .

نعتبر أن السيارة تقترب من شخص P متوقف جانب الطريق بسرعة v' أصغر من $v = 340 m.s^{-1}$. حيث أن المنبع يبعث الموجة الأولى عند لحظة $t=0$ علما أن الموجة الأولى تكون في الموضع S بينما تبعثر الموجة الثانية في اللحظة T عندما تكون السيارة في الموضع S' .

$$\begin{array}{c} S \\ \bullet \\ t=0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} S' \\ \bullet \\ T \end{array}$$

$$\begin{array}{c} P \\ \bullet \end{array}$$

ملاحظة : الهواء وسط غير مبدد بالنسبة للموجات الصوتية.

- 6 عبر عن المسافة SS' بدلالة v' و T .

- 7 عبر عن t_1 لحظة وصول الموجة الأولى الشخص P بدلالة SP و v .

- 8 عبر عن t_2 لحظة وصول الموجة الثانية الشخص P بدلالة T ، $S'P$ و v .


- 9 الشخص P يستقبل موجات صوتية دورها T' . بين أن : $T' = T * \frac{v - v'}{v}$

- 10 استنتاج أن تعبير تردد الموجات الملتقطة من طرف الشخص هو : $f' = f * \frac{v}{v - v'}$


- 11 علما أن الشخص P يستقبل موجات صوتية ترددتها $f' = 716 Hz$. أحسب سرعة السيارة v' بالوحدة $km.h^{-1}$.

تمرين 3:

لتحديد سرعة انتشار الصوت في الهواء، ننجز التركيب التجريبي التالي:



إذا كان المستقبلين في نفس الموضع نحصل على منحنيين متطابقين كما يوضح المنحنى التالي :



- 1 ما هي الدورية التي يبرزها المنحنى.
- 2 أحسب تردد الموجات التي يبعثها الباعث.
- 3 نزح أحد المستقبلين على منحني على المتر $x'x$ فنحصل على منحنيين على تعاكس في الطور للمرة الثانية بالنسبة لمسافة $d = 12,75 mm$.

- 1-3 مثل شكل المنحنيين الملتقطين من طرف المستقبلين.
- 2-3 أحسب قيمة λ طول الموجات فوق الصوتية المستعملة.
- 3-3 أحسب سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية.
- 4 نضبط تردد الباعث على القيمة $f' = 30 kHz$ فيصبح طول الموجات هو λ' . أحسب λ' علما أن الهواء وسط غير مبدد بالنسبة للموجات الصوتية.