

تمارين تطبيقية :

التمرين 1 :

يتفاعل محلول حمض الكلوريدريك $H_{(aq)}^+$ مع الألومنيوم $Al_{(s)}^{3+}$ حسب تفاعل كلي ينتج غاز ثبائي الهيدروجين و أيونات الألومنيوم Al^{3+} . عند اللحظة $t = 0$ ، ندخل الكتلة $m = 0,80\text{g}$ من حبيبات الألومنيوم في حوجلة تحتوي على الحجم $V_A = 60,0\text{mL}$ من محلول حمض الكلوريدريك تركيزه $C_A = 0,180\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

بواسطة تركيب مناسب نقيس حجم ثبائي الهيدروجين الناتج ، فنحصل على المنهجى الممثل جانبه .

1) أكتب معادلة التفاعل .

2) أحسب كميات المادة البدئية للمتفاعلات .

3) أنشئ الجدول الوصفي لتقدم التفاعل ، ثم حدد المتفاعل المهد و التقدم الأقصى x_{max} .

4) استنتاج حجم غاز ثبائي الهيدروجين المتضاعد عند نهاية التفاعل .

5) حدد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ للمجموعة الكيميائية .

نعطي : $V_m = 22,0 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$; الحجم المولى للغاز $M(Al) = 27,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

حل التمرين 1 :

1) التفاعل تفاعل أكسدة - اختزال معادلته :

2) كميات المادة البدئية للمتفاعلات :

$$n_i(H^+) = C_A \cdot V_A = 0,180 \text{ mol} \cdot (60 \text{ L}) = 10,8 \text{ mol}$$

$$n_i(A\ell) = \frac{m}{M(A\ell)} = \frac{0,80}{27,0} = 0,03 \text{ mol}$$

3) جدول التقدم :

معادلة التفاعل					كمية المادة	
$6H_{(aq)}^+$	+	$2A\ell_{(s)}$	\rightarrow	$3H_{2(g)}$	$2A\ell_{(aq)}^{3+}$	
$n(H^+)$		$n(A\ell)$		$n(H_2)$	$n(A\ell^{3+})$	التقدم
$10,8 \text{ mol}$		$0,03 \text{ mol}$		0	0	البدئية
$10,8 \text{ mol} - 6x(t)$		$0,03 \text{ mol} - 2x(t)$		$3x(t)$	$2x(t)$	خلال التفاعل

بما أن $\frac{n_i(H^+)}{6} < \frac{n_i(A\ell)}{2}$ فإن المتفاعل المهد هو H^+ ومنه :

4) التفاعل كلي و بذلك فإن التقدم النهائي x_f يساوي التقدم الأقصى اعتمادا على الجدول الوصفي نكتب :


$$n_f(H_2) = \frac{V_f(H_2)}{V_m} = 3x_f$$

$$V_f(H_2) = 3x_f \cdot V_m = 3x_f \cdot (10,8 \text{ mol} \cdot 22,0 \text{ L}) = 119 \text{ mL}$$

5) زمن نصف التفاعل هو الزمن الذي يوافق نصف التقدم النهائي


$$V_f(H_2)(t_{1/2}) = \frac{V_f(H_2)}{2} = 59,5 \text{ mL}$$

أقصى النقطة الموافقة تساوي $t_{1/2}$. نحصل مبيانيا على : (الشكل أسفله) .



التمرين 2 :

تخترل أيونات النحاس Cu^{2+} بواسطة وفرة من مسحوق الزنك ، حسب المعادلة :





خلال تجربة منجزة عند $20^\circ C$ توصلنا إلى تحديد (t) $[Cu^{2+}]$

و قمنا بخط المحننى الممثل في الشكل جانبه :

1) حدد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

2) عبر عن السرعة الحجمية للتفاعل و حدد قيمتها عند اللحظة $t = 0$ ثم عند اللحظة $t_{1/2}$. ما العامل الحرکي الذي تم إبرازه ؟



حل التمرين 2 :

1) نعبر عن التركيز $[Cu^{2+}]$ بدالة التقدم (يمكن إنشاء الجدول الوصفي) :

$$[Cu^{2+}] = \frac{n(Cu^{2+})(t)}{V} = \frac{n_i(Cu^{2+}) - x(t)}{V} = C_0 - \frac{x(t)}{V}$$

حسب المبيان ، $[Cu^{2+}]$ تؤول إلى 0 مع مرور الزمن ،

$$\frac{x_f}{V} = C_0 \quad \text{نستنتج أن :}$$

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} \quad : t = t_{1/2}$$

$$\frac{x(t_{1/2})}{V} = \frac{x_f}{2 \cdot V} = \frac{C_0}{2} = [Cu^{2+}](t_{1/2}) \quad \text{و منه :}$$

نقرأ على المبيان : $t_{1/2} = 32 \text{ min}$ ثم $C_0 = 320 \text{ mmol.l}^{-1}$

2) نعرف السرعة الحجمية للتفاعل بالعلاقة : $v(t) = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx(t)}{dt}$

حسب العلاقة السابقة بين $x(t)$ و $[Cu^{2+}]$ نكتب :

$$x(t) = n_i(Cu^{2+}) - V \cdot [Cu^{2+}]$$

بما أن الحجم V للمحلول و كمية المادة البدئية $(n_i(Cu^{2+}))$ ثابتان

$$v(t) = - \frac{d[Cu^{2+}](t)}{dt} \quad \text{نستنتج :}$$

نرسم مماس المحننى عند اللحظة $t = 0$ ثم نحدد معامله الموجه a (أنظر المبيان أعلاه) .

$$a = \frac{\overline{AB}}{\overline{OB}} = \frac{0 - 320}{44 - 0} = -7,3 \quad \text{نقرأ على المبيان :}$$

$$v(0) = 7,3 \text{ mmol.l}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} \quad \text{نستنتج :}$$

بنفس الطريقة ، نرسم مماس المحننى عند النقطة M و نحدد معاملها الموجه a' .

$$a' = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{OB'}} = \frac{0 - 270}{80 - 0} = -3,4 \quad \text{نقرأ على المبيان :}$$

$$v(t_{1/2}) = 3,4 \text{ mmol.l}^{-1} \cdot \text{min}^{-1} \quad \text{نستنتج :}$$

السرعة الحجمية للتفاعل تتنقص بتناقص تركيز المتفاعلات .

التمرين 3 : تتبع تحول كيميائي بقياس المواصلة

هذه المعلومات التقطت من الإنترنيت خلال بحث أنجز من طرف مجموعة من التلاميذ : " الدفأة السحرية " عبارة عن جيب بلاستيكي يحتوي على سائل ملؤن وشبه شفاف . بعد الضغط على قطعة فلزية صغيرة توحد بالجيب . تبلور السائل يتم خلال بعض الثواني مع انتشار حرارة مهمة ، حيث درجة الحرارة تقارب 50°C . يستعمل هذا الجيب " الدفأة السحرية " أثناء التجوال في الثلوج لتدفئة اليدين .

عندما تصبح الدفأة السحرية صلبة ، توضع في حمام مريم بعض الدفائق لكي تصبح قابلة للاستعمال من جديد .

مكونات الدفأة السحرية :

- كيس صغير من مادة P.V.C .
- ماء مشبّع بالأسبيرات (أو الإيتانولات) الصوديوم
- قطعة فلزية .

هدف هذا التمرين هو دراسة التحول الذي يؤدي إلى الحصول على إيتانولات الصوديوم ، النوع الكيميائي الموجود في الدفأة السحرية . ثم بعد ذلك شرح الظاهرة .

1) الدراسة الحركية لتصنيع إيتانولات الصوديوم بقياس المواصلة .

لتصنيع إيتانولات الصوديوم في المختبر ، نمزج بين إيتانولات الإتيل $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ و محلول هيدروكسيد الصوديوم عند درجة الحرارة العادية . المعادلة المنموج لهذا التفاعل هي :

$$\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})} + \text{C}_4\text{H}_8\text{O}_{2(\ell)} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6\text{O}_{(\ell)} + \text{CH}_3\text{CO}_2_{(\text{aq})} + \text{Na}^+_{(\text{aq})}$$

نذكر أن موصالية محلول يعبر عنها حسب العلاقة :

حيث $[\text{X}_i]$ يمثل تركيز نوع أيوني في محلول و λ_i الموصالية المولية الأيونية لهذا النوع .

معطيات :

- الموصاليات المولية الأيونية عند 20°C لبعض الأيونات :

CH_3CO_2^-	HO^-	Na^+	الأيون
$4,1 \times 10^{-3}$	20×10^{-3}	$5,0 \times 10^{-3}$	$\lambda \text{ بوحدة S.m}^2.\text{mol}^{-1}$

- الكتلة المولية الجزيئية لإيتانولات الإتيل :

$$M = 88 \text{ g.mol}^{-1}$$

- الكتلة الحجمية لإيتانولات الإتيل :

$$\rho = 0,90 \text{ g.m}^{-3}$$

نضع الحجم $V_0 = 200 \text{ mL}$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم ذي التركيز المولي $C_0 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ في كأس . عند لحظة $t = 0 \text{ min}$ نضيف الحجم $V_1 = 1,0 \text{ mL}$ من إيتانولات الإتيل فتحصل على خليط تفاعلي نرمز له ب S ، نضع في نفس الوقت كذلك خلية قياس الموصالية و التي ترتبط بحاسوب يمكن من تتبع الموصالية σ للوسط التفاعلي S مع مرور الزمن . درجة حرارة الوسط تبقى ثابتة وتساوي 20°C .

1 - 1 أحسب كمية المادة البديئية n_0 لأيونات الهيدروكسيد المتواجدة في الحجم V_0 .

1 - 2 أحسب كمية المادة البديئية n_1 لإيتانولات الإتيل المتواجدة في الحجم V_1 .

1 - 3 باعتبار التفاعل كلي ، أتمم حرفيا جدول تطور التحول التالي :


المعادلة الكيميائية					
كميات المادة (mol)					الحالة المجموعة
n_0					الحالة البديئية
				n_0	0
n_0				n_0	X
n_0				n_0	X_f

4 - 1 من هو المتفاعّل المحدّد ؟

5 - 1 نهمّل الحجم V_1 أمام الحجم V_0 ز نرمز للحجم الكلي لل الخليط S ب V حيث نعتبر $V_0 = V$. كما نهمّل كذلك التحلل الذاتي البروتوني للماء .

5 - 1 اشرح كيفيا لماذا موصالية الوسط التفاعلي تنقص بين اللحظة $t = 0 \text{ min}$ و الحالة النهائية ؟


2 - 5 - 1 بَيْنَ اعْتِمَاداً عَلَى الجُدُول الوصْفِي أَنَّ المُوصِلِيّة σ لِلخَلِيل S عِنْد لِحْظَة t تَحْقِيقُ الْعَلَاقَة : $\sigma = A + B \cdot x$ مع : $B = -770 \text{ mS} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ، $A = 25 \text{ mS} \cdot \text{m}^{-1}$. 6 - 1 التَّبَعُ بِقِيَاسِ المُوصِلِيّة مَكْمُون ، تَمَثِّلَهُ التَّنَطُّهُ الْأَمْنِي لِلْمُوصِلِيّة (الشَّكَّا) :



- 1 - 6 - 1 بِتَعْلِيلِ الْجَواب ، صُفِّ كَيْفَ تَنْتَطُّهُ السُّرْعَةُ الْحَجمِيَّةُ مَعَ مَرْوُرِ الزَّمْنِ .
 2 - 6 - 1 عَرَفْ ثُمَّ حَدَّدْ قِيمَة زَمْنِ نَصْفِ التَّفَاعُل $t_{1/2}$.
 7 - 1 نَفَسِ التَّجْرِيَّة أَنْجَزَتْ مِنْ جَدِيدٍ فِي كَاسٍ وَضَعَ فِي حَمَامٍ مَرِيمٍ دَرْجَةُ حَرَارَتِه 40°C . لِنَعْتَبِر $t_{1/2}$ قِيمَة زَمْنِ نَصْفِ التَّفَاعُل :

C	B	A	الجواب
$t_{1/2} > t_{1/2}$	$t_{1/2} = t_{1/2}$	$t_{1/2} < t_{1/2}$	

- 8 - 1 عَبَرْ عَنْ تَرْكِيزِ أَيُونَاتِ الْهِيدْرُوكَسِيد HO^- عِنْد لِحْظَة $t_{1/2}$ بِدَلَالَة C_0 .
 9 - 1 لِحْسَابِ زَمْنِ نَصْفِ التَّفَاعُل أَنْشَئَ تَلَمِيذُ الْمُنْحَنِيِّ الْمُمَثَّل L $\ln\left(\frac{C_0}{[\text{HO}^-]}\right) = f(t)$ فَحَصَلَ عَلَى مَبَيَّنَ الشَّكَّل 3 :



- 1 - 9 - 1 بِتَحْلِيلِ هَذَا الْمَبَيَّن ، بَيْنَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ نَكْتُبَ : $\ln\left(\frac{C_0}{[\text{HO}^-]}\right) = k \cdot t$. $k = 0,4 \text{ min}^{-1}$ مع

- 2 - 9 - 1 بَيْنَ أَنْ زَمْنَ نَصْفِ التَّفَاعُلِ لَهُ التَّعبِيرُ : $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$.
- 3 - 9 - 1 أَحْسَبْ قِيمَةً $t_{1/2}$ وَ قَارِنَهَا بِتِلْكَ الْمَحْصُلِ عَلَيْهَا فِي السُّؤَالِ (2 - 6 - 1) .

2 - كَيْفَ نَفَسِرُ انتِشارَ الْحَرَارَةَ ؟

ذُوبانَ أُسِيَّنَاتِ الصُّودِيُّومِ ($\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$) فِي المَاءِ تَحُولُ مَاصَ لِلْحَرَارَةِ . حِيثُ يَحْتَاجُ إِلَى طَاقَةً لِتَكْسِيرِ الْبَنِيَّةِ الْبَلُوَرِيَّةِ وَالْحَصُولِ عَلَى أَيُونَاتِ CH_3CO_2^- وَ Na^+ . عِنْدَ دَرْجَةِ الْحَرَارَةِ الْعَادِيَّةِ ذُوبانَ أُسِيَّنَاتِ الصُّودِيُّومِ تَحُولُ جَدَّ مَحْدُودٍ . تَحْتَوِي الدَّفَأَةُ السُّحْرِيَّةُ عَلَى مَحْلُولٍ غَيْرِ مُسْتَقْرٍ ، حِيثُ بِهِ كَمِيَّةٌ مَادَّةٌ مَذَابَةٌ أَكْثَرُ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَذْبِيَهُ فِي الْحَالَةِ الْعَادِيَّةِ . لَذَا فَأَيُّ تَأْثِيرٍ خَارِجِيٍّ عَلَى الْمَحْلُولِ يَؤْذِي إِلَى تَرْسِبٍ (أَوْ تَبْلُورٍ) الْمَادَّةِ . هَذَا التَّبْلُورُ عَكْسُ الذُّوبَانِ تَحُولُ نَاسِرٌ لِلْحَرَارَةِ .

- 1 - اعْتَمَادًا عَلَى الإِشَارَاتِ الْمُعَطَّةِ أَعْلَاهُ وَالنَّصِّ التَّقْدِيمِيِّ ، حَدَّدْ التَّأْثِيرَ الْخَارِجِيَّ الَّذِي يَحْدُثُ التَّبْلُورَ دَاخِلَ الدَّفَأَةِ .
- 2 - اكْتُبْ مَعَادِلَةً تَفَاعُلِ التَّرْسِبِ الَّذِي يَحْدُثُ فِي الدَّفَأَةِ .
- 3 - اشْرُحْ ارْتِفَاعَ دَرْجَةِ حَرَارَةِ الدَّفَأَةِ الَّتِي يَشْعُرُ بِهَا الْمُسْتَعْمَلُ .