

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

التحولات المقرونة بالتفاعلات حمض- قاعدة في محلول مائي.

## 1- الجداء الأيوني للماء

### 1-1- التحليل البروتوني الذاتي للماء

- للماء الحالص عند  $25^{\circ}\text{C}$  ، موصلية  $5,5 \cdot 10^{-6} \text{ S/m}$  و  $\sigma_{\text{H}_2\text{O}} = 5,5 \cdot 10^{-6} \text{ S/m}$  (pH=7,0) موصلية غير منعدمة و هذا يدل على وجود ايونات بالماء
- الماء  $\text{H}_2\text{O}$  قاعدة للمزدوجة  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}/\text{OH}^-_{(\text{aq})}$  ، و حمض للمزدوجة  $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}/\text{OH}^-_{(\text{aq})}$  . معادلة التفاعل بين الحمض  $\text{H}_2\text{O}$  و القاعدة  $\text{H}_2\text{O}$  هو  $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$  و تسمى معادلة التحلل البروتوني الذاتي للماء و هو تحول جد محدود
- نسمى ثابتة التوازن المقرن بمعادلة التحلل البروتوني الذاتي للماء بالجاء الأيوني للماء تعبيره :  $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$  مثل:

درجة الحرارة	$80^{\circ}\text{C}$	$60^{\circ}\text{C}$	$25^{\circ}\text{C}$
قيمة $K_e$	$2,5 \cdot 10^{-13}$	$1,0 \cdot 10^{-13}$	$1,0 \cdot 10^{-14}$

\* يمكن كذلك تعريف مقدار آخر هو :

### 1-2- المحاليل المحايدة و الحمضية و القاعدية

الحالات القاعدية	الحالات المحايدة	الحالات الحمضية
$[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$ $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+]$ $[\text{H}_3\text{O}^+]^2 < K_e$ $\text{pH} > \frac{K_e}{2}$	$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$ $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+]$ $[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_e$ $\text{pH} = \frac{K_e}{2}$	$[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$ $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+]$ $[\text{H}_3\text{O}^+]^2 > K_e$ $\text{pH} < \frac{K_e}{2}$

مثال :  $25^{\circ}\text{C}$  عند pH



## 2- ثابتة الحمضية لمزدوجة حمض قاعدة

### 2-1- تعریف

تكتب معادلة التفاعل الذي يحدث عند ذوبان حمض AH في الماء كالتالي :

\* نسمى ثابتة التوازن المقرنة بهذا التفاعل ، ثابتة الحمضية نرمز لها بـ  $K_A$  و نعبر عنها ب:

$$K_A = \frac{[A^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[HA]}$$

\* نعرف الثابتة  $pK_A$  للمزدوجة HA/A<sup>-</sup> بالعلاقة :  $pK_A = -\log K_A$  25^{\circ}\text{C}

$pK_A$	$K_A$	المزدوجة
4,8	$1,58 \cdot 10^{-5}$	$\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}/\text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})}$
9,2	$6,3 \cdot 10^{-10}$	$\text{NH}_4^+_{(\text{aq})}/\text{NH}_3_{(\text{aq})}$

ملحوظة :  $K_A$  لا تتعلق إلا بدرجة الحرارة و بطبيعة الحمض

### 2-2- العلاقة بين الـ pH و ثابتة الحمضية . $K_A$

بالنسبة لمزدوجة A/B نكتب :  $pK_A = \frac{[B][\text{H}_3\text{O}^+]}{[A]}$  . العلاقة بين pH و  $pK_A$  .

$$-\log K_A = -\log \left( \frac{[B]}{[A]} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] \right) = -\log \left( \frac{[B]}{[A]} \right) - \log ([\text{H}_3\text{O}^+])$$

$$pK_A = -\log \left( \frac{[B]}{[A]} \right) + \text{pH}$$

$$\text{pH} = pK_A + \log \left( \frac{[B]}{[A]} \right)$$

### 2-3- ثابتة التوازن المقرنة بتفاعل حمض - قاعدة .

نعتبر التفاعل حمض- قاعدة بين المزدوجتين

$\text{K}(\text{AH}_{(\text{aq})}/\text{A}^-_{(\text{aq})})$  ذات ثابتة الحمضية  $\text{K}(\text{AH}_{(\text{aq})}/\text{A}^-_{(\text{aq})})$  و  $\text{K}(\text{BH}_{(\text{aq})}/\text{B}^-_{(\text{aq})})$  ذات ثابتة الحمضية  $\text{K}(\text{BH}_{(\text{aq})}/\text{B}^-_{(\text{aq})})$

معادلة التفاعل  $\text{AH}_{(\text{aq})} + \text{B}^-_{(\text{aq})} \leftrightarrow \text{A}^-_{(\text{aq})} + \text{BH}_{(\text{aq})}$  تعبير ثابتة التوازن :

\* تعبير ثابتة الحمضية  $\text{K}_A(\text{AH}_{(\text{aq})}/\text{A}^-_{(\text{aq})}) = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$  :

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

$$K_A(BH_{(aq)}/B^-_{(aq)}) = \frac{[B^-] \cdot [H_3O^+]}{[BH]} : K_A(BH_{(aq)}/B^-_{(aq)})$$


تعبر تابعة التوازن  $K$  بدلالة  $K(AH_{(aq)}/A^-_{(aq)})$  و

$$K = \frac{[BH] \cdot [A^-]}{[B^-] \cdot [AH]} = K = \frac{[BH] \cdot [A^-]}{[B^-] \cdot [AH]} \cdot \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]} = \frac{[A^-] \cdot [H_3O^+]}{[B^-] \cdot [AH]}$$

$$K = \frac{K_A(\text{الحمض المتفاعل})}{K_A(\text{الحمض الناتج})} \text{ اي } K = \frac{K_A(AH_{(aq)}/A^-_{(aq)})}{K_A(BH_{(aq)}/B^-_{(aq)})}$$

## 3- مقارنة سلوك الأحماض في محلول مائي

### 3-1- مقارنة سلوك الأحماض في محلول مائي



بتفاعل الحمض مع الماء فإن تابعة التوازن هي تابعة الحمضية  $K = K_A = \frac{[B][H_3O^+]}{[A]}$  مع  $\tau = \frac{[H_3O^+]}{c}$  مع  $K = K_A = \frac{[B][H_3O^+]}{[A]}$

$$\text{نجد } K_A = \frac{C\tau^2}{1-\tau}$$

بالنسبة لتركيز نفسها يكون حمض أقوى ( $\tau$  كبيرة) كلما كانت تابعة الحمضية  $K_A$  كبيرة اي ( $pK_A$  اصغر)

### 3-2- مقارنة سلوك القواعد في محلول مائي

بتفاعل القاعدة مع الماء فإن تابعة التوازن  $K = \frac{[OH^-]}{c}$  مع  $\tau = \frac{[OH^-]}{c}$  مع  $K = \frac{[OH^-]}{c}$  مع  $K = \frac{[OH^-]}{c}$

$$K_A(A/B) = \frac{K_e}{K} = \frac{1-\tau}{C\tau^2} \cdot K_e \text{ ومنه } K = \frac{K_e(H_2O/OH^-)}{K_A(A/B)}$$

نستنتج ان بالنسبة لتركيز نفسها تكون قاعدة أقوى ( $\tau$  كبيرة) ، كلما كانت تابعة الحمضية  $K_A$  صغيرة اي ( $pK_A$  اكبر)

## 4- مخطط الهيمنة والتوزيع:


### 4-1- مخطط الهيمنة

بالنسبة لمزدوجة  $A_{(aq)}/B_{(aq)}$  في محلول مائي ، تتحقق العلاقة:  $pH = pK_A + \log \frac{[B]}{[A]}$

- إذا كان  $pH < pK_A$  : اي  $1 < [A] > [B]$  و التالي  $10^{(pH-pK_A)}$  : الحمض مهيمن في الوسط

- إذا كان  $pH = pK_A$  : اي  $0 = [A] = [B]$  و التالي:  $10^{(pH-pK_A)}$  تساوي هيمنة الحمض و القاعدة

- إذا كان  $pH > pK_A$  : اي  $1 > [A] < [B]$  و التالي  $10^{(pH-pK_A)}$  : القاعدة مهيمنة في الوسط



### 4-2- مخطط التوزيع

لنعتبر محلولا مائيا ، يحتوي على الحمض A و قاعدته المرافقة B .

$$\alpha(A) = \frac{[A]}{[A]+[B]}$$

$$\alpha(B) = \frac{[B]}{[A]+[B]}$$

\* يمثل المخطط المقابل ، مخطط التوزيع لنوعي المزدوجة A/B ، تطور (%) للحمض و القاعدة بدلالة pH المحلول ، عند نفس درجة الحرارة .

\* عند تقاطع المنحنيين ، يكون  $\alpha(A) = \alpha(B)$  و منه:  $pH = pK_A$  اي أن:  $[A] = [B]$

### 4-3- حالة الكواشف الملونة

\* **تعريف:** الكاشف الملون حمضي-قاعدي ، مزدوجة حمضية-قاعدية ، نرمز لها بـ  $HInd/Ind^-$  ، بحيث يكون للشكليين الحمضي  $HInd$  و القاعدي  $Ind^-$  لونان مختلفان في محلول مائي.

$$K_{A,Ind} = \frac{[Ind^-][H_3O^+]}{[HInd]}$$

### مجال هيمنة لون الحمض و لون القاعدة

\* إصطلاحا نقبل ان لون القاعدة يغلب في الوسط إذا كان تركيز القاعدة  $Ind^-$  اكبر بعشر مرات من تركيز الحمض  $HInd$  اي  $[Ind^-] > 10^{pK_{A,Ind} + 1}$  مع  $pH = pK_{A,Ind} + \log \frac{[Ind^-]}{[HInd]}$  و بالتالي  $pH > pK_{A,Ind} + 1$  نجد

\* إصطلاحا نقبل ان لون الحمض يغلب في الوسط إذا كان تركيز الحمض  $HInd$  اكبر بعشر مرات من تركيز القاعدة  $Ind^-$  اي  $[HInd] > 10^{pK_{A,Ind} - 1}$  مع  $pH = pK_{A,Ind} + \log \frac{[HInd]}{[Ind^-]}$  و بالتالي  $pH < pK_{A,Ind} - 1$  نجد

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

\* **منطقة انعطاف الكاشف الملون** : هي المنطقة التي يغير فيها الكاشف الملون لونه من لون الصيغة القاعدية الى لون الصيغة الحمضية او العكس

$$pK_{A,Ind}-1 < pH < pK_{A,Ind}+1$$


في هذه الحالة يأخذ الكاشف الملون لون وسطياً بين لوني الحمض و القاعدة يسمى لونية حساسة- teinte sensible



\* **بعض الكواشف الملونة ومميزاتها**

لون الشكل الحمضي	منطقة الانعطاف	لون الشكل القاعدي	الكاشف الملون
أحمر	1,2 - 2,8	أصفر	أزرق الميتاكروزيل
أحمر	3,1 - 4,4	أصفر	الهيليانتين
أصفر	3,8 - 5,4	أزرق	أخضر البروموكريزول
أصفر	4,8 - 6,4	أحمر	أحمر الكلوروفينول

## 5- المعايرة حمض-قاعدة بقياس pH .



\* **مبدأ المعايرة** تهدف المعايرة الى تحديد تركيز محلول مجهول و ذلك بانجاز تفاعل حمض - قاعدة يسمى تفاعل المعايرة و يجب ان يكون سريعا و كليا و انتقائيا

\* **التركيب التجريبي**

### \* التكافؤ الحمضي - القاعدي

عند التكافؤ يكون الخليط متناسبا و تستهلك المتفاعلات وفق المعاملات التنسابية

$$\text{ونكتب } \frac{n(A)}{a} = \frac{n(B)}{b}$$


في كل تحول حمضي قاعدي  $a=b=1$

$$\text{علاقة التكافؤ الحمضي القاعدي } C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_B \text{ اي } n(A) = n(B)$$

### \* تحديد نقطة التكافؤ.

طريقة الدالة المشتقة	طريقة المماسات
$\frac{dpH}{dV_B} = g(V_B)$ نرسم المنحنيين $pH=f(V_B)$ و $\frac{dpH}{dV_B} = g(V_B)$ حيث تمثل $pH=f(V_B)$ الدالة المشتقة $\frac{dpH}{dV_B} = g(V_B)$ بدلالة الحجم $V$ عند نقطة التكافؤ تأخذ الدالة $pH=f(V_B)$ قيمة قصوى : في حالة معايرة الحمض بالقاعدة قيمة دنيا : في حالة معايرة القاعدة بالحمض	$pH=f(V_B)$ في نقطتين $T_1$ و $T_2$ للمنحنى $pH=f(V_B)$ في $T_1$ و $T_2$ موجود على نفس المسافة بينهما نقطة تقاطع مع المنحنى $pH=f(V)$ . تسمى $E$

## 5-2. المعايرة الملوانية حمض-قاعدة



هي معايرة حمضية - قاعدية حيث نعمل معلمة التكافؤ بتغيير لون الوسط و ذلك باستعمال كاشف ملون مناسب

يكون الكاشف الملون صالحًا لتحديد التكافؤ خلال معايرة حمضية قاعدية إذا كانت منطقة انعطافه تضم قيمة  $pH_E$  المحلول عند التكافؤ

[منطقة انعطاف الكاشف الملون]  $pH_E \in [$

## 6- نسبة التقدم النهائي لتفاعل المعايرة الحمضية القاعدية.

المعايرة القاعدة بالحمض	المعايرة الحمض بالقاعدة	معادلة التفاعل
$A^-(aq) + H_3O^+(aq) \rightarrow AH(aq) + H_2O(l)$ <p>قبل التكافؤ: الحمض <math>H_3O^+</math> متفاعل م Hod  <math>n(A) - x_m = 0</math>  <math>x_m = n(A) = C_A \cdot V_A</math> ومنه</p>	$AH(aq) + HO^-(aq) \rightarrow A^-(aq) + H_2O(l)$ <p>قبل التكافؤ: القاعدة <math>OH^-</math> متفاعل م Hod  <math>n(B) - x_m = 0</math>  <math>x_m = n(B) = C_B \cdot V_B</math> ومنه</p>	تحبير $x_m$
$[H_3O^+] = \frac{n(A) - x_f}{V_A + V_B} = 10^{(-pH)}$ $x_f = C_A \cdot V_A - (V_A + V_B) \cdot 10^{(-pH)}$	$[OH^-] = \frac{n(B) - x_f}{V_A + V_B} = 10^{(pH - pK_e)}$ $x_f = C_B \cdot V_B - (V_A + V_B) \cdot 10^{(pH - pK_e)}$	تحبير $x_f$
$\tau = \frac{C_A \cdot V_A - (V_A + V_B) \cdot 10^{(-pH)}}{C_A \cdot V_A}$	$\tau = \frac{C_B \cdot V_B - (V_A + V_B) \cdot 10^{(pH - pK_e)}}{C_B \cdot V_B}$	تحبير $\tau$