

| | |
|------------------------------|--|
| 2 ^{ème} Bac (PC) | التحولات المقرونة بالتقاعلات حمض قاعدة |
|------------------------------|--|

التمرين 1

المواد الحافظة مواد تطيل مدة صلاحية المواد الغذائية القابلة للاستهلاك وتحميها من التعفنات الناتجة عن الطفيليات المجهرية . وتُعرف في المواد الغذائية وفي المشروبات برموز من **E200** إلى **E297** . فحمض البنزويك C_6H_5COOH يرمز له بالرمز **E210** . وبنزوات الصوديوم C_6H_5COONa يرمز له بـ **E211** . وهي مواد تستعمل في الصناعة كمواد حفظة للمواد الغذائية لكونها مبيدات ومضادات للبكتيريا ، ويوجдан خصوصا في المشروبات الغازية **<Light>** .

الحالات توازن مجموعة كيميائية:

نذيب كتلة m_0 من حمض البنزويك C_6H_5COOH في الماء المقطر ، فنحصل على محلول مائي (S_0) لحمض البنزويك حجمه $V_0 = 100\text{ mL}$ وتركيزه $C_A = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ، وله $pH = 3,1$.

(1) أحسب قيمة الكتلة m_0 .

(2) أكتب معادلة تفاعل حمض البنزويك مع الماء .

(3) أنشئ جدول تقدم التفاعل .

(4) عبر عن نسبة التقدم النهائي للتفاعل τ بدلالة C_A و $[H_3O^+]$. أحسب قيمته . استنتج .

(5) أعط تعبير خارج التفاعل $Q_{r,eq}$ في حالة التوازن ، ثم أثبت أن $Q_{r,eq} = \frac{[H_3O^+]^2}{C_A - [H_3O^+]}$. أحسب $Q_{r,eq}$.

(6) تحقق من قيمة ثابتة الحمضية $(K_A(C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-))$ معطيات :

الكتلة المولية : $M(C_6H_5COOH) = 122 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

ثابتة الحمضية للمزدوجة $C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$ عند 25°C

الجاء الأيوني للماء : $K_e = 10^{-14}$

التمرين 2

نمزج محلولا مائيا لكلورور الأمونيوم (NH_4^+ / Cl^-) بمحلول مائي لإيثانوات الصوديوم (CH_3COO^- / Na^+) .

نعتبر أن CH_3COO^- و NH_4^+ لا يتفاعلان مع الماء .

(1) أكتب معادلة التفاعل الممكن حدوثه .

(2) أعط العلاقة بين ثابتة التوازن K لهذا التفاعل والتراكيز عند التوازن .

(3) حدد المزدوجتان قاعدة/حمض المتداخلتان في هذا التفاعل .

(4) أعط العلاقات بين التراكيز عند التوازن وثابتى الحمضية K_{A1} للمزدوجة الأولى و K_{A2} للمزدوجة الثانية .

(5) عبر عن K بدلالة K_{A1} و K_{A2} وأحسب قيمتها .

(6) استنتاج ما إذا كان التفاعل كليا أم محدودا .

معطيات: $pK_{A2}(CH_3COOH / CH_3COO^-) = 4,8$ و $pK_{A1}(NH_4^+ / NH_3) = 9,2$

التمرين 3

ت تكون الأسيرين من حمض الأستيل ساليسيليك $C_7H_7O_4H$ ذي **pK_A = 3,49** .

نذيب نصف قرص من الأسيرين في الماء المقطر ، فنحصل على حجم V من محلول مائي له $pH = 2,70$.

(1) أكتب معادلة تفاعل حمض الأستيل ساليسيليك مع الماء .

(2) أحسب ثابتة الحمضية للمزدوجة قاعدة/حمض .

(3) أحسب النسبة لتركيز الحمض على تركيز قاعدته المرافقة في محلول . ماذا تستنتج ؟

| | |
|------------------------------|--|
| 2 ^{ème} Bac (PC) | التحولات المقرونة بالتفاعلات حمض قاعدة |
|------------------------------|--|

التمرين 1

حمض الأسكوربيك $C_6H_8O_6$ أو فيتامين C مادة طبيعية توجد في عدد كبير من المواد الغذائية ذات أصل نباتي وعلى الخصوص في المواد الطازجة والخضير والفاكهه . كما يمكن تصنيعه في مختبرات الكيمياء .
تابع فيتامين C في الصيدليات على شكل أقراص وهو مركب مضاد للعدوى ومنتشر للجسم ويساعد على نمو العظام والأوتار والأسنان ... ويؤدي نقصه في التغذية لدى الإنسان إلى ظهور داء الحفر . يعرف فيتامين C بالرمز **E300** .

معطيات :

► المزدوجة قاعدة/حمض : $(C_6H_8O_6 / C_6H_7O^-)$

► الكتلة المولية لحمض الأسكوربيك : $M(C_6H_8O_6) = 176 \text{ g.mol}^{-1}$

► ثابتة الحمضية :

$$pK_A(C_6H_8O_6 / C_6H_7O^-) = 4,05$$

$$pK_A(C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-) = 4,20$$

1) تحديد خارج تفاعل حمض الأسكوربيك مع الماء بقياس pH

نعتبر محلولا مائيا لحمض الأسكوربيك $C_6H_8O_6$ وتركيزه المولي $C_1 = 1.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. أعطى قياس pH هذا محلول عند $25^\circ C$ القيمة $pH = 3,01$

1.1) أكتب معادلة تفاعل حمض الأسكوربيك مع الماء .

2.1) أنشئ الجدول الوصفي لهذا التفاعل .

3.1) أحسب α نسبة التقدم النهائي للتفاعل . هل التحول كلي ؟

4.1) المجموعة الكيميائية في حالة توازن : أوجد خارج التفاعل $Q_{r,eq}$.

5.1) استنتج قيمة ثابتة التوازن K المقرونة بهذا التفاعل

2) تحديد كتلة حمض الأسكوربيك في قرص فيتامين **C500**

نسحق قرصا من فيتامين $C500$ ونذببه في قليل من الماء ؛ ثم ندخل الكل في حوجلة معيارية من فئة 200 mL نضيف الماء المقطر حتى الخط المعياري ونحرك . فنحصل على محلول مائي (S) تركيزه المولي $C_A = 10,0 \text{ mol.L}^{-1}$. نأخذ حجما $V_A = 10,0 \text{ mL}$ من محلول (S) ونعايره بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم ($Na^+ + HO^-_{(aq)}$) تركيزه المولي $C_B = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. يحصل التكافؤ حمض - قاعدة عند صب الحجم $V_{B,E} = 9,5 \text{ mL}$.


1.2) أكتب معادلة التفاعل حمض - قاعدة بين حمض الأسكوربيك وأيونات الهيدروكسيد .

2.2) أوجد قيمة C_A .

3.2) استنتاج قيمة m كتلة حمض الأسكوربيك الموجودة في القرص . فسر التسمية "فيتامين **C500**"

3) تطور مجموعة كيميائية :

يمكن تفادي تحلل حمض الأسكوربيك في عصير فاكهة بإضافة بنزوات الصوديوم المعروف بالرمز **E211** إلى هذا العصير حيث يتفاعل حمض الأسكوربيك مع أيون البنزوات $C_6H_5COO^-_{(aq)}$ وفق المعادلة الكيميائية التالية :



1.3) عبر عن ثابتة التوازن K المقرونة بهذا التفاعل بدالة ثابتة الحمضية للمزدوجتين (قاعدة/حمض) المترافقتين ثم أحسب قيمتها

2.3) قيمة خارج التفاعل للمجموعة الكيميائية في الحالة البدئية $Q_{r,0} = 1,41$. هل تتطور المجموعة الكيميائية أم لا ؟ علل جوابك

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

التمرين 2

يعتبر الخل التجاري محلولاً مائياً لحمض الإيثانويك CH_3COOH ويتميز بدرجة حموضية (X°) ، والتي تمثل الكتلة X بالغرام (g) لحمض الإيثانويك الموجود في 100g من الخل.

المعطيات : تمت جميع القياسات عند $25^\circ C$.

► الكتلة الحجمية للخل : $\rho = 1g.mL^{-1}$

► الكتلة المولية لحمض الإيثانويك : $M(CH_3COOH) = 60 g.mol^{-1}$

► الموصليات المولية : $\lambda(CH_3COO^-) = 4,09 \cdot 10^{-3} S.m^2 mol^{-1}$ و $\lambda(H_3O^+) = 3,46 \cdot 10^{-2} S.m^2 mol^{-1}$

(1) دراسة ذوبان حمض الإيثانويك في الماء :

نتوفر على محلولين مائيين (S_1) و (S_2) لحمض الإيثانويك.

✓ المحلول (S_1) تركيزه المولي $C_1 = 5 \cdot 10^{-2} mol.L^{-1}$ و موصليته $\sigma_1 = 3,5 \cdot 10^{-2} S.m^{-1}$

✓ المحلول (S_2) تركيزه المولي $C_2 = 5 \cdot 10^{-3} mol.L^{-1}$ و موصليته $\sigma_2 = 1,1 \cdot 10^{-2} S.m^{-1}$

نعتبر ذوبان حمض الإيثانويك في الماء تفاعلاً محدوداً.

(1.1) أكتب معادلة التفاعل المنذجة لذوبان حمض الإيثانويك في الماء

(2.1) أوجد تعبير التركيز المولي الفعلي $\lambda(H_3O^+)$ للأيونات الأوكسونيوم عند التوازن بدالة σ و $\lambda(CH_3COO^-)$

(3.1) أحسب $\lambda(H_3O^+)$ في كل من (S_1) و (S_2)

(4.1) حدد نسبتي التقدم النهائي τ_1 و τ_2 لتفاعل حمض الإيثانويك مع الماء في كل محلول واستنتج تأثير التركيز البدني للمحلول على نسبة التقدم النهائي

(5.1) حدد ثابتة التوازن لتفاعل حمض الإيثانويك مع الماء بالنسبة لكل من (S_1) و (S_2) . ماذا تستنتج؟

(2) التحقق من درجة حموضية الخل التجاري.

نأخذ حجماً $V_0 = 1mL$ من خل تجاري درجة حموضيته (7°) و تركيزه المولي C_0 و نضيف إليه الماء المقطر لتحضير محلول مائي (S) تركيزه المولي C_S و حجمه $V_S = 100mL$.

نعاير الحجم $V_A = 20mL$ من المحلول (S) بمحلول مائي (S_B) (لهيروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$) تركيزه

$C_B = 1,5 \cdot 10^{-2} mol.L^{-1}$. نحصل على التكافؤ عند صب الحجم $V_{B,E} = 15,7mL$ من المحلول (S).

(1.2) أكتب المعادلة المنذجة لتفاعل حمض - قاعدة.

(2.2) أحسب C_S .

(3.2) حدد درجة الحموضية للخل المدروس. واستنتج هل تتوافق النتيجة المحصل عليها مع القيمة المسجلة على الخل التجاري؟

التمرين 3

لمعاييرة محلول S_B لهيروكسيد البوتاسيوم $(K^+ + HO^-)$ بقياس $pH = 20mL$ من هذا

المحلول ونضيف إليه 20mL من الماء المقطر. نستعمل ك محلول معاير، محلولاً S_A لحمض الكلوريدريك تركيزه

$C_A = 50mmol.L^{-1}$. نخط، بواسطة مجدول، منحنى المعايرة

حيث $pH = f(V_A)$ حيث V_A هي حجم الحمض المضاف.


(1) لماذا تمت إضافة الماء المقطر في الكأس.

(2) أكتب معادلة تفاعل المعايرة.

(3) حدد مبيانياً إحداثيّيّ نقطة التكافؤ.

(4) استنتاج التركيز C_B للمحلول S_B .

(5) اختر من بين الكواشف الملونة المدونة في الجدول أسفله، الكاشف الملون الأنسب لهذه المعايرة



| الكاشف الملون | هيليانتين | أحمر المثيل | أزرق البروموتيمول |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| منطقة الانعطاف | 4,4 – 3,1 | 6,2 – 4,2 | 7,6 – 6,0 |

التمرين 1

ملكة المروج نبتة معمرة تتواجد في المناطق الرطبة، يتراوح طول ساقها بين 50cm و $1,50\text{m}$. و يعلو ساقها عنقود من الأزهار التي تحتوي على حمض الساليسيلييك $C_7H_6O_3$ المعروف بتأثيره المهدئ للألم المفاصل.

حضر حجما V من محلول مائي لحمض الساليسيلييك $C_7H_6O_3$ ذو تركيز $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ ، أعطى قياس pH محلول القيمة $pH = 2,5$.

(1) أعط تعريفاً للحمض حسب برونشتاد.

(2) أكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل الحمض $C_7H_6O_3$ مع الماء علماً أن التحول غير تام.

(3) أنجز جدول تقدم التفاعل.

(4) أحسب α نسبة التقام النهائي للتفاعل.

(5) أحسب $Q_{r,eq}$ قمة خارج التفاعل عند التوازن

(6) نقوم بإذابة كتلة m من حمض الساليسيلييك $C_7H_6O_3$ في 100mL من الماء. فنحصل على محلول S_0 ذي تركيز C_0 ، نقوم بتخفيف محلول 10 مرات فنحصل على محلول مخفف S_A . نأخذ حجما $V_A = 20\text{mL}$ من محلول S_A ثم نعايره باستعمال محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^{+}_{(aq)} + HO^{-}_{(aq)})$ ذو تركيز $C_B = 0,10\text{ mol.L}^{-1}$. بواسطة مجدول نحصل على المذاب الممثل

جانبه.

(1.6) أكتب المعادلة الحصيلة لتفاعل المعايرة.


(2.6) حدد إحداثيات نقطة التكافؤ.

(3.6) حدد تركيز محلول S_A .

(4.6) حدد قيمة m كتلة حمض الساليسيلييك المذاب.

(5.6) حدد الكاشف الملون المناسب للمعايرة مع تعليم الجواب. تنتهي

قيمة C_0 تركيز محلول S_0 .



| الاكتاف الملون | أحمر الكريزول | أزرق للبروموتيلول | أحمر البروموفنول | القيتول فتالين |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| منطقة الانعطاف | 7,2 - 8,8 | 6,0 - 7,6 | 4,8 - 6,4 | 8,2 - 10 |

نعطي : $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$

التمرين 2

معطيات : $pK_e = 14,0$ و $pK_A(HCOOH / HCOO^-) = 3,8$ و $pK_A(HNO_2 / NO_2^-) = 3,3$

(1) دراسة محلولين مائيين:

نعتبر محلولين مائيين S_1 لحمض النترو $(HNO_2)_{(aq)}$ و S_2 لميثانوات الصوديوم $(HCOO^-_{2(aq)} + Na^{+}_{(aq)})$ على التوالي. في حين أعطى قياس pH القيميتين تركيزهما من المذاب هو

$pH_2 = 8,7$ و $pH_1 = 1,3$

(1.1) اكتب معادلة التفاعل بين حمض النترو والماء ثم أعط تعبير ثابتة التوازن.

(2.1) اكتب معادلة التفاعل بين أيون الإيثانوات والماء ثم أعط تعبير ثابتة التوازن.

(3.1) على محور مدرج سلم pH ، حدد مجالات الهيمنة لكل مزدوجة ثم استنتج النوع الكيميائي المهيمن في كل محلول

2) دراسة خليط للمحلولين.

نمزج حجمين متساوين $V_1 = V_2 = V = 200 \text{ mL}$ من كل محلول ، ف تكون كمية المادة البدئية لحمض النترو هي n_1 وكمية المادة لأيون الإيثنوات هي n_2 .

1.2) أحسب n_1 و n_2 .

2.2) أكتب معادلة التفاعل حمض - قاعدة الحاصل عند مزج المحلولين .

3.2) عبر عن ثابتة التوازن K بدلالة pK_{A1} و pK_{A2} . أحسب قيمتها .

4.2) بعد إنجاز جدول التقدم ، أعط تعبير K بدلالة تقدم التفاعل عند التوازن x_{eq} .


5.2) بين أن الحل الذي له معنى فيزيائي للمعادلة المحصل عليها في السؤال 4.2، هو $x_{eq} = 3,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$.

6.2) استنتج التراكيز المولية الفعلية لمختلف الأنواع الكيميائية المتواجدة في الخليط

7.2) اعتماداً على إحدى المزدوجتين المتداخلتين في التفاعل ، بين أن الخليط له $\text{pH} = 4$;

التمرين 3

1) يبين الشكل أسفله مخطط توزيع حمض تحت الكلورور (Acide hypochloreux) ذي الصيغة HClO وقاعدته المرافقة ClO^- والمسماة أيون تحت الكلوريت (ion hypochlorite) .



1.1) حدد مبيانياً ثابتة pK_A للمزدوجة HClO/ClO^- .

2.1) استنتج مخطط هيمنة هذه المزدوجة .

3.1) أي من المنحنيين (أ) أو (ب) يوافق أيون تحت الكلوريت ؟

4.1) أكتب معادلة تفاعل HClO مع الماء .

2/ نمزج حجماً $V_1 = 20 \text{ mL}$ من محلول مائي S_1 لحمض تحت الكلوروز تركيزه $C_1 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ مع حجم $V_2 = 10 \text{ mL}$ من محلول مائي S_2 لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه $C_2 = C_1$. نقىس $\text{pH} = 7,2$ الخليط فنجد :

نعطي : $K_e = 10^{-14}$ و $pK_A(\text{HClO}/\text{ClO}^-) = 7,2$ عند 25°C .

1.2) أكتب معادلة تفاعل حمض تحت الكلوروز مع أيونات الهيدروكسيد .

2.2) أحسب النسبة $\frac{[\text{ClO}^-]_{eq}}{[\text{HClO}]_{eq}}$ في الخليط .

3.2) أنشئ جدول تطور التحول الكيميائي ثم حدد التقدم النهائي لهذا التحول .


4.2) عبر عن ثابتة التوازن K المقرونة بهذا التفاعل بدلالة K_e و K_A ثابتة الحمضية للمزدوجة HClO/ClO^- ، ثم أحسب قيمتها العددية . ماذا تستنتج ؟

| | |
|------------------------------|--|
| 2 ^{ème} Bac (PC) | التحولات المقرونة بالتفاعلات حمض قاعدة |
|------------------------------|--|

التمرين 1

1) أسئلة مباشرة بخصوص التحول الكيميائي المدروس :

يتفاعل حمض الإيثانويك مع الماء بشكل محدود وفق المعادلة التالية :



1.1) أعط تعريف حمض حسب برونشتاد.

1.2) اعتمادا على المعادلة السابقة ، تعرف ثم أكتب مزدوجتي قاعدة / حمض الداخلين في التفاعل

1.3) عبر عن ثابتة التوازن K المقرونة بمعادلة التوازن الكيميائي .

2) الدراسة الـ pH مترية :

نتوفر على محلول حمض الإيثانويك تركيزه المولي البدئي $C_1 = 2,7 \cdot 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$ و حجمه $V_1 = 100 mL$ و له

$25^\circ C$ عند $pH = 3,7$

2.1) حدد كمية المادة البدئية n_1 لحمض الإيثانويك.

2.2) أنشئ جدول التقدم ثم أحسب قيمة التقدم الأقصى x_{max} .

2.3) انطلاقا من قياس pH استنتج التركيز المولي النهائي لأيونات الأوكسونيوم لمحلول حمض الإيثانويك . عبر عن التقدم النهائي x للتفاعل ثم أحسب قيمته.

2.4) أعط التعبير الحرفي لنسبة التقدم النهائي τ_1 للتفاعل. تأكد أن $\tau_1 = 7,4 \cdot 10^{-2}$. هل التحول المدروس كلي ؟ علل جوابك .

2.5) عبر عن التركيز المولي النهائي لأيونات الإيثانوات $CH_3COO^-_{(aq)}$ وأحسب قيمته.

2.6) عبر عن التركيز المولي النهائي الفعلي $[CH_3COOH]$ لحمض الإيثانويك . أحسب قيمته.

2.7) تأكد من كون قيمة ثابتة التوازن K_1 المقرونة بمعادلة التوازن الكيميائي تساوي $1,6 \cdot 10^{-5}$.

3) الدراسة بواسطة قياس الموصولة :

نقياس بعد ذلك ، و عند $25^\circ C$ ، موصولة محلول حمض الإيثانويك ذي التركيز $C_2 = 1,0 \cdot 10^{-1} mol \cdot L^{-1}$. يشير قياس الموصولة إلى القيمة $\sigma = 5,00 \cdot 10^{-2} S \cdot m^{-1}$

3.1) أذكر الأنواع الكيميائية الأكثرية المتواجدة في محلول حمض الإيثانويك . أعطاء العلاقة بين تركيزها .

3.2) أعط التعبير الحرفي للموصولة σ للمحلول بدالة التركيز المولية النهائية لأيونات الأوكسونيوم وأيونات الإيثانوات .

3.3) أعط التعبير الحرفي الذي يسمح بالحصول على التركيز المولية الأيونية النهائية بدالة σ و $\lambda(H_3O^+)$ و $\lambda(CH_3COO^-)$ ، حدد قيمة التركيز المولي النهائي لأيونات الأوكسونيوم وأيونات الإيثانوات .

3.4) نعطي : $\lambda(CH_3COO^-) = 4,10 \cdot 10^{-3} S \cdot m^2 mol^{-1}$ و $\lambda(H_3O^+) = 3,49 \cdot 10^{-2} S \cdot m^2 mol^{-1}$

3.5) بإنجاز التقريرات الممكنة :

3.6) بين أن قيمة K_2 ثابتة التوازن المقرونة بمعادلة التوازن هي $1,56 \cdot 10^{-5}$.

3.7) تأكد من أن نسبة التقدم النهائي τ_2 للمحلول المدروس هو $\tau_2 = 1,25 \cdot 10^{-2}$.

3.8) الخلاصة : مقارنة النتائج المحصل عليها

لقد تمت دراسة محلولي حمض الإيثانويك لهما تركيزين بدئيين مختلفين ، وتم تدوين النتائج المحصل عليها في الجدول التالي :

| نسبة التقدم النهائي | ثابتة التوازن | التركيز المولي البدئي لحمض الإيثانويك | الدراسة بواسطة قياس pH |
|-------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| $\tau_1 = 7,4 \cdot 10^{-2}$ | $K_1 = 1,6 \cdot 10^{-5}$ | $C_1 = 2,7 \cdot 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$ | |
| $\tau_2 = 1,25 \cdot 10^{-2}$ | $K_2 = 1,56 \cdot 10^{-5}$ | $C_2 = 1,0 \cdot 10^{-1} mol \cdot L^{-1}$ | الدراسة بواسطة قياس الموصولة |

3.9) هل تتأثر ثابتة التوازن بالتركيز البدئي لحمض الإيثانويك ؟ علل جوابك اعتمادا على الجدول .

3.10) هل تخضع نسبة التقدم النهائي للتحول الكيميائي المحدود إلى الحالة البدئية للمجموعة الكيميائية ؟ علل جوابك اعتمادا على الجدول

3.11) ليكن الاقتراحين التاليين :

• الاقتراح الأول: كلما زاد تركيز الحمض ، كلما كانت نسبة التقدم النهائي τ كبيرة .

• الاقتراح الثاني: كلما كان محلول حمض الإيثانويك مخففا ، كلما قل تركيز الحمض .

حدد ما إذا كان كل من الاقتراحين صحيحا أو خاطئا .