

**Bac Sciences Mathématiques
National 2018**

EXERCICE 1 : (3,5 points)

	On rappelle que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif et que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire, de zéro la matrice nulle $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'unité la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel.
	Pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $M(x, y) = \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x+2y \end{pmatrix}$ et on considère l'ensemble $E = \{M(x, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$
0,25	1- Montrer que E est un sous-groupe du groupe $(M_2(\mathbb{R}), +)$
0,25	2- a) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$
0,5	b) On pose $J = M(0, 1)$. Montrer que (I, J) est une base de l'espace vectoriel réel $(E, +, \cdot)$
0,5	3- a) Montrer que E est une partie stable de $(M_2(\mathbb{R}), \times)$
0,5	b) Montrer que $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif.
	4- Soit φ l'application de \mathbb{C}^* vers $M_2(\mathbb{R})$ définie par :
	$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}) \quad ; \quad \varphi(x+iy) = M(x+y, -y) = \begin{pmatrix} x+y & 2y \\ -y & x-y \end{pmatrix}$
0,5	a) Montrer que φ est un homomorphisme de (\mathbb{C}^*, \times) vers $(M_2(\mathbb{R}), \times)$
0,5	b) On pose $E^* = E - \{O\}$. Montrer que $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$
0,25	c) En déduire que (E^*, \times) est un groupe commutatif.
0,25	5- Montrer que $(E, +, \times)$ est un groupe commutatif.

EXERCICE 2 : (3 points)

	Soit p un nombre premier tel que : $p = 3 + 4k \quad (k \in \mathbb{N}^*)$
0,5	1- Montrer que pour tout entier relatif x , si $x^2 \equiv 1 [p]$ alors $x^{p-5} \equiv 1 [p]$
	2- Soit x un entier relatif vérifiant : $x^{p-5} \equiv 1 [p]$
0,5	a) Montrer que x et p sont premiers entre eux.
0,5	b) Montrer que : $x^{p-1} \equiv 1 [p]$.

- | | |
|-----|--|
| 0,5 | c) Vérifier que : $2 + (k-1)(p-1) = k(p-5)$ |
| 0,5 | d) En déduire que : $x^2 \equiv 1[p]$ |
| 0,5 | 3- Résoudre dans \mathbb{Z} l'équation : $x^{62} \equiv 1[67]$ |

EXERCICE 3 : (3,5 points)

- Soit m un nombre complexe .
- I- On considère dans l'ensemble complexes \mathbb{C} l'équation (E_m) d'inconnue z :
- $$z^2 + (im + 2)z + im + 2 - m = 0$$
- 1- a) Vérifier que $\Delta = (im - 2i)^2$ est le discriminant de l'équation (E_m)
b) Donner, suivant les valeurs de m , l'ensemble des solutions de l'équation (E_m)
- 2- Pour $m = i\sqrt{2}$, écrire les deux racines de l'équation (E_m) sous la forme exponentielle.
- II- Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v})
On considère les points A , Ω , M et M' d'affixes respectifs $a = -1 - i$, $\omega = i$, m et $m' = -im - 1 + i$
- 1- Soit R la rotation d'angle $-\frac{\pi}{2}$ qui transforme M en M'
- 0,25 a) Vérifier que Ω est le centre de R
0,5 b) Déterminer l'affixe b de B , où B est le point tel que : $A = R(B)$
- 0,5 2- a) Vérifier que : $m' - a = \frac{\omega - a}{\omega - b}(m - b)$
0,5 b) En déduire que les points A , M et M' sont alignés si et seulement si les points A , B , Ω et M sont cocycliques .
0,5 c) Montrer que l'ensemble des points M tel que les points A , M et M' soient alignés
Est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon .

EXERCICE 4 : (7,5 points)

- Partie I :
- 1- a) Montrer que : $(\forall x \in]0, +\infty[)$; $\int_0^x \frac{t}{1+t} dt = x - \ln(1+x)$
b) En utilisant le changement de variable $u = t^2$, montrer que :
 $(\forall x \in]0, +\infty[)$; $\int_0^x \frac{t}{1+t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{1}{1+\sqrt{u}} du$

0,5	<p>c) En déduire que : $(\forall x \in]0, +\infty[)$; $\frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \leq \frac{1}{2}$</p>
0,25	<p>2- Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$</p>
	<p>Partie II :</p>
	<p>On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$: $\begin{cases} f(x) = \left(\frac{x+1}{x}\right) \ln(1+x) & ; \quad x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$</p>
	<p>et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j})</p>
0,25	<p>1- a) Montrer que f est continue à droite en 0</p>
0,5	<p>b) Montrer que f est dérivable à droite en 0 (On pourra utiliser le résultat de la question I.2)</p>
0,75	<p>c) Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.</p>
	<p>2- a) Montrer que f est dérivable sur $]0, +\infty[$, puis vérifier que :</p>
0,5	$(\forall x \in]0, +\infty[) ; \quad f'(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$
0,25	<p>b) En déduire que f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$</p>
0,25	<p>c) Vérifier que : $f([0, +\infty[) = [1, +\infty[$</p>
0,5	<p>3- Représenter graphiquement la courbe (C) (On construira la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0)</p>
	<p>Partie III :</p>
	<p>1- On considère la fonction g définie sur $]0, +\infty[$ par : $g(x) = f(x) - x$</p>
0,5	<p>a) Montrer que : $(\forall x \in]0, +\infty[)$; $0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$</p>
0,5	<p>b) En déduire que g est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$ puis montrer que $g([0, +\infty[) =]-\infty, 1[$</p>
0,25	<p>c) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α sur $]0, +\infty[$</p>
0,25	<p>2- Soit a un réel de l'intervalle $]0, +\infty[$. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = a$ et $(\forall n \in \mathbb{N})$; $u_{n+1} = f(u_n)$</p>
	<p>a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N})$; $u_n > 0$</p>

- | | |
|------|--|
| 0,5 | b) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad ; \quad u_{n+1} - \alpha \leq \frac{1}{2} u_n - \alpha $ |
| 0,5 | c) Montrer par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad ; \quad u_n - \alpha \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n a - \alpha $ |
| 0,25 | d) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α |

EXERCICE 5 : (2,5 points)

- | | |
|-----|---|
| 0,5 | On considère la fonction F définie sur \mathbb{R} par : $F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$ |
| 0,5 | 1- Montrer que F est continue et strictement croissante sur \mathbb{R} |
| 0,5 | 2- a) Montrer que : $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad ; \quad F(x) \geq x$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ |
| 0,5 | b) Montrer que F est impaire, en déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$ |
| 0,5 | c) Montrer que F est une bijection de \mathbb{R} dans \mathbb{R} |
| 0,5 | d) Montrer que la bijection réciproque G de la fonction F est dérivable en 0, puis calculer $G'(0)$ |