

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

المسالك الدولية

الدورة الاستدراكية 2023



المملكة المغربية
وزارة التربية والتكوين
والتعليم الأولي والرياضة
المركز

SSSSSSSSSSSSSSSSSS-SSS

الموضوع

RS 24F

4h

مقدمة الاندماج

الرياضيات

الحادي

9

الملاء

شعبـة العـلـوم الرـياـضـيـة (أ) و (ب) (خـيـار فـرـنـسـيـة)

الشعبة أو المسالك

CONSIGNES :

- La durée de l'épreuve est de 4 heures.
 - L'épreuve comporte quatre exercices indépendants.
 - Les exercices peuvent être traités selon l'ordre choisi par le candidat.
 - L'exercice1 se rapporte à l'analyse(10 pts)
 - L'exercice2 se rapporte aux nombres complexes.....(3.5 pts)
 - L'exercice3 se rapporte aux structures algébriques.....(3.5 pts)
 - L'exercice4 se rapporte à l'arithmétique(3 pts)

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé

L'usage de la couleur rouge n'est pas autorisé

EXERCICE1 : (10 points)

Partie I

Pour tout entier naturel **non nul** n , on considère la fonction f_n définie sur $I = [0, +\infty[$

par : $f_n(0) = 0$ et $(\forall x \in]0, +\infty[)$; $f_n(x) = \sqrt{x}(\ln x)^n$

et soit (C_n) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

0.5 1-a) Vérifier que : $(\forall x \in]0, +\infty[)$; $\sqrt{x}(\ln x)^n = (2n)^n \left(x^{\frac{1}{2n}} \ln \left(x^{\frac{1}{2n}} \right) \right)^n$, en déduire que

f_n est continue à droite en 0

0.25 b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$

0.75 c) Vérifier que : $(\forall x \in]0, +\infty[)$; $\frac{f_n(x)}{x} = (2n)^n \left(\frac{\ln \left(x^{\frac{1}{2n}} \right)}{x^{\frac{1}{2n}}} \right)^n$, en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x}$

puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.

0.5 d) Calculer, suivant la parité de n , $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f_n(x)}{x}$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.

0.75 2-a) Montrer que f_n est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que :

$$(\forall x \in]0, +\infty[) ; f'_n(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} (\ln x)^{n-1} (2n + \ln x)$$

0.25 b) Vérifier que : $\forall n \geq 2$, $f'_n(x) = 0$ si et seulement si $(x = 1$ ou $x = e^{-2n})$

1 c) Étudier, suivant la parité de n , le sens de variation de f_n et donner son tableau de variations.

0.25 d) Montrer que si n est impair et $n \geq 3$ alors le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion de (C_n)

Partie II :

1- Soit $\beta \in]1, e[$ un réel fixé. On considère la suite numérique $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; u_n = f_n(\beta)$$

0.25 a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$; $0 < u_n < \sqrt{e}$

0.25 b) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.

0.25 c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

0.5 2-a) Montrer que pour tout entier n non nul, il existe un unique réel $x_n \in]1; e[$
tel que : $f_n(x_n) = 1$

0.75	b) Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ainsi définie est croissante, en déduire qu'elle est convergente.
	3- On pose : $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$
0.5	a) Montrer que : $1 < \ell \leq e$
0.25	b) Montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln x_n)^n = \frac{1}{\sqrt{\ell}}$
0.25	c) Montrer que si $\ell < e$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln(\ln x_n) = -\infty$
0.25	d) En déduire la valeur de ℓ

Partie III :

On pose pour tout $x \in I$, $F(x) = \int_x^1 (f_1(t))^2 dt$

0.25	1-a) Montrer que la fonction F est continue sur I
1	b) En utilisant une double intégration par parties, montrer que : $(\forall x \in]0, +\infty[) ; F(x) = -\frac{x^2}{2} \ln^2(x) + \frac{x^2}{2} \ln(x) + \frac{1}{4}(1-x^2)$
0.5	2-a) Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} F(x)$
0.25	b) En déduire la valeur de $F(0)$
0.5	c) Calculer, en cm^3 , le volume du solide engendré par la rotation d'un tour complet autour de l'axe des abscisses de la portion de la courbe (C_1) relative à l'intervalle $[0, 1]$. (On prendra $\ i\ = 1\text{cm}$)

EXERCICE2 : (3.5 points)

Les parties I et II peuvent être traitées indépendamment.

PARTIE I :

On considère dans \mathbb{C}_+ le système suivant : (S) :
$$\begin{cases} \sqrt{x} \left(1 + \frac{1}{x+y}\right) = \frac{12}{5} \\ \sqrt{y} \left(1 - \frac{1}{x+y}\right) = \frac{4}{5} \end{cases}$$

1	1- Soit $(x, y) \in \mathbb{C}_+$ une solution du système (S) . On pose : $z = \sqrt{x} + i\sqrt{y}$
0.25	a) Montrer que : $z + \frac{1}{z} = \frac{12}{5} + \frac{4}{5}i$
0.75	b) Montrer que : $z^2 - \left(\frac{12}{5} + \frac{4}{5}i\right)z + 1 = 0$, en déduire les valeurs possibles de z $(\text{On remarque que : } \frac{28}{25} + \frac{96}{25}i = \left(\frac{2}{5}(4+3i)\right)^2)$
0.25	c) En déduire les valeurs du couple (x, y)
0.5	2- Résoudre dans \mathbb{C}_+ le système (S)

PARTIE II :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$

Soit (U) le cercle de centre O et de rayon 1 et $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$ trois points du cercle (U) deux à deux distincts.

0.25 1- Montrer que : $(\forall z \in \mathbb{C}) ; |z|=1 \Leftrightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}$

0.5 2-a) La droite passant par A et parallèle à (BC) coupe le cercle (U) au point $P(p)$

$$\text{Montrer que : } p = \frac{bc}{a}$$

0.5 b) La droite passant par A et perpendiculaire à (BC) coupe le cercle (U) au point $Q(q)$. Montrer que : $q = -p$

0.5 c) La droite passant par C et parallèle à (AB) coupe le cercle (U) au point $R(r)$

Montrer que les deux droites (PR) et (OB) sont perpendiculaires.

EXERCICE3 : (3.5 points)

On rappelle que $(M_3(\mathbb{C}), +, \times)$ est un anneau unitaire et non commutatif d'unité

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Soit } E = \left\{ M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & -c \\ 0 & c & b \end{pmatrix} / (a, b, c) \in \mathbb{C}^3 \right\}$$

0.25 1- Montrer que E est un sous-groupe de $(M_3(\mathbb{C}), +)$

2- On munit l'ensemble $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ de la loi de composition interne $*$ définie par :

$\forall ((x, z), (x', z')) \in (\mathbb{C} \times \mathbb{C})^2 ; (x, z)*(x', z') = (x + x', z + z')$ et on considère l'application φ définie de E vers $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ par :

$$\forall (a, b, c) \in \mathbb{C}^3, \varphi(M(a, b, c)) = (a, b + ci)$$

0.5 a) Montrer que φ est un homomorphisme de $(E, +)$ vers $(\mathbb{C} \times \mathbb{C}, *)$ et que

$$\varphi(E) = \mathbb{C} \times \mathbb{C}$$

0.25 b) En déduire que $(\mathbb{C} \times \mathbb{C}, *)$ est un groupe commutatif.

3- On munit $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ de la loi de composition interne T définie par :

$$\forall ((x, z), (x', z')) \in (\mathbb{C} \times \mathbb{C})^2 ; (x, z)T(x', z') = (x \operatorname{Re}(z') + x' \operatorname{Re}(z), zz')$$

($\operatorname{Re}(z)$ désigne la partie réelle du nombre complexe z)

0.25 a) Montrer que T est commutative.

0.25 b) Vérifier que $(0, 1)$ est l'élément neutre de T dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$

0.5 c) Vérifier que $\forall x \in \mathbb{C}, (1, i)T(x, -i) = (0, 1)$; en déduire que T est non associative dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$

4- Soit $G = \{(Im(z), z) / z \in \mathbb{C}\}$

($Im(z)$ désigne la partie imaginaire du nombre complexe z)

0.25 a) Montrer que G est un sous-groupe de $(\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}, *)$

(On remarque que $(-\text{Im}(z), -z)$ est le symétrique de $(\text{Im}(z), z)$ pour la loi $*$)

0.25 b) Soit ψ l'application définie de \mathbb{Q}^* vers $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ par : $\forall z \in \mathbb{Q}^* ; \psi(z) = (\text{Im}(z), z)$

Montrer que ψ est un homomorphisme de (\mathbb{Q}^*, \times) vers $(\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}, T)$

0.5 c) En déduire que $(G - \{(0,0)\}, T)$ est un groupe commutatif.

0.5 5- Montrer que $(G, *, T)$ est un corps commutatif.

EXERCICE4 : (3 points)

Soit p un nombre premier impair. On pose : $S = 1 + p + p^2 + p^3 + \dots + p^{p-1}$

Soit q un nombre premier qui divise S .

0.5 1- a) Montrer que p et q sont premiers entre eux.

0.25 b) En déduire que : $p^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$

0.5 c) Vérifier que : $p^p - 1 = (p-1)S$, en déduire que : $p^p \equiv 1 \pmod{q}$

2- On suppose que p et $q-1$ sont premiers entre eux.

0.75 a) En utilisant le théorème de Bézout, montrer que : $p \equiv 1 \pmod{q}$

0.25 b) En déduire que $S \equiv 1 \pmod{q}$

0.75 3- Montrer que : $q \equiv 1 \pmod{p}$

FIN