

Lois de composition interne

Exercice 6

On considère dans \mathbb{R} la loi interne T définie par :

$$(\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2) \quad xTy = x + y + \frac{1}{2}xy$$

- 1) déterminer l'élément neutre de (\mathbb{R}, T)
- 2) montrer que $\mathbb{R} - \{-2\}$ est stable dans (\mathbb{R}, T)
- 3) soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = 1 + \frac{1}{2}x$

Comparer $f(xTy)$ et $f(x) \times f(y)$

Exercice 7

Soit $J =]0, 1[$. On considère dans J la loi $*$ telle que :

$$(\forall (x,y) \in J^2) \quad x * y = \frac{xy}{xy + (x-1)(y-1)}$$

- 1) montrer que $*$ est interne dans J et commutative
- 2) montrer que $*$ est associative
- 3) montrer que $(J, *)$ est un groupe commutatif
- 4) soit f l'application définie de \mathbb{R}^{*+} vers J par :

$$(\forall x \in \mathbb{R}^{*+}) \quad f(x) = \frac{x}{x+1}$$

- a) montrer que f est un isomorphisme de $(\mathbb{R}^{*+}, \times)$ vers $(J, *)$
- b) déduire la structure de $(J, *)$

Exercice 8

On considère dans \mathbb{R}^{*+} la loi $*$ telle que :

$$(\forall (x,y) \in \mathbb{R}^{*+2}) \quad x * y = e^{\ln x \ln y}$$

- 1) montrer que $*$ est interne dans \mathbb{R}^{*+} et commutative
- 2) montrer que $*$ est associative
- 3) montrer que $*$ admet un élément neutre
- 4) montrer que $(\mathbb{R}^{*+} - \{1\}, *)$ est un groupe commutatif
- 5) montrer que $I =]1, +\infty[$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^{*+} - \{1\}, *)$

Exercice 9

On définit sur \mathbb{R}^2 la loi $*$ par :

$$(\forall (x',y') \in \mathbb{R}^2) \quad (x,y) * (x',y') = (xx', yy')$$

- 1) Vérifier que $*$ est commutative, associative
- 2) Déterminer l'élément neutre de $(\mathbb{R}^2, *)$
- 3) Déterminer les éléments de \mathbb{R}^2 qui admettent un symétrique dans $(\mathbb{R}^2, *)$
- 4) a) Montrer que $E = \mathbb{R} \times \{0\}$ est stable dans $(\mathbb{R}^2, *)$
b) $*$ admet-elle un élément neutre dans E ?