

Réactions d'estérification et d'hydrolyse :

La chimie organique, est la chimie des composés carboniques, c'est-à-dire les molécules contenant les élément C et H.

La configuration électronique du carbone est : C : (K)⁶ (L)⁴. Afin de vérifier la condition d'octet, il faut $4e^-$, c'est-à-dire l'atome de carbone met 4 liaisons :

Représentation de Lewis :




Représentation de Cram :




Pour l'oxygène : O

Pour l'azote : N


On peut représenter la molécule organique en utilisant plusieurs façons :




Formule développée



Formule semi-développée



Squelette carbonique



Écriture topologique

Les familles chimiques :


Les alcanes :

Les alcanes non-cycliques ont pur formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$, où $n \in \mathbb{N}^*$.

Alcane linéaire : Le nom d'un alcane linéaire est constitué d'un préfixe qui dépend du n

$n = 1$	CH_4	méthane
$n = 2$	C_2H_6	éthane
$n = 3$	C_3H_8	propane
$n = 4$	C_4H_{10}	butane
$n = 5$	C_5H_{12}	pentane
$n = 6$	C_6H_{14}	hexane
$n = 7$	C_7H_{16}	heptane
$n = 8$	C_8H_{18}	octane
$n = 9$	C_9H_{20}	nonane
$n = 10$	$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	décane

Alcane ramifié : La chaîne carbonée la plus longue est appelée chaîne principale. Elle donnera son nom à l'alcane. Par exemple :



Si $R=CH_3$ on parle d'méthyl, si $R=C_2H_5$ on parle d'éthyl.

Pour cette molécule on a 6 carbones, donc il s'agit du préfixe hex, R se trouve dans l'emplacement 3, alors le nom de cette espèce est : **3-méthyl-hexane**.


Les alcools :

Les alcools sont caractérisés par le groupe OH d'hydroxyde. Leur formule brute est $C_nH_{2n-1}O$. Il existe 3 classes d'alcools :

Alcool primaire : le carbone est lié à deux atomes d'hydrogène.


Alcool secondaire : le carbone est lié à un atome d'hydrogène.

Alcool tertiaire : le carbone n'est lié à aucun atome d'hydrogène.



$n = 1$	CH_3OH	méthanol
$n = 2$	C_2H_5OH	éthanol
$n = 3$	C_3H_7OH	propanol
$n = 4$	C_4H_9OH	butanol
$n = 5$	$C_5H_{11}OH$	pentanol
$n = 6$	$C_6H_{13}OH$	hexanol
$n = 7$	$C_7H_{15}OH$	heptanol
$n = 8$	$C_8H_{17}OH$	octanol
$n = 9$	$C_9H_{19}OH$	nonanol
$n = 10$	$C_{10}H_{21}OH$	décanol

Pour les alcools ramifiés il suffit de repérer l'emplacement du groupe OH, par exemple :




3,3-diméthyl-but-2-ol

Les acides carboxyliques :

Les acides carboxyliques sont caractérisés par le groupe COOH carboxyle : $\text{---C}(=\text{O})\text{---O---H}$, leur formule brute est : $\text{C}_{n-1}\text{H}_{2n-3}$

$n = 1$	HCOOH	Acide méthanoïque
$n = 2$	CH_3COOH	Acide éthanoïque
$n = 3$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$	Acide propanoïque
$n = 4$	$\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$	Acide butanoïque
$n = 5$	$\text{C}_4\text{H}_9\text{COOH}$	Acide pentanoïque
$n = 6$	$\text{C}_5\text{H}_{11}\text{COOH}$	Acide hexanoïque
$n = 7$	$\text{C}_6\text{H}_{13}\text{COOH}$	Acide heptanoïque
$n = 8$	$\text{C}_7\text{H}_{15}\text{COOH}$	Acide octanoïque
$n = 9$	$\text{C}_8\text{H}_{17}\text{COOH}$	Acide nonanoïque
$n = 10$	$\text{C}_9\text{H}_{19}\text{COOH}$	Acide décanoïque

Pour les acides ramifiés, on commence la numérotation à partir le carbone fonctionnel du groupe COOH.




Les réactions d'estérification et hydrolyse d'un ester :

Les esters :

Les esters sont des composés odorants, que l'on trouve en abondance dans les fruits mûrs, ainsi ils entrent dans la composition, des huiles, des parfums.

Les esters possèdent un groupe caractéristique appelé ester : $-\text{CO}_2\text{R}'$, noté aussi $-\text{COOR}'$.

Leur formule générale est :




La nomenclature :

Le nom des esters se compose de deux parties :


La première est obtenue à partir l'acide correspondant en remplaçant "oïque" par "oate".

La deuxième est le nom d'alkyle R' lié à l'oxygène.

Par exemple :



L'acide correspondant est $\text{CH}_3 - \text{COOH}$ l'acide éthanoïque, donc la première partie est Ethanoate, le radical alkyl lié à l'oxygène est $\text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ constitué de 4 carbones, donc c'est le butyle. Par suite le nom de cet ester est : Ethanoate de butyle.




L'acide correspondant est $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{\text{C}}{\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}} - \text{COOH}$ l'acide 2,2-diméthyl-butanoïque, donc la première partie est 2,2 diméthyl-butanoate.

Le radical alkyl lié à l'oxygène est : $O-\overset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_2-CH_3$ 1-méthyl-propyle. Par suite le nom de cet ester est : 2,2-diméthyl-butanoate de 1-méthyl-propyle.

Réaction d'estérification :

Une réaction d'estérification modélise la transformation spontanée conduisant à la formation d'un ester : $\text{R}-\text{COOR}'$ et l'eau, à partir d'un acide carboxylique $\text{R}-\text{COOH}$ et d'un alcool $\text{R}'-\text{OH}$.




Acide Alcool Ester Eau
carboxylique

Les transformations modélisées par une réaction d'estérification sont lentes et limitées.

Réaction d'hydrolyse :

Une réaction d'hydrolyse d'un ester modélise la transformation spontanée qui conduit à un alcool et à un acide carboxylique à partir d'un ester et d'eau. C'est l'inverse de l'estérification.



Cette transformation est lente et limitée.

État d'équilibre :

Les transformations modélisées par une réaction d'estérification ou hydrolyse d'un ester, conduisent à un état d'équilibre.

Les deux réaction, à l'équilibre, ont lieu simultanément et à la même vitesse.

La composition de systèmes peut être déterminée à partir le quotient de réaction Q , et puisque la transformations n'ayant pas lieu en solution aqueuse, on admet que Q est en fonction des réactifs et produits sans oublier l'eau.

$$Q = \frac{[\text{ester}][\text{eau}]}{[\text{acide}][\text{eau}]} = \frac{n(\text{ester})n(\text{eau})}{n(\text{acide})n(\text{eau})}$$

Contrôle de la vitesse de réaction :

On sait que ces deux transformations sont lentes, on peut contrôler leur vitesse en influençant la température ou bien utiliser un catalyseur.

Le rendement :

Le rendement d'une transformation chimique est égal au taux d'avancement final en % de la réaction associée.

$$r = 100 \cdot \tau = 100 \frac{x_f}{x_m}$$

Afin d'augmenter le rendement on recourt à :

- . L'utilisation l'un des réactifs en excès dans l'état initial.
- . L'ajout de l'un des réactifs lorsque l'état d'équilibre est atteint.
- . L'élimination de l'un des produits au cours de la transformation.

Mais lorsqu'on utilise l'une de ces techniques on se trouve donc devant un Q inférieur à $Q_{r,\text{éq}} = K$.