



I. تكامل دالة f متصلة على قطعة $[a, b]$:

01. تعريف:

f دالة متصلة على قطعة $[a, b]$ حيث F دالة أصلية ل f .

العدد الحقيقي $F(b) - F(a)$ يسمى تكامل f من a إلى b . و نرمز له ب: $\int_a^b f(x) dx$ و يقرأ : تكامل من a إلى b ل $f(x)$.

02. ملحوظة:

• في الكتابة $\int_a^b f(x) dx$ يمكن تعويض المتغير x بأي متغير و منه: $\int_a^b f(y) dy = \int_a^b f(t) dt = \dots$

• $\int_a^a f(t) dt = [F(t)]_a^a = F(a) - F(a) = 0$

03. مثال:

01. أحسب: $\int_2^{1+e} \frac{1}{x-1} dx$ و $\int_2^{1+e} \frac{4}{x-1} dx$ و $\int_0^1 (x^2 - 2x) dx$ و $\int_0^1 (x^2 - 2x) dx$

II. خصائص التكامل : علاقة شال - خطانية التكامل - التكامل و الترتيب:

01. خصائص :
1. خاصية :

• قابلية للاشتغال على f' و f متصلة على $[a, b]$: لدينا $\int_a^b f'(x) dx = [f(x)]_a^b = f(b) - f(a)$

• لدينا : $\int_a^b c dx = [cx]_a^b = c(b-a)$ $c \in \mathbb{R}$

2. خصائص :

• f متصلة على $[a, b]$ لدينا :

• $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ و $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ و $\int_a^a f(x) dx = 0$

3. خصائص : (خطانية التكامل)

• f و g متصلتين على مجال I مع a و b من I . لدينا :

• خطانية التكامل : $\int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$ و $\int_a^b (f+g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

• التكامل و الترتيب: f موجب على $[a, b]$ فإن $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ (منحني f فوق محور الأفاسيل و $b \geq a$ فإن تكاملها موجب)

• $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ و $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ $\forall x \in [a, b]; f(x) \leq g(x)$

• $m \leq \frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x) dx \leq M$ أو $(b-a)m \leq \int_a^b f(x) dx \leq (b-a)M$ فإن: $\forall x \in [a, b]: m \leq f(x) \leq M$

11

درس رقم

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم ح. أ + ع. فيزياء

2

درس : حساب التكامل

الصفحة

4. أمثلة :

$$\text{أ. أحسب: } \int_{-3}^2 |2x - 4| dx \quad (1)$$

$$\text{B. نضع: } B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) dx \quad \text{و} \quad A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx \quad (2)$$

أ - أحسب: $A + B$ و $A - B$. ب - استنتج قيمة كل من A و B . (3)

$$\text{C. بين أن: } \int_2^5 \ln(x+1) dx \leq \int_2^5 \ln(x+3) dx \quad (4)$$

III. القيمة المتوسطة La valeur moyenne

01. خاصية وتعريف:

f متصلة على مجال I مع a و b من I حيث $a < b$.

- يوجد على الأقل عنصر c من المجال $[a, b]$ حيث: $(b-a) \times f(c) = \int_a^b f(x) dx$

• العدد الحقيقي: $f(c) = \frac{1}{b-a} \times \int_a^b f(x) dx$ يسمى القيمة المتوسطة للدالة f على مجال $[a, b]$

02. مثال:

f متصلة على مجال $[0, 2]$ حيث: حدد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = 3x$

$$\text{لدينا: } f(c) = \frac{1}{b-a} \times \int_a^b f(x) dx$$

$$= \frac{1}{2-0} \times \int_0^2 3x dx = \frac{1}{2} \times \left[\frac{3}{2} x^2 \right]_0^2 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} [x^2]_0^2 = 3$$

خلاصة: القيمة المتوسطة للدالة f على مجال $[0, 2]$ هي $f(c) = 3$

$$(b-a) \times f(c) = \int_a^b f(x) dx \quad \text{أي} \quad f(c) = \frac{1}{b-a} \times \int_a^b f(x) dx$$

يوجد مستطيل، يُعدُّه (أي الطول والعرض) $f(c)$ مساحته هي المساحة $A = \int_a^b f(x) dx$

IV. المتكاملة بالأجزاء L' intégration par parties

01. خاصية:

لتكن u و v دالتيں قابلتين للإشتقاق على المجال $[a, b]$ حيث u' و v' متصلتين على $[a, b]$ لدينا:

$$\int_a^b u(x) \times v'(x) dx = \underbrace{[u(x) \times v(x)]_a^b}_{(1)} - \underbrace{\int_a^b u'(x) \times v(x) dx}_{(3)}$$

طريقة وضع المتكاملة بالأجزاء:

$$u(x) = \dots \quad u'(x) = \dots$$

$$(1) \downarrow \quad (2) \searrow \quad - \quad \downarrow (3)$$

$$v'(x) = \dots \quad v(x) = \dots$$

11

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم ح. أ + ع. فيزياء

3

درس رقم

درس : حساب التكامل

الصفحة

أمثلة:

03

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx \quad (1)$$

جواب:

لتحسب I باستعمال المتكاملة بالأجزاء: نضع:

$$u(x) = x \quad u'(x) = 1$$

$$(1) \downarrow \quad (2) \searrow \quad - \quad \downarrow (3)$$

$$v'(x) = \cos x \quad v(x) = \sin x$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = [x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \times \sin x dx$$

ومنه:

$$= \left(\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} - 0 \sin 0 \right) - [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{2} + \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0 \right) = \frac{\pi}{2} + 0 - 1 = \frac{\pi}{2} - 1$$

$$\text{خلاصة: } I = \frac{\pi}{2} - 1$$

$$J = \int_1^e \ln(x) dx \quad (2)$$

لتحسب I باستعمال المتكاملة بالأجزاء: نضع:

$$u(x) = \ln(x) \quad u'(x) = \frac{1}{x}$$

$$(1) \downarrow \quad (2) \searrow \quad - \quad \downarrow (3)$$

$$v'(x) = x \quad v(x) = \frac{1}{2}x^2$$

$$\int_1^e \ln(x) dx = \left[\frac{1}{2}x^2 \ln(x) \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times \frac{1}{2}x^2 dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(e^2 \ln(e) - 1^2 \ln(1) \right) - \frac{1}{2} \int_1^e x dx$$

$$J = \frac{1}{4}(e^2 + 1) = \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_1^e = \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{4}(e^2 - 1^2) = \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{4}$$

تطبيقات حساب التكامل: V



حساب المساحات:

01

في هذه الفقرة نأخذ المستوى (P) منسوب إلى معلم متعدد $(0, i, j)$

دالة متصلة على قطعة $[a, b]$.

ملحوظة: وحدة قياس المساحات هي مساحة المستطيل OIKJ ونرمز لها بالرمز (u.a) (u.a = unité aire)






- نعتبر (F) الحيز من المستوى (P) المحصور بين المنحنى (C_f) و محور الأفقيين المستقيمين اللذين معادلتها على التوالي $x = a$ و $x = b$
- نعتبر A مساحة الحيز (F) من المستوى (P)
- ملاحظة:** المساحة تحسب بالتكامل ومرتبطة بإشارة الدالة f على $[a, b]$

المساحة بوحدة المساحة ونرمز لها ب $u.a$

$[a, b]$ إشارتها تتغير على

$[a, b]$ f سالبة على

$[a, b]$ f موجبة على



$$A = \int_a^b |f(x)| dx$$

$$A = \int_1^5 |f(x)| dx = \int_1^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx$$

$$A = - \int_a^b f(x) dx$$


$$A = - \int_1^5 f(x) dx = \int_5^1 f(x) dx$$

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_1^5 f(x) dx$$

حالات خاصة


نعتبر Δ مساحة الحيز الحصور (C_f) و (C_g) و $x = b$ $x = a$ و المستقيمين اللذين معادلتها هما



$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

$$A = \int_{-1}^5 |f(x) - g(x)| dx = - \int_{-1}^1 (f(x) - g(x)) dx + \int_1^4 (f(x) - g(x)) dx - \int_4^5 (f(x) - g(x)) dx$$


دالة فردية و متصلة على قطعة $[a, b]$



$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx$$

دالة زوجية و متصلة على قطعة $[a, b]$



$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

11

درس رقم

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم ح. أ + ع. فيزياء

5

درس : حساب التكامل

الصفحة

02. حساب الحجوم: (في هذه الفقرة نعتبر: الفضاء منسوب إلى معلم متعدد $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.)

f دالة متصلة على القطعة $[a, b]$ مع $(a < b)$.

ليكن (C_f) منحناها في المعلم $(0, \vec{i}, \vec{j})$.





نفترض أن المنحنى (C_f) حيث أفاصيله محصورة بين a و b قام بدورة كاملة حول محور الأفاصيل فإنه يولد مجسم يسمى مجسم الدوران للدالة f على $[a, b]$.

نعتبر الدالتيين f و g المعرفتين على $[0, 2]$ بما يلي: ب: $f(x) = x$ و $g(x) = x^2 + \frac{1}{2}$

ليكن (C_f) و (C_g) منحنيهما في المعلم $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

السؤال المطروح: كيف نحصل على V_f حجم مجسم المولد بدوران (C_f) حول محور الأفاصيل على المجال $[0, 2]$.

السؤال المطروح: كيف نحصل على V_g حجم مجسم المولد بدوران (C_g) حول محور الأفاصيل على المجال $[0, 2]$.



1. خاصية:

الفضاء منسوب إلى معلم متعدد $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. f دالة متصلة على القطعة $[a, b]$ مع $(a < b)$.

حجم المجسم المولد بدوران منحنى الدالة f حول محور الأفاصيل هو: $V = \int_a^b \pi(f(x))^2 dx$ بوحدة قياس الحجوم u.v

2. مثال 1 :

الفضاء منسوب إلى معلم متعدد مننظم $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $[-1, 2]$ ب: $f(x) = x + 5$

ليكن (C_f) منحناها في المعلم $(\vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$.

(1) أنشئ المجسم على الرسم

(2) حسب V حجم مجسم المولد بدوران (C_f) حول محور الأفاصيل على المجال $[-1, 2]$.

جواب:

11

الأستاذ: بنموسى محمد ثانوية: عمر بن عبد العزيز المستوى: 2 علوم ح. أ + ع. فيزياء



درس رقم

درس : حساب التكامل

الصفحة

(1) أنظر الرسم الأخير.

(2) حجم مجسم الدوران:

$$V = \int_a^b \pi(f(x))^2 dx = \int_{-1}^2 \pi(f(x))^2 dx = \int_{-1}^2 \pi(x-5)^2 dx = \int_{-1}^2 \pi(x-5)^2 dx = \frac{\pi}{3} \left[(x-5)^3 \right]_{-1}^2 = \frac{189\pi}{3}$$

مثال 2 :

- الفضاء منسوب إلى معلم متعامد منظم $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1\text{cm}$:

- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $[-1, 1]$ ب :

ليكن (C_f) منحناها في المعلم $(0, \vec{i}, \vec{j})$.

(3) أنشئ المجسم على الرسم.

(4) حسب V حجم مجسم المولد بدوران (C_f) حول محور الأفاسيل على المجال $[-1, 1]$

جواب :

(1) أنظر الرسم الأخير.

(2) حجم مجسم الدوران:

3. جواب:

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b \pi(f(x))^2 dx \\ &= \int_{-1}^1 \pi(\sqrt{1-x^2})^2 dx \\ &= \int_{-1}^1 \pi(1-x^2) dx \\ &= \pi \int_1^1 (1-x^2) dx \\ &= \pi \left[x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{4\pi}{3} \text{cm}^3 \end{aligned}$$

ط2: (حجم كرة شعاعها هو 1) $(R=1)$

