

| | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| الثانوية باك علوم فизيائية | فرض محروس رقم 1 | ثانوية وادي الذهب التاهيلية |
| السنة الدراسية 2014-2015 | المادة الفيزياء والكيمياء | الدورة الأولى |

| | |
|--|----------------|
| تخصص نقطة على تنظيم ورقة التحرير | الاسم والنسب : |
| يعطى التعبير الحرفي قبل التطبيق العددي | الرقم : |

الفيزياء (12 نقطة)

تمرين 1 : (5,5 نقط)

يكون الطرف S لهزاز منبعاً لمواجة جيبية طول حبل أفقى . يمثل الشكل أسفله مظهر مظهر الحبل عند التاريخ $t = 20ms$ نعتبر اللحظة التي بدأ فيها المنبع الحركة أصلًا للتاريخ .



1-حدد طول الموجة λ (باستعمال الشكل) . (0,5ن)


2-حدد v سرعة انتشار الموجة . واستنتج N ترددتها . (1,5ن)

3-مثل مظهر الحبل عند لحظة تاريخها $t = 24 ms$ (1ن)

4-نضيء الحبل بوماض تردد N_e . ما هي أكبر قيمة لتردد الوماض للحصول على التوقف الظاهري للحبل . (1ن)

5-ضبط الوماض على القيمة $N_e = 126 Hz$. ماذا نشاهد ؟ أحسب المسافة التي تقطعها الموجة بين ومضتين متتاليتين استنتاج v السرعة الظاهرة للموجة . (5,5ن)

تمرين 2 : (6,5نقطة)



نضيء شقا راسيا عرضه $a = 120 \mu m$ بجزمة ضوء أحادي اللون طول موجته λ منبعث من منبع الليزر ، انظر الشكل أسفله حيث الشاشة تبعد عن الشق بمسافة $D = 1,8 m$.

1-ما اسم الظاهرة التي تسبب في ظهور هذا الشكل على الشاشة ؟ ما الشرط الذي ينبغي تحقيقه للحصول على ذلك ؟ (1ن)



2-أعط تعريف الانحراف الزاوي θ ومثله على الشكل . (1,5 ن)

3-أكتب العلاقة بين λ و a و θ . (0,5 ن)

4-أوجد العلاقة بين L عرض البقعة المركزية و λ و D و a في حالة θ صغيرة جدا . (1 ن)


5-باستعمال المبيان جانبه و الممثل ل $f(t) = \theta$ بين أن طول الموجة λ للضوء الاحادي اللون المستعمل هو $\lambda = 600 nm$ (1,5 ن)

6-نعيد التجربة باستعمال شقين عرضهما على التوالي $a_1 = 60 \mu m$ و $a_2 = 80 \mu m$ فنحصل على الشاشة على الشكلين A و B أسفله حدد، معللا جوابك ، الشكل الموافق للشق ذو العرض ذي العرض a_1 و الموافق للشق ذي العرض a_2 . (1 ن)



الكيمياء (7 نقط)

عند اللحظة $t=0$ ندخل كتلة $m = 1,3g$ من فلز الزنك في حوجلة تحتوي على $V = 40 mL$ من محلول حمض الكلوريدريك تركيزه $C = 0,50 mol \cdot L^{-1}$ لتبعد تطور هذا التفاعل نقىس حجم ثنائي الهيدروجين (H_2) الناتج في الشروط العادية لدرجة الحرارة والضغط ،مكتننا هذه التقنية من رسم المنحنى $f(t) = x$. (أنظر المنحنى أسفله) يتفاعل حمض الكلوريدريك ($H^+ + Cl^-$) مع الزنك Zn وفق المعادلة التالية :



1-حدد المذدوجتين المتدخلتين في التفاعل Ox/Red ، حدد المتفاعلات الذي تأكسد والمتفاعل الذي اخترز . (0,5 ن)

2-اذكر جميع الطرق التي يمكن بها تتبع تطور هذا التحول . (1 ن)

3-اجسب كمية مادة المادة البدئية لكل من المتفاعلين و أنشئ جدول التقدم لهذا التحول . (1 ن).

4-عين المتفاعل المهد وأعط قيمة التقدم الاقصى x_{max} للتفاعل . (1 ن)
نعطي : $M(Zn) = 65 g \cdot mol^{-1}$

5-أعط تركيب المجموعة الكيميائية عند اللحظة $s = 400 s$. (0,5 ن)

6-السرعة الجمية للتفاعل

6-1-عرف السرعة الجمية للتفاعل واحسب قيمتها عند اللحظة $t=0$ s و عند اللحظة $t=400$ s (1,5 ن)

6-2-كيف تتغير السرعة الجمية للتفاعل ؟ اعط تفسيرا لذلك . (0,5 ن)

6-3-عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ و حدد قيمته (بين $t_1/2$ على المنحنى $x=f(t)$ أسفله) (1 ن).

