




تمرين 1

- I. ننجز عمود زنك/فضة حيث المزدوجات المتفاعلة Zn^{2+}/Zn و Ag^+/Ag . يحتوي العمود على $V = 100mL$ من المحاليل الإلكترولية تراكيزها $C = 0.2mol.L^{-1}$ من الأيونات الفلزية الموافقة.
- $$F = 9,65 \cdot 104 C \cdot mol^{-1}$$
- $$M(Ag) = 107,9g \cdot mol^{-1}$$
- 1- مثل تبیانة العمود المحصل عليه.
 2- ثابتة التوازن المقرونة بالمعادلة التالية :
- $$Zn^{2+} + 2Ag^+ \rightleftharpoons Zn + 2Ag$$
- $$K = 1,0 \cdot 10^{-52}$$
- 1- حدد منحى تطور المجموعة الكيميائية
 2- أكتب أنسابـ المعادلات الأكسدة و الاختزال عند كل إلكترود ، واستنتج قطبية العمود
- 3- اعط الشمثيل الاصطلاحي للعمود
 3- يشتعل العمود لمدة 30min و يعي تيارا شدته $I=150mA$
- 1- احسب قيمة التقدم بعد مدة الاشتغال
- II. ندخل كتلة g 2,3 من حمض AC وكتلة 1,6 g من كحول A في حوجلة درجة حرارتها ثابتة ($50^\circ C$) فيحدث التحول الكيميائي التالي
- $$\begin{array}{c} OH \\ | \\ CH_3-CH_2 + CH_3-C=O \rightleftharpoons CH_3-C-O-CH_2-CH_3 + H_2O \\ || \\ 0 \end{array}$$
- نلاحظ أن الكتلة النهائية $0,76g$ للحمض AC تبقى ثابتة لمدة 24h.
- 3- سم المتفاعلات و النواتج
 2- أحسب كميات المادة البديلة للمتفاعلات.
 3- أكتب معادلة التفاعل .
 4- احسب قيمة ثابتة التوازن
 5- ما قيمة مردود التحول ؟ هل هذه النتيجة متوقعة ؟ علل جوابك.
 6- بين كيف يمكن الرفع من قيمة مردود هذا التحول باستعمال نفس المتفاعلات ؟
- الكتل المولية ب g/mol هي $M(O)=16 ; M(H)=1 ; M(C)=16$

تمرين 2

- طبقعة حركة الجسم على هذا المسار
- 3- احسب شدة القوة المطبقة من طرف السطح على الجسم
 4- اعط تعريف المعادلة الزمنية للحركة
 5- احسب السرعة التي سيصل بها الجسم الى النقطة B
 6- يصل الجسم الى النقطة B فتحدف القوة \vec{F} فينزلق الجسم فوق المستوى الفقي BA فيتوقف عند النقطة A تحت تأثير قوة احتكاك \vec{f} ، احسب شدة القوة f
 نعطي $BC=2m$ و $OA=1m$ و $g=10m.s^{-2}$

طبق على جسم (S) كتلته $m=0,5Kg$ قوة افقية شدتها $F=100N$ خط تأثيرها مواز للمستوى المائل بزاوية $\alpha=30^\circ$ فينطلق الجسم (S) من النقطة C في اللحظة $t=0$ بدون سرعة بدئية ، وفق مسار مستقيم BC و بدون احتكاك



- 1- اجرد القوى المطبقة على الجسم S و مثلاها على الشكل بدون سلم
 2- اوجد تعريف احداثيات متوجه التسارع ثم استنتاج

تمرين 2

- 1- اوجد اطالة Δl_0 النابض عند التوازن
 2- اوجد المعادلة التفاضلية للحركة
 3- اوجد قيمة الدور الخاص T_0 و قيمة الطور φ عند اصل التواريخ ثم استنتاج تعريف المعادلة الزمنية
 4- باعتبار المستوى المار من $z=0$ حالة مرجعية لطاقة الوضع المرنة وطاقة الوضع التقالي ، احسب عند $t=314ms$
- 1- طاقة الوضع المرنة
 - 2- طاقة الوضع التقالي
 - 3- الطاقة الحركية

نعتبر نوasa مينا رأسيا مكون من نابض صلابتة $K=20N/m$ و جسم صلب (S) كتلته $m=200g$ نزير الجسم رأسيا عن موضع توازنه المستقر ب $3cm$ ثم نحرره بدون سرعة بدئية ، نعتبر معلوما $(\vec{k}; O)$ رأسيا موجه نحو الاسفل اصله O منطبق مع مركز قصور الجسم (S) عند التوازن
 نعتبر لحظة مرور الجسم من موضع توازنه المستقر في المنحى الموجب اصلا للتواريخ $t=0$