

نريد تبع تصنيع الإستر ذي رائحة التفاح المسمى بوتانونات الميثيل ، لذلك ننجز خليطا يحتوي على $n_1 = 0,5 \text{ mol}$ من حمض كربوكسيلي و $n_2 = 0,5 \text{ mol}$ من كحول . نوزع الخليط على سبعة أنابيب اختبار ثم نضعها في حمام مريم درجة حرارته ثابتة عند اللحظة $t=0$. بعد ساعة من الزمن نخرج الأنابيب رقم 1 ، نبرده بالغطس ثم نقوم بمعايرة كمية الحمض المتبقى ، نقوم بنفس العملية بالنسبة للأنابيب السبعة مكنت من خط المنحنى التالي $x = f(t)$. نعرف تقدم التفاعل للأستر بمقدار مادة الإستر x الناتج عنه .

- أكتب معادلة التفاعل الحاصل في كل أنابيب محدداً أسمى كلًا من الحمض الكربوكسيلي والكحول

2- أنشئ جدول تطور المجموعة، ثم أحسب مردود التفاعل

3- ذكر بتعريف السرعة الحجمية للتفاعل؟ كيف تتطور السرعة خلال التفاعل؟ علل جوابك


4- أحسب ثابتة التوازن K لتفاعل الأستر

5- لإزاحة التفاعل، نضيف مولا واحداً من الحمض الكربوكسيلي

5-1- حدد قيمة خارج التفاعل Q_{Ri} ثم عين منحي تطور المجموعة

5-2- حدد القيمتين الجديدين لكل من التقدم النهائي و المردود لتفاعل الأستر في حالة التوازن الجديد

5-3- كيف يمكن الرفع من قيمة مردود التفاعل؟



نعتبر نوasa مكوناً من جسم (S) كتلته $g \text{ m} = 500 \text{ g}$ مرتبطة بنايبض ذي لفات غير متصلة صلابته K وكتلته مهملة. توجد المجموعة فوق مستوى مائل بزاوية $\alpha = 30^\circ$ حيث ينزلق الجسم بدون احتكاك (الشكل)

1- أوجد إطالة النابض Δl_0 عند التوازن بدلالة m ، شدة الثقالة g و α

2- نزير الجسم عن موضع توازنه ($x=0$) بمسافة Xm ثم نحرره بدون سرعة بدئية .

2-1 يمثل الشكل 2 تسجيل الحركة. حدد انطلاقاً من التسجيل

وسع الحركة والدور الخاص للحركة ثم بين أن $K = 10 \text{ N.m}^{-1}$

2-2 بتطبيق القانون الثاني لنيوتون حدد المعادلة التفاضلية للحركة

2-3 حدد المعادلة الزمانية للحركة

2-4 نعتبر المستوى الأفقي الذي يضم مركز القصور عند التوازن ($x=0$) أصلاً لطاقة

الوضع الثقالية و الحالـة التي يكون فيها النابض غير مشوه ($x = -\Delta l_0$) أصلاً لطاقة الوضع المرنـة

$$E_p = \frac{1}{2} K (\Delta l_0^2 + x^2)$$

2-4-1 أوجد بطريقتين سرعة مركز قصور الجسم عند مروره من الموضع $x = 2 \text{ cm}$

نعتبر نوasa وازنامكوناً من ساق متجلسة كتلتها $g = 50 \text{ cm} = 0,6 \text{ Kg}$ وطولها $l = 0,6 \text{ m}$ ، تدور في مستوى رأسى حول محور (Δ) ومار

من إحدى نقطها A (انظر الشكل)، نأخذ $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ و عزم قصور الساق بالنسبة للمحور (Δ) هو $J_\Delta = 5 \cdot 10^{-2} \text{ kg.m}^2$

1- عبر بدلالة θ , l , m و g عن طاقة الوضع للنوسـاس، نأخذ المستوى الأفقي المار من G_0 موضع مركز القصور عند التوازن حيث $z=0$ كـحالـة مرجـعـية لـطاـقة الـوضـعـ الثـقاـليـةـ (ان)

2- تطلق الساق من موضع التوازن بسرعة زاوية بدئية $\theta_0 = 3,16 \text{ rad.s}^{-1}$

2-1 أحسب الطاقة الميكانيـكـية للمجموعـةـ

2-2 باعتبار انـحـاطـ الطـاقـةـ المـيكـانـيـكـيةـ حـدـدـ المـعـادـلـةـ التـفـاضـلـيـةـ لـحـرـكـةـ السـاقـ

2-3 حدد وسع تدبـباتـ السـاقـ

3- من جديد نزير الساق عن موضع توازـنـهاـ المستـقرـ بـزاـوـيـةـ $\theta_0 = 11 \text{ rad.s}^{-1}$ ثم نحرـرـهاـ بـسرـعـةـ بدـئـيـةـ $\frac{\pi}{4}$

بيـنـ أنـ حـرـكـةـ السـاقـ لـيـسـ تـذـبذـبـيـةـ

4- نـتـعـرـ الطـاقـةـ المـيكـانـيـكـيةـ عـنـدـمـاـ لـاـيـجـاـزـ وـسـعـهـاـ الـقـيـمـةـ $\theta = 0,26 \text{ rad.s}^{-1}$ حيث التـذـبذـبـاتـ جـيـبـيـةـ ، مـاـلـقـيـمـةـ الـقـصـوـيـةـ الـتـيـ يـجـبـ

أـنـ تـأـخـذـهـاـ الطـاقـةـ المـيكـانـيـكـيةـ لـلـمـجـمـوعـةـ لـكـيـ تكونـ التـذـبذـبـاتـ جـيـبـيـةـ