

الجزء الأول:  
الموجات  
الوحدة 2  
5 س


## الموجات الميكانيكية المتوازية الدورية *Les ondes mécaniques progressives périodiques*

دینلہلی الحجج الرئیسیہ  
دینلہلی حجج الرئیسیہ  
الثانیة باکالوریا  
الفيزياء

### 1- الموجة الميكانيكية المتوازية الدورية :

#### 1-1 نشاط :

نصل ميكروفون براسم التذبذب ، فنعاين موجتين صوتيتين :



أ- هل الموجات المحصل عليها دورية؟

نعم ، لأن التشوه الحاصل لكل نقطة من وسط الانتشار يتغير بشكل دوري مع الزمن .

ب- قارن بين الرسمتين التذبذبيتين المحصلتين .

الموجة المنبعثة من الآلة الموسيقية موجة ميكانيكية متوازية دورية بينما الموجة المنبعثة من المرنان موجة ميكانيكية متوازية جيبية ، لأن تغير التشوه عبارة عن دالة جيبية بالنسبة للزمن .

ج- احسب الدور  $T$  للموجة الصوتية ، علما أن زر الحساسية الأفقية هو  $0,5 \text{ ms/div}$

$$\text{الموجة الصوتية المنبعثة من الآلة الموسيقية : } T = 2 \times 0,5 \cdot 10^{-3} = 10^{-3} \text{ s}$$

$$\text{الموجة الصوتية المنبعثة من المرنان : } T = 2 \times 0,5 \cdot 10^{-3} = 10^{-3} \text{ s}$$


د- استنتاج تردد الموجة المنبعثة من المرنان .

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10^{-3}} = 10^3 \text{ Hz}$$

#### 2-تعريف :

**الموجة الميكانيكية المتوازية الدورية** هي موجة يكون فيها التطور الزمني للتتشوه الحاصل لكل نقطة من وسط الانتشار دوريًا .

**مثال :** يمكن لموجة طول حبل أو على سطح الماء أن تكون دورية إذا كان للمنبع حركة دورية .



#### 3-1 الدورية الزمنية :


**الدور الزمني**  $T$  لموجة متوازية دورية هو أصغر مدة زمنية تعود خلالها نقطة من وسط الانتشار إلى نفس الحالة الاهتزازية .

## ٤-٤- الدورية المكانية :

**الدورية المكانية** لمواضيع متساوية هي أقصى مسافة تفصل بين نقطتين تتميزان بنفس حالة التشوه.

## ٢- الموجة الميكانيكية المتوازية الجيبية :

### ١-٢- نشاط :



نثبت أحد طرفي حبل من نهاية سفرة هزار تتحرك بتردد  $100 \text{ Hz} = v$  تتجز حرقة مستقيمية جيبية ، بينما يوضع الطرف الثاني في كأس به ماء لامتصاص الموجة . نشغل الهزار ونضيء الحبل بواسطة وماض . يمثل الشكل جانبية مظهر الحبل في لحظة  $t$  بالسلم الحقيقي .

أ- ماذا تلاحظ عند تغيير تردد الوماض ؟

تظهر نقط الحبل في حرقة بطيئة عند تغيير تردد الوماض ، وتظهر متوقفة عندما يكون تردد الحبل مساوياً لتزداد الوماض .

ب- ما شكل مظهر الحبل ؟

شكل مظهر الحبل يوافق دالة جيبية .

ج- ما طبيعة حرقة  $M$  نقطة من الحبل ؟ ما طبيعة الموجة ؟

حرقة مستقيمية جيبية أي  $Y_M = f(t) = A \sin(\omega t + \phi)$  دالة جيبية بالنسبة للزمن ، نقول إن الموجة متوازية جيبية .

د- يتميز مظهر الحبل بدورية مكانية تسمى طول الموجة  $\lambda$  ، قس طول الموجة  $\lambda$  .  $\lambda = 4 \text{ cm}$

هـ- احسب  $\frac{\lambda}{T}$  ، ما وحدته ؟ ماذا يمثل هذا المقدار ؟

$$V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot v = 4 \cdot 10^{-2} \times 100 = 4 \text{ m.s}^{-1}$$

و- أكتب المسافات  $M_1M_2$  و  $M_2M_3$  و  $M_1M_3$  بدلالة  $\lambda$  ، وقارن الحالات الاهتزازية لـ  $M_1$  ،  $M_2$  ،  $M_3$  .

نلاحظ أن هذه النقط لها نفس الحرقة عند نفس اللحظة .  $M_1M_3 = 2\lambda$  و  $M_1M_2 = M_2M_3 = \lambda$

### ٢-تعريف :


نقول إن الموجة المتوازية **جيبيّة** إذا كان المقدار الفيزيائي الذي يقاس به التشوه متغيراً في الزمن وفق قانون جيبي .

### ٣- طول الموجة :


نسمي **طول الموجة**  $\lambda$  المسافة التي تقطعها الموجة المتوازية الجيبية خلال مدة زمنية تساوي دورها  $T$  .

$$\lambda = V \cdot T = \frac{V}{v}$$

تمثيل حرقة نقطة من حبل بدلالة الزمن



تمثيل مظهر حبل في لحظة معينة



إذا كانت  $MN = K\lambda$  حيث  $K \in \mathbb{Z}$  ، فإن النقطتين  $M$  و  $N$  تهتزان على توافق في الطور.

إذا كانت  $MN = (2K + 1)\frac{\lambda}{2}$  حيث  $K \in \mathbb{Z}$  ، فإن النقطتين  $M$  و  $N$  تهتزان على تعكس في الطور.


يمثل طول الموجة  $\lambda$  أصغر مسافة تفصل بين نقطتين من وسط الانتشار تهتزان على توافق في الطور.

### 3- ظاهرة الحيد:


#### 3-1-3 نشاط :

نحدث موجات مستقيمية في حوض الموجات تنتشر بسرعة  $V = 1 \text{ m.s}^{-1}$  ، ثم نضيء سطح الماء بوماض يساوي تردد تردد الموجات (10 Hz) ، فتشاهد توقفاً ظاهرياً لجميع نقط سطح الماء . نضع في الحوض صفيحتين موازيتين للموجة وتفصل بينهما فتحة عرضها  $a$  قابلة للتغيير . نغير  $a$  ونحصل على الشكلين التاليين :

شكل 2 :  $a = 0,3 \text{ m}$



شكل 1 :  $a = 0,1 \text{ m}$



أ- احسب طول الموجة الواردة وقارنه بطول الفتحة  $a$  في كل شكل .

لدينا  $\lambda = \frac{V}{f} = 0,1 \text{ m}$  . نلاحظ في الشكل 1 أن  $a = \lambda$  وفي الشكل 2 أن  $a > \lambda$  .

ب- صف بالنسبة لكل شكل ما يحدث للموجات عند اجتيازها للفتحة .

في الشكل 1 نحصل على موجة دائرية بعد اجتياز الفتحة بينما في الشكل 2 تبقى الموجة مستقيمية بعد اجتياز الفتحة .


ج- تسمى الموجة الدائرية المتولدة الموجة المحيدة والظاهرة ظاهرة الحيد . ما شروط حدوث هذه الظاهرة ؟

لحوث هذه الظاهرة يجب أن تكون  $a < \lambda$  .

د- قارن طول الموجة المحيدة مع طول الموجة الواردة .  
نلاحظ أن لها نفس طول الموجة .

#### 3-2-3 تعريف :

عند التقائه موجة متوازية جيبية ب حاجز به فتحة عرضها  $a$  يحدث **تغير في بنية الموجة** ، أي تغير في اتجاه انتشارها ، إذا كانت  $\lambda < a$  حيث  $\lambda$  طول الموجة الواردة على الحاجز ، وتسمى هذه الظاهرة **ظاهرة الحيد** .



### 3- خصائص الموجة المحيدة :

تكون للموجتين **الواردة والمحيدة** نفس طول الموجة ونفس التردد ونفس السرعة في حالة عدم تغيير وسط الانتشار .

### 4- الوسط المبدد :

#### 1- نشاط :

نحدث موجة دائرية في حوض الموجات ، نضبط تردد الموجة الدائرية على قيمة مختلفة ، وفي كل مرة نضيء سطح الماء بوماض ضبط تردد على قيمة تساوي تردد الموجة . نشاهد توقفاً ظاهرياً لجميع نقاط سطح الماء ، ثم نقيس طول الموجة المبدد .

أ- اعط العلاقة بين السرعة  $V$  لانتشار الموجة وترددها  $v$  و طول موجتها  $\lambda$  .

$$\text{لدينا } V = \lambda \cdot v .$$

ب- أتمم ملأ الجدول .

$v(\text{Hz})$	20	25	30	35
$\lambda(\text{m})$	1	0,9	0,8	0,7
$V(\text{m/s})$	20	22,5	24	24,5

ج- نعرف الوسط المبدد بكونه وسطاً تتعلق فيه سرعة انتشار الموجة بتردداتها . هل الماء وسط مبدد؟ نلاحظ أن سرعة انتشار موجة متوازية على سطح الماء تتعلق بالتردد  $v$  ، نقول إن الماء **وسط مبدد** .

### 2- تعريف :

نقول إن **الوسط مبدد** ، إذا تعلقت سرعة انتشار الموجة داخل هذا الوسط بتردداتها .

#### مثال :

❖ سطح الماء وسط مبدد .

❖ الهواء وسط غير مبدد للموجات الصوتية .