

الجزء الأول :
الموجات
الوحدة 3
5 س


انتشار موجة ضوئية

Propagation d'une onde lumineuse

بیتة الیخ
الثانية باك لوريا
الفيزياء

1- حيود الضوء :

1-1- نشاط :



نضيء شقا ، عرضها a قابل للضبط ،
بحزمة الليزر كما يوضح الشكل جانبه .
أ- ماذا تلاحظ على الشاشة عندما يكون
عرض الشق كبيرا ؟

نشاهد بقعة ضوئية واحدة .

ب- ماذا تلاحظ على الشاشة عندما يكون
عرض الشق صغيرا (انظر الشكل)؟

نلاحظ عدة بقع ذات إضاءات قصوى (أهداب لامعة) تتوسطها بقع مظلمة (أهداب داكنة) .

ج- هل تغير اتجاه انتشار الضوء في الحالتين ؟

نلاحظ في الحالة الأولى عدم تغير اتجاه انتشار الأشعة الضوئية ، في حين يتغير اتجاه انتشار الأشعة
الضوئية في الحالة الثانية بحيث يمكنها الوصول إلى أماكن توجد وراء الحاجز وهذا يتعارض مع مبدأ
الانتشار المستقيمي للضوء .

د- هل سبق وأن صادفت مثل هاته الظاهرة في حالة الموجات الميكانيكية ؟ اعط اسم الظاهرة .

نعم ، وتسمى ظاهرة الحيود .

ه- ماذا يمكن استخلاصه فيما يخص طبيعة الضوء ؟


مماثلة مع الموجات الميكانيكية ، نعتبر الضوء موجة كهرومغناطيسية .

1-2- مفهوم حيود الضوء :

ينتقل الضوء ، من نقطة إلى أخرى في وسط الانتشار ، وفق خطوط مستقيمة ، سواء كان هذا الوسط
فراغا أو وسطا ماديا.

عند إضاءة شق عرضه a صغير بحزمة ليزر نلاحظ على الشاشة بقعا مضيئة (أهداب لامعة) وأخرى
مظلمة (أهداب داكنة) حيث يتصرف الشق كمنبع ضوئي وتسمى هذه الظاهرة **ظاهرة الحيود** حيث
يتغير اتجاه انتشار الأشعة الضوئية بحيث يمكنها الوصول إلى أماكن توجد وراء الحاجز .

مظهر الشاشة في حالة فتحة دائرية



مظهر الشاشة في حالة فتحة مستطيلة



1-3- النموذج الموجي للضوء :

إن الاقتصار على الانتقال المستقيمي للضوء ، لا يمكن من تفسير وصول الضوء لأماكن تتواجد وراء الحاجز .
وبالمماثلة مع الموجات الميكانيكية ، نعتبر **الضوء موجة مستعرضة كهرومغناطيسية** (عبارة عن مجال
كهربيائي مرفق بمجال مغناطيسي) تنتشر في أوساط شفافة مادية وغير مادية ، لها دورية مزدوجة :

الدورية الزمانية : وتتميز بالدور T أو التردد ν حيث $\nu = \frac{1}{T}$ وهما لايتعلقان بطبيعة وسط الانتشار .

الدورية المكانية : وتتميز بطول الموجة λ وهو يتعلق بطبيعة وسط الانتشار .

ملحوظات :

⊕ يمكن مشاهدة حيود الضوء بواسطة شق عرضه a عندما يكون : $10\lambda \leq a \leq 100\lambda$.

⊕ إذا لم يتغير وسط الانتشار ، يكون للموجتين الواردة و المحيدة نفس طول الموجة λ والدور T و

سرعة الانتشار V . وترتبط هذه المقادير بالعلاقة التالية : $V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu$

⊕ خلال حيود موجة ضوئية أحادية اللون ، طول

موجتها λ ، بواسطة شق عرضه a ، يكون الفرق

الزاوي θ بين وسط البقعة المركزية وأول بقعة

مظلمة هو : $\theta = \frac{\lambda}{a}$ و $\theta = \frac{L}{2D}$

⊕ تكون ظاهرة الحيود أكثر أهمية عندما يكون عرض

الشق أصغر أو طول موجة الضوء الأحادي اللون

المستعمل أكبر .

4-1- خصائص الموجة الضوئية :

⌚ نسمي **ضوءا أحادي اللون** كل ضوء لا يتبدد بعد اجتيازه لموشور ، وهو عبارة عن **موجة**

متوالية جيئية تتميز بتردد ν وبسرعة V .


⌚ ينتشر الضوء في الفراغ بسرعة $c = 29979245 \text{ m.s}^{-1} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ ، أما في

وسط مادي فإن هذه السرعة V تصبح أقل من c .

⌚ نسمي سرعة انتشار موجة ضوئية في وسط مادي المقدار $V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu$ أما في الفراغ فهي

$c = \frac{\lambda_0}{T} = \lambda_0 \cdot \nu$.

⌚ **مجال الموجات الضوئية المرئية :**



مجال مختلف الاشعاعات بدلالة طول الموجات

2- تبديد الموجات الضوئية :

1-2- معامل الانكسار :

الشعاع الضوئي ينكسر أثناء المرور من وسط انتشار لآخر ، ويتميز كل وسط بمعامل انكسار نرسم له ب n ، يعرف بالعلاقة التالية : $n = \frac{c}{v}$ ($n \geq 1$) .

حيث c سرعة انتشار الضوء في الفراغ $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$ مع $c = \frac{\lambda_0}{T} = \lambda_0 \cdot v$ طول موجة الضوء في الفراغ .

v سرعة انتشار الضوء في الوسط مع $V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot v$ طول موجة الضوء في الوسط .

وبالتالي $n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{c}{\lambda v}$ إذن يتعلق معامل انكسار وسط ما بتردد الموجة الضوئية التي تنتشر فيه .

الإشعاع	الأحمر	البرتقالي	الأصفر	الأزرق	البنفسجي
طول الموجة $\lambda(\text{nm})$	768	656	589	486	434
معامل الانكسار n	1,618	1,627	1,629	1,641	1,652

2-2- قانون ديكارت للانكسار :

1-2-2- نشاط :

نرسل حزمة منبعثة من منبع لآزر على وجه موشور .
أ- صف ما تشاهده على الشاشة . هل يتحقق مبدأ الانتشار المستقيمي للضوء ؟

تظهر بقعة حمراء على الشاشة ، كما أنه لا يتحقق مبدأ الانتشار المستقيمي للضوء لأنه حدثت انكسارات للحزمة .

ب- كم عدد انكسارات الحزمة الضوئية بعد اجتيازها الموشور ؟

الحزمة الضوئية تعرضت لانكسارين .

ج- ذكر بقانون ديكارت الثاني للانكسار .

زاوية ورود وزاوية الانكسار ترتبطان بالعلاقة التالية : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

2-2-2- قانون ديكارت للانكسار :

الشعاع الضوئي يغير اتجاهه عند المرور من وسط انتشار إلى وسط انتشار آخر ، ويخضع هذا الانتقال لقانون ديكارت للانكسار $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

حيث n_1 : معامل الانكسار المطلق للوسط 1 n_2 : معامل الانكسار المطلق للوسط 2

i_1 : زاوية ورود في الوسط 1 i_2 : زاوية الانكسار في الوسط 2


3-2- العلاقات المميزة للموشور :

الموشور وسط شفاف ومتجانس ، محصور بين مستويين مائلين يحددان

بينهما زاوية A تسمى زاوية الموشور .

ليكن n معامل انكسار الوسط المكون للموشور ونعتبر $n=1$ معامل انكسار الهواء حيث يوجد الموشور .





$$\begin{aligned}\sin i &= n \sin r \\ \sin i' &= n \sin r' \\ A &= r + r' \\ D &= i + i' - A\end{aligned}$$

الموشور يتميز بالعلاقات التالية :

D : زاوية الانحراف للشعاع الضوئي بواسطة موشور .

2-4- تبديد الضوء بواسطة موشور :

عند إرسال حزمة من الضوء الأبيض على وجه موشور ، تتعرض هذه الموجة الضوئية لظاهرة الانكسار مرتين ، فيلاحظ على الشاشة تكون بقع ملونة يسمى **طيف الضوء الأبيض** ، ونسمي هاته الظاهرة التي تمكن من فصل الإشعاعات ذات الألوان المختلفة **بتبديد الضوء** ، ونسمي الموشور **وسطا مبيدا للضوء** .

تبرز ظاهرة تبديد الضوء بواسطة موشور ، أن الضوء الأبيض مكون من عدة ألوان من طيف الضوء المرئي ، نقول إن الضوء الأبيض متعدد

الألوان وكل ضوء (لون) مكون للطيف يسمى ضوءا أحادي اللون .

2-5- تفسير حدوث ظاهرة التبديد :

نعلم أن معامل انكسار n للوسط يتعلق بطول موجة الشعاع الذي

يجتازه $n = \frac{\lambda_0}{\lambda}$ أي بلون الضوء .

الحزمة الضوئية الواردة على الموشور أسطوانية ، أشعة متوازية فيما بينها ، فإن لجميع الأضواء الأحادية اللون المكونة للضوء الأبيض نفس زاوية الورود i .

فمثلا بالنسبة للشعاع الأحمر والبنفسجي لدينا

$n_R \neq n_V$ (لأن ليس لهما نفس طول الموجة)

وبتطبيق علاقات الموشور :

$$\begin{aligned}r_R \neq r_V &\Leftarrow \sin i = n \sin r \\ r'_R \neq r'_V &\Leftarrow A = r + r' = cte \\ i'_R \neq i'_V &\Leftarrow \sin i' = n \sin r' \\ D_R \neq D_V &\Leftarrow D = i + i' - A\end{aligned}$$

وبالتالي ليس للشعاعين الأحمر والبنفسجي نفس الاتجاه النهائي ، فنلاحظ :

$$D_V > D_B > D_{Vr} > D_J > D_{Or} > D_R$$

أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق بنفسجي

$$\lambda_V < \lambda_B < \lambda_{Vr} < \lambda_J < \lambda_{Or} < \lambda_R$$

إذن يتعلق معامل انكسار وسط شفاف بتردد الإشعاعات الضوئية ، وهذا ما يسبب ظاهرة تبديد الضوء .