

## التمرين 1

أعط تعريفاً للمفاهيم التالية :

ظاهرة حيود الضوء - موجة كهرومغناطيسية - ضوء أحادي اللون - معامل الانكسار - بعد الضوء .

## التمرين 2

يمثل الشكل أسفله حيود ضوء لازر بواسطة شق عرضه  $a$  على شاشة توجد على مسافة  $D = 2,0\text{ m}$  من الشق . نعطي طول موجة الضوء الأحمر :  $\lambda_R = 670\text{ nm}$



1) ارسم تبیانة التركيب التجربی موضحاً إذا كان الشق أفقیاً أم رأسیاً .

2) بين على التبیانة المقابد  $a$  و  $D$  عرض البقعة المركزیة ، و  $\theta$  الفرق الزاوي بين مركز البقعة المركزیة وأول هدب مظلم .

3) أكتب العلاقة بين  $a$  و  $\lambda$  و  $\theta$

4) نقیس على الشاشة عرض البقعة المركزیة فنجد :  $L_R = 12\text{ mm}$  . أحسب  $a$

5) نستعمل منبع لازر يعطي ضوءاً أخضر طول موجته  $\lambda_V = 532\text{ nm}$  مع الاحتفاظ بنفس التركيب التجربی .

1.5) أحسب  $L_V$  عرض البقعة المركزیة بالنسبة للضوء الأخضر .

2.5) كيف يتغير شكل ظاهرة الحيود على الشاشة مع طول الموجة ؟

## التمرين 3

تنجز تجربة حيود الضوء المنبعث من جهاز الليزر باستعمال شق عرضه  $a$  طول موجة الليزر  $\lambda = 633\text{ nm}$

نقیس عرض البقعة المركزیة :  $d$  بالنسبة لقيم مختلفة للعرض  $a$  فتحصل على النتائج التالية

1) كيف يتغير العرض  $d$  عندما يتناقص العرض  $a$  الشق ؟


2) بمثابة المنحنى أسفله تغييرات  $d$  بدالة  $\frac{1}{a}$  ماذا تستنتج ؟

3) كم يساوي عرض الشق الذي يحدث على الشاشة بقعة مركزیة عرضها :  $d = 18\text{ mm}$

4) أحسب المسافة الفاصلة بين الشق والشاشة إذا كان عرض الشق المستعمل هو :

$$a = 0,25\text{ mm}$$

5) نعرض الشق " بشعرة " سماها  $e$  ، نقیس على الشاشة عرض البقعة المركزیة، فنجد :  $d = 15\text{ mm}$  ، أحسب  $e$  .



## التمرين 4

تمكن دراسة ظاهرة حيود الضوء من تحديد تردد الموجات الضوئية .  
نجعل ضوءاً أحادي اللون طول موجته منبعاً من جهاز الليزر يرد عمودياً تباعاً على أسلاك رفيعة رأسية أقطارها معروفة .

نرمز لقطر السلك بالحرف  $D$  . نشاهد ظاهر الحيود المحصل على شاشة بيضاء توجد على مسافة  $D$  من السلك . نقیس العرض  $L$  للبقعة المركزیة ، ونحسب

انطلاقاً من هذا القياس الفرق الزاوي  $\theta$  بين منتصف البقعة المركزیة وأول بقعة مظلمة بالنسبة لسلك معین . (شكل 1)

معطيات :

✓ الزاوية  $\theta$  صغيرة معتبر عنها بالراديان ، حيث :


$$\tan \theta \approx \theta \quad c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

✓ سرعة انتشار الضوء في الهواء تقارب :

(1) أعط العلاقة بين  $d$  و  $\theta$  و  $\lambda$

(2) أوجد ، اعتماداً على الشكل 1 ، العلاقة بين  $L$  و  $\lambda$  و  $d$

$$(3) \text{ نمثل المنحنى } \theta = f\left(\frac{1}{a}\right) \text{ في الشكل 2 .}$$



# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

- (1.3) حدد انطلاقاً من هذا المنحنى ، طول الموجة  $\lambda$  للضوء الأحادي اللون المستعمل. استنتج تردد الموجة .
- (2.3) نضيء سلكاً رفيعاً بالضوء الأبيض عوض شعاع الليزر . علماً أن المجال المرئي للضوء يكون فيه طول الموجة محصوراً بين  $\lambda_R = 400 \text{ nm}$  (البنفسجي) و  $\lambda_R = 800 \text{ nm}$  (الأحمر)
- (أ) عين طول الموجة للضوء الأحادي اللون الذي يوافق أقصى قيمة لعرض البقعة المركزية .
- (ب) فسر لماذا يظهر لون أبيض وسط البقعة المركزية ؟

## التمرين 5

معامل الانكسار للزجاج هو :

✓  $n_R = 1,618$  بالنسبة للضوء الأحمر الذي طول موجته في الفراغ هو:  $\lambda_R = 768 \text{ nm}$

✓  $n_v = 1,655$  بالنسبة للضوء البنفسجي الذي طول موجته في الفراغ هو:  $\lambda_v = 434 \text{ nm}$


(1) أحسب سرعتي انتشار الموجتين الضوئيتين في الزجاج  $c = 3.18^8 \text{ m.s}^{-1}$

(2) استنتاج خاصية الزجاج التي تبررها هذه النتيجة .

## التمرين 6

تردد حزمة ضوئية رقيقة من الضوء الأبيض على وجه موشور بزاوية  $i = 23^\circ$  ، فتتبّع من الوجه الآخر للموشور أشعة ذات ألوان مختلفة من بينها الشعاعان الأحمر والأزرق .

معطيات:



✓ زاوية المنشور:  $A = 30^\circ$

✓ معامل الانكسار للهواء :  $n = 1$

✓ معامل انكسار المنشور بالنسبة للضوء الأزرق  $n_B = 1,523$

(1) أحسب زاوية الانحراف  $D_B$  التي يكونها اتجاه الشعاع الأزرق المنبع من المنشور مع اتجاه الحزمة الضوئية الواردة .

(2) علماً أن زاوية الانبعاث  $i'$  للشعاع الأحمر من المنشور تساوي زاوية الورود  $i$ ، استنتاج قيمة معامل الانكسار  $n_R$  للمنشور بالنسبة للضوء الأحمر .

(3) أحسب زاوية الانحراف  $D_R$  للشعاع الأحمر .

(4) حدد معللاً جوابك من بين الشعاعين المنبعين من المنشور الشعاع الأحمر والشعاع الأزرق

## التمرين 7

لتحديد تجريبياً طول موجة  $\lambda_0$  لضوء لازر حيث  $660 \text{ nm} \leq \lambda_0 \leq 680 \text{ nm}$  ، نعرض للحزمة الضوئية جزءاً به عرضه الذي يوجد على مسافة  $D$  من شاشة . ننجذب ثلاثة تجارب فنحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي :

عرض البقعة المركزية	عرض الشق	المسافة بين الشق والشاشة	المنبع	
$d_1 = 3,2 \text{ cm}$	a	D	$\lambda_1$	التجربة - 1
$d_2 = 4,0 \text{ cm}$	a	D	$\lambda_0$	التجربة - 2
$d_3 > d_1$	$a_3 < a$	D	$\lambda_1$	التجربة - 3

(1) ما هي الظاهرة التي ثم إبرازها ؟ ذكر خصائصي لضوء الليزر وأحد استعمالاته

(2) ماهي الصيغة التي تعبّر عن عرض البقعة المركزية من بين البدائل التالية :

$$d = \frac{2\lambda \times a}{D} \quad \text{ج -} \quad d = \frac{2a \times D}{\lambda} \quad \text{ب -} \quad d = \frac{2\lambda \times D}{a} \quad \text{أ -}$$

(3) أثبت العلاقة بين  $\lambda_1$  ،  $\lambda_0$  ،  $d_1$  ،  $d_2$  و  $d_3$

(4) أحسب كل من  $\lambda_0$  والتردد  $v$  للضوء المستعمل .



(5) حدد من بين المقادير أسفله المقدار المتغير حينما يمر هذا الضوء في الزجاج  
أ - التردد      ب - طول الموجة      ج - السرعة

نعطي :  $C = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}$  ،  $\lambda_1 = 543 \text{ nm}$

<b>2<sup>ème</sup> Bac (PC)</b>	<b>الموجات الضوئية</b>
-------------------------------------	------------------------

### التمرين 1


1) تنجز تجربة حيود ضوء الليزر بواسطة حزمة الليزر ذات قطر  $a$  مختلفة بوضع الشاشة على مسافة  $D = 1,6 \text{ m}$  من كل سلك. نقيس بالنسبة لكل سلك مستعمل العرض  $L$  للبقعة المركزية . اعتمادا على معطيات التمرين والقياسات المحصل عليها ، توصلنا إلى النتائج التالية :



1.1) أوجد العلاقة بين  $L$  ،  $D$  و  $\theta$  التي تعتبرها صغيرة .  
2.1) أعط العلاقة بين  $\theta$  و  $a$  و  $\lambda$  .

3.1) أوجد مبيانيا العلاقة بين  $\theta$  و  $a$  ، ثم استنتج قيمة طول الموجة  
4.1) صف ماذا تشاهد على الشاشة في حالة تعويض الليزر بالضوء الأبيض .

(2) المنشور وسط مبدد، بحيث يحل الضوء المركب المسلط عليه.



- 1.2) ما هو المقدار الفيزيائي المميز للموجة الضوئية الأحادية اللون الذي يبقى ثابتاً مهما كان الوسط الشفاف للانتشار ؟  
2.2) عرف معامل الانكسار لوسط متجلانس شفاف بالنسبة لإشعاع ضوئي معين تردد  $v$   
3.2) عرف الوسط المبدد هل يتعلق معامل الانكسار لهذا الوسط بتردد الإشعاع الأحادي اللون ينتشر فيه ؟  
4.2) نعرض المنشور لحزمة دقيقة من الضوء الأبيض ، فنشاهد على الشاشة ألوان الطيف  
أ) ما اسم الظاهرة الملاحظة على الشاشة ؟  
ب) باعتمادك على قانون ديكارت للانكسار اعط تفسيراً لهذه الظاهرة .