

النوى - الكتلة والطاقة

Noyaux – masse et énergie



النوى - الكتلة والطاقة

١- التكافؤ "كتلة - طاقة" :

-1-1 : علاقہ اپنشتاپن :

توصل أينشتاين من خلال الميكانيك النسبيية الخاصة سنة 1905 م ، إلى أن هناك تكافؤ بين الكتلة والطاقة

تمتلك كل مجموعة كتلتها ، في حالة سكون ، طاقة E تسمى طاقة الكتلة .
 تعبيرها هو : $E = m.c^2$ وحدتها هي الجول J حيث c : سرعة الضوء في الفراغ
 $c = 299792458 \text{ m.s}^{-1} \approx 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$

تبين هذه العلاقة أنه عندما تتغير كتلة مجموعة بالمقدار Δm خلال تحول ما ، يكون تغير الطاقة الكتالية لهذه المجموعة هو : $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$

عندما تنقص كتلة مجموعة في سكون ($\Delta m < 0$) ، فإن طاقتها الكت十里ة تنقص كذلك ($\Delta E < 0$) :
تمنح المجموعة طاقة للوسط الخارجي . وعندما تزداد الكتلة ($\Delta m > 0$) ، فإن المجموعة تستقبل
طاقة من الوسط الخارجي ($\Delta E > 0$) .

وحدة الطاقة في (ن.ع) هي الجول J ، لكن في الفيزياء النووية يفضل استعمال الإلكترون-فولط (eV) ومضاعفاته حيث $1\text{MeV} = 10^6\text{eV} = 1,602177 \cdot 10^{-19}\text{J}$

أما بالنسبة لكتلة الذرية نستعمل وحدة الكتلة الذرية u وهي تساوي $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة الكربون 12.

نعلم أن مولا واحدا من ذرات الكربون 12 يتكون من $N = 6,02 \cdot 10^{23}$ ذرة وكتلته هي 12g

نعلم أن مولا واحدا من ذرات الكربون 12 يتكون من $N = 6,02 \cdot 10^{23}$ ذرة وكتلته هي 12g . وبالتالي :

$$1u = 1,66054 \cdot 10^{-27} kg \quad \text{فجد} \quad 1u = \frac{1}{12} m(^{12}_6C) = \frac{M(^{12}_6C)}{12 \cdot N_A} = \frac{12}{12 \times 6,02 \cdot 10^{23}}$$

الطاقة المكافأة لوحدة الكتلة الذرية هي :

الطاقة المكافأة لوحدة الكتلة الذرية هي :


$$E = m \cdot c^2 = 1u \cdot c^2 = 1,66054 \cdot 10^{-27} \times (299792458)^2 = 1,49242 \cdot 10^{-10} J$$

$$1u = 931,5 \frac{MeV}{c^2} \quad \text{و منه فإن} \quad E = \frac{1,49242.0^{-10}}{1,602177.10^{-13}} = 931,5 MeV \quad \text{أي}$$

2- طاقة الربط :

النقد الكتائبي: 1-2

بيّنت القياسات الدقيقة أن كتلة النواة تكون دائمًا أقل من مجموع كتل الدائئق المكونة لها.



فمثلاً كتلة نواة الهيليوم $m(^4_2He) = 6,6447 \cdot 10^{-27} kg$ أما مجموع كتل نوياتها فيساوي


$$2m_p + 2m_n = 2 \times 1,6726 \cdot 10^{-27} + 2 \times 1,6750 \cdot 10^{-27} = 6,6952 \cdot 10^{-27} kg$$

نستخلص إذن أن كتلة نواة الهيليوم أصغر من مجموع كتل نوياتها.

نسمى النقص الكتلي Δm لنواة رمزها Z^AX هو الفرق بين مجموع كتل النويات وكتلة النواة m مع $\Delta m > 0$ و m كتلة النواة

مثال: النقص الكتلي لنواة الهيليوم هو :

$$\Delta m = 6,6952 \cdot 10^{-27} - 6,6447 \cdot 10^{-27} = 5,0520 \cdot 10^{-29} kg$$



٤-٢- صفة الربط: تتماسك النواة نظراً لوجود قوى التأثيرات البينية القوية ، و لفصل نوياتها يجب إعطائهما طاقة تسمى طاقة الربط .

طاقة الربط E_1 لنواة هي الطاقة التي يجب إعطائها للنواة ، في حالة سكون ، لفصل نوياتها وتبقي في حالة سكون :

$$E_l = \Delta m \cdot c^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m(^A_Z X)] \cdot c^2$$

مع Δm النقص الكتلي

مثال : طاقة الربط بالنسبة لنواة الهيليوم هو :

$$E_l = \Delta m \cdot c^2 = 5,0520 \cdot 10^{-29} \times (3 \cdot 10^8)^2 = 4,55 \cdot 10^{-12} J$$

$$E_l = \frac{4,55 \cdot 10^{-12}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 2,84 \cdot 10^7 eV = 28,4 MeV$$

3-2 طاقة الربط بالنسبة لنوية :


تعرف ζ طاقة الربط بالنسبة لنوية بالعلاقة : $\zeta = \frac{E_l}{A}$ حيث E_l طاقة الربط للنواة و A عدد النويات

وحدة حم هي $MeV/nucléon$. كلما كانت طاقة الربط بالنسبة لنوية كبيرة ، كلما كانت النواة أكثر استقراراً.

مثال: طاقة الربط بالنسبة لنوية لنواة الهيليوم هو :

$$\xi\left({}^4_2He\right) = \frac{E_l}{4} = \frac{28,4}{4} = 7,1 MeV/nucléon$$

-4- منحنى أسطون :



يمكن مقارنة استقرار مختلف النوى وذلك بخط منحنى (χ) - بدلالة A (منحنى أسطون) . انطلاقاً من المنحنى نلاحظ بالنسبة لـ :


20 < A < 195 : نلاحظ على المنحنى قيمتين (χ) ، تقارب قيمتها المطلقة . وتضم هذه المنطقة النوى الأكثر استقراراً . **8MeV/nucléon**

A > 20 و **A < 195** : نلاحظ أن (χ) ضعيفة بالنسبة لهذه النوى ، وهذا ما يؤكد أنها غير مستقرة بحيث يمكنها أن تتحول إلى نوى مستقرة عن طريق **الانشطار النووي** بالنسبة للنوى الثقيلة (A > 195) أو عن طريق **الاندماج النووي** بالنسبة للنوى الخفيف (A < 20) .

3- الانشطار والاندماج النوويان : (خاص بـ ع.ف / ع.ر.)

1-1-3- الانشطار النووي :

1-1-3- تعريف :




الانشطار النووي تفاعل نووي تقسم خلاله نواة ثقيلة شطورة (قابلة للانشطار) ، بعد التفافها لنوترون حراري إلى نواتين خفيفتين

مثال :



2-1-3- تفاعل متسلسل :




يمكن للنوترونات الناتجة عن الانشطار النووي أن :
كـ تقلـت من وسـط التـفاعـل .
كـ تـلاقـفـها نـوى غـير شـطـورـة .

كـ تـنـسـبـ في اـنـشـطاـرـ نـوىـ أـخـرىـ ، مـسـاـهـمـةـ فيـ حـدـوثـ تـفـاعـلـ مـتـسـلـسـلـ قدـ يـتـمـ بـكـيـفـيـةـ تـقـيـجـيـةـ ، إـذـاـ كـانـ غـيرـ مـتـحـكـمـ فـيـ ، وـهـذـاـ مـاـ يـحـدـثـ فـيـ الـقـنـبـلـةـ الـنـوـوـيـةـ Aـ .ـ أـمـاـ فـيـ الـمـفـاعـلـاتـ الـنـوـوـيـةـ فـيـتـمـ التـحـكـمـ فـيـ التـفـاعـلـ الـمـتـسـلـسـلـ بـحـيـثـ تـنـتـجـ الـطـاقـةـ بـكـيـفـيـةـ مـنـظـمـةـ (ـعـنـ طـرـيـقـ اـمـتـصـاصـ الـنـوـتـرـوـنـاتـ بـوـاسـطـةـ قـضـبـاـنـ مـنـ الـكـادـمـيـومـ)ـ .

2-3- الاندماج النووي :

1-2-3- تعريف :

الاندماج النووي تفاعل يتم فيه انضمام نواتين خفيفتين لتكوين نواة أكثر ثقلاً



مثال :

تقع تفاعلات الاندماج داخل الشمس حيث يتم خلالها تكون الهيليوم انطلاقاً من الهيدروجين ، وفق ثلاثة مراحل :



2-2-3- شروط تحقيق الاندماج النووي :

لتحقيق الاندماج إلا إذا كان للنواتين الخفيفتين طاقة تمكنها من التغلب على قوى التأثيرات البينية التناافية . ويطلب توفير هذه الطاقة درجة حرارة عالية . ولهذا السبب ينبع الاندماج بالتفاعل النووي الحراري .

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 = -17,585 \text{ MeV} = -17,6 \text{ MeV} \quad \text{إذن}$$

$\xi_1 = -\Delta E = 17,6 \text{ MeV}$ إذن تفاعل الاندماج يحرر طاقة

٤-٣- تطبيقات على التحولات النووية التقائية :

تدل إشارة ΔE على أن المجموعة تكون إما **ناشرة للطاقة** (تحرر الطاقة للوسط الخارجي) : $\Delta E < 0$

، أو **ماصة للطاقة** (تكتسب الطاقة من المحيط الخارجي) : $\Delta E > 0$

بالنسبة للتحولات النووية التلقائية ، تكون ΔE دائمًا سالبة ($0 < \Delta E$) ونرمز لها بالحرف δ ، وتسمى الطاقة المتحركة . وتنظير هذه الطاقة على شكل طاقة حركية تكتسبها على الخصوص الدائمة المتبعة .

٤-٣-١- النشاط الاشعاعي :

$$^{A-4}_{Z-2}X \rightarrow ^{A-4}_{Z-2}Y + ^4_2He$$

معادلة التفتق α هي :

الطاقة المتحررة خلال النشاط الإشعاعي، α هي:

$$E = \Delta m \cdot c^2 = [m(^4_2\text{He}) + m(^{A-4}_{Z-2}Y) - m(^A_ZX)] \cdot c^2$$

مثال: كتل النوى ($^{26}_{88}Ra$) هي: $^{222}_{86}Rn + ^4_2He$

$^{226}_{88}Ra$	$^{222}_{86}Rn$	4_2He
225,9770	221,9702	4,0015

$$E = [m({}^4_2\text{He}) + m({}^{222}_{86}\text{Rn}) - m({}^{226}_{88}\text{Ra})].c^2 = -4,94\text{ MeV}$$

٤-٣-٢- النشاط الاشعاعي β^- :

معادلة التفوت β^- هي: $Z_A X \rightarrow Z_{+1}^A Y + {}_{-1}^0 e^-$

الطاقة المتحررة خلال النشاط الإشعاعي β هي :

$$E = \Delta m \cdot c^2 = [m(-_1^0e) + m(z_{+1}^A Y) - m(z^A X)] \cdot c^2$$

مثال: كتل النوى (u) هي : $^{60}_{27}Co \rightarrow ^{60}_{28}Ni + ^0_{-1}e^-$

$^{60}_{27}Co$	$^{60}_{28}Ni$	$^0_{-1}e$
59,9190	59,915	$5,49 \cdot 10^{-4}$

$$E = [m({}^0_{-1}\text{e}) + m({}^{60}_{28}\text{Ni}) - m({}^{60}_{27}\text{Co})].c^2 = -2,84\text{MeV}$$

٣-٣-٤- النشاط الاشعاعي : β^+

معادلة التفتت $\beta^+ : e^+ \rightarrow e^+ + \gamma$

الطاقة المتجورة خلا، النشاط الاشعاعي β^+ هـ

$$E = \Delta m, c^2 = [m(^0_1e) + m(^A_{z-1}Y) - m(^A_ZX)], c^2$$

مثال : كتل النوى (u) هي : $^{13}_{7}N \rightarrow ^{13}_{6}C + ^{0}_{1}e$


$^{13}_6C$	$^{13}_7N$	0_1e
13,000062	13,001898	$5.49 \cdot 10^{-4}$

$$E \equiv [m(^0_1\text{e}) + m(^{13}_6\text{C}) - m(^{13}_7\text{N})], c^2 \equiv -1.999 \text{ MeV}$$

5- استعمالات وأخطار النشاط الإشعاعي:

١-٥- المفعول البيولوجي للإشعاعات :

عند اختراقها للمادة تحدث الدلائل ، الناتجة عن الأنشطة الإشعاعية وكذلك الإشعاع γ ، تأينا في مسارها ويمكنها بذلك أن تحدث تفاعلات كيميائية في جزيئية المادة الحية . وقد تتسبب في طفرة وراثية إذا ما غيرت بنية جزيئه **ADN** . ويرتبط تأثير الإشعاعات على الأنسجة الحية بـ :



- ٦) عدد الدقائق التي يتلقاها النسيج الحي ، وهذا يتعلّق بنشاط العينة وبعها ومدة التعرّض للإشعاع .
 - ٧) الطاقة التي تودّعها في النسيج .
 - ٨) نوع النشاط الإشعاعي (γ ، β^+ ، β^- ، α) .
 - ٩) طبيعة النسيج الذي أصيب .

5-2- استعمالات النشاط الإشعاعي :

للتوصيات النحوية استعمالات متعددة وفي مجالات مختلفة ، منها :

الصناعة : إنتاج الطاقة الكهربائية ، إنجاز اختبارات الجودة والكشف عن العيوب الصناعية و
إنتاج أشباه الموصلات

الفلحة: مقاومة الآفات و الحشرات ، زيادة مدة تخزين المنتجات الزراعية ، انتقاء نواعيات معينة من البدور ، استنباط أنواع جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية عالية

الطب : معالجة الأورام السرطانية ، تعقيم الأدوات الطبية ، استعمال المواد الاستشفائية للتعرف على بعض الأمراض 

3-5- أخطار النشاط الإشعاعي :

على غرار مصادر الطاقة جميعها ، للطاقة النووية أضرار يمكن إيجازها في :

الإنفجارات النووية ذات القوة التدميرية الكبيرة التي تنتج إشعاعات بكميات كبيرة ، تؤدي إلى وفاة الكائنات الحية أو إصابتها بسرطانات أو حروق و **الحاق أضرار جسيمة** بالبيئة ولمدة طويلة كما حدث عند تفجير أولى القنابل النووية بمهر وشيمبا و ناكازاكي، باليابان سنة 1945.

المفاعلات النووية تتعرض لبعض الأعطال التي تؤدي إلى تسرب الوقود النووي المشع كما حدث في تشنوبيل بأوكرانيا سنة 1986 . وتخليفها لنفايات مشعة تطرح مشكل التخلص منها .