

المعادلة الحصيلة :

تطبيقات

اكتب معادلة تفاعل الأكسدة - اختزال بين أيونات البرمنغات وأيونات الحديد (II) في وسط حمضي.

يحدث التفاعل بين المزدوجات $Fe^{3+}_{(aq)} / Fe^{2+}_{(aq)}$ و $MnO_4^-_{(aq)} / Mn^{2+}_{(aq)}$



2- التحولات السريعة والتحولات البطيئة:

٢- التحولات السريعة :


نشاط 1-1-2:

نصب في كأس 20 mL من محلول كبريتات النحاس II ، ثم نضيف إليه 10 mL من الصودا .

أ- ماذا تلاحظ؟ وما اسم المركب الناتج؟

ترسب جسم صلب لونه أزرق هو هيدروكسيد النحاس II.

بـ- اكتب معادلة التفاعل الحاصل .



جـ- هل يمكن تتبع هذا التفاعل بالعين المجردة ؟ ماذا تستنتج ؟
لا يمكن تتبع هذا التفاعل بالعين المجردة . إذن التفاعل سريع .

تعريف: 2-1-2

التحولات السريعة هي التحولات التي تحدث في وقت وجيز ، بحيث لا يمكننا تتبع تطورها بالعين المجردة أو بأجهزة القياس المعتادة والمتوفرة في المختبر .

أمثلة :


$$Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)}$$


تفاعل ترسيب كلورور الفضة

$$H_3O_{(aq)}^+ + HO_{(aq)}^- \rightarrow H_2O_{(l)}$$

نفاعات حمض - قاعدة

تفاعلات أكسدة – اختزال





2- التحولات البُطئية :

نشاط 1-2-2

نمزج في كأس 50 mL من محلول يودور البوتاسيوم تركيزه $0,20\text{ mol/L}$ و 50 mL من الماء الأوكسيجيني تركيزه $0,01\text{ mol/L}$ ، محمض بحمض الكبريتيك.

أ- ماذا يحدث للخلط خلال الزمن؟
يغير لون الخلط مع مرور الزمن.

بـ- كيف تفسر هذه الملاحظات؟ ماذا تستنتج؟

يظهر ثاني اليود $I_2(aq)$ الذي يلون الخليط تدريجياً باللون الأصفر ثم البن، وبين التطور التدريجي من الخليط أن التحول يطبع

٤- اكتب معادلة تفاعلاً، أكسدة - اختزالاً، الحاصلاً

المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل هما:



2-2-2-تعريف:

التحولات البطيئة هي التحولات التي تستغرق من عدة ثوانٍ إلى عدة ساعات ، بحيث يمكن تتبع تطورها بالعين المجردة أو بأجهزة القياس المتوفرة بالمختر.

أمثلة :

تفاعل أكسدة - اختزال ذاتية لأيونات ثيوکبریتات $S_2O_3^{2-}$ في وسط حمضي.

٦- تكون الصداً (أكسدة الحديد) أو الزنجر (أكسدة النحاس).

تفاعل حمض الكلوريدريک مع الزنك .

3-2- بعض التقنيات الفيزيائية لإبراز التحولات البيئية :

المانومتر : في حالة التحولات التي يرافقها تغير كمية مادة غازية ، نستعمل مانومتر من أجل تتبع ضغط الخليط التفاعلي خلال الزمن . وبالتالي التعرف على طبيعة التحول (سريع أو بطيء).

مقياس المواصلة: في حالة التحولات التي تدخل فيها الأيونات ، نستعمل مقياس المواصلة للاحظة تطور موصلية الخليط الفاعلي خلال الزمن . وبالتالي التعرف على طبيعة التحول (سريع أو بطيء).

pH-متر : في حالة حضور الأيونات $H_3O_{(aq)}^+$ و HO^- في التفاعل ، نستعمل pH-متر للتعرف على تطور pH المحلول أي تركيز $H_3O_{(aq)}^+$. وبالتالي التعرف على طبيعة التحول (سريع أو بطيء).


3- الإبراز التجريبى للعوامل الحركية:

نسمى **عامل حركيا** ، كل مقدار يمكن من تغيير سرعة تطور مجموعة كيميائية .

1-3-تأثير درجة الحرارة :

1-1-نشاط :

نصب في أنبوب اختبار (1) و (2) ، **10,0 mL** من محلول حمض الأوكساليك $H_2C_2O_4_{(aq)}$ تركيزه **0,50 mol/L**. نترك الأنابيب (1) في درجة حرارة **20°C** ، والأنبوب (2) في درجة حرارة **40°C** . نضيف في نفس اللحظة ، إلى الأنابيب **5,0 mL** من محلول برمونفات البوتاسيوم $K^+_{(aq)} + MnO_4^-_{(aq)}$ ، فنلاحظ النتائج التالية :



أ- اكتب معادلة التفاعل الحاصل . نعطي $CO_{2(g)}$ / $H_2C_2O_4_{(aq)}$ و $MnO_4^-_{(aq)}$ / $Mn^{2+}_{(aq)}$



ب- ماذما تلاحظ ؟

نلاحظ اختفاء سريعا للون البنفسجي في الأنابيب ذي درجة الحرارة **40°C** .

ج- ماذما تستنتج ؟

نستنتج أن التفاعل يكون سريعا إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة .

2-2-خلاصة :

بصفة عامة ، تكون سرعة تطور مجموعة كيميائية أكبر ، كلما كانت درجة حرارتها مرتفعة .

2-3-تأثير تراكيز المتفاعلات :


1-2-نشاط :

نصب في الكأس (1) **20 mL** من محلول ثيوکبريتات الصوديوم $Na^+_{(aq)} + S_2O_3^{2-}_{(aq)}$ تركيزه **0,1 mol.L^{-1}** ، ونصب في الكأس (2) **20 mL** من محلول ثيوکبريتات الصوديوم $Na^+_{(aq)} + S_2O_3^{2-}_{(aq)}$ تركيزه **0,05 mol.L^{-1}** .

نضيف في الكأسين ، في نفس اللحظة ، **20 mL** من محلول كلورور الهيدروجين تركيزه **0,1 mol.L^{-1}** .

ز. هشام محجر

سلط حزمة من الضوء الأبيض على محتوى الكأس فنلاحظ النتائج التالية :




أ- ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟

نلاحظ ظهور دقائق صلبة من الكبريت عالقة في المحلول والتي تشتبه الصورة ، وعندما تصبح كمية الكبريت الناتج مهمة، يفقد الخليط شفافيته . كما أن تكون دقائق الكبريت وقد الخليط لشفافيته كانت أسرع في الكأس (1).

إذن ، تكون سرعة التحول أكبر كلما كان التركيز البديئي للمتفاعلات أكبر .

ب- اكتب معادلة التفاعل الحاصل بين المزدوجات : $\text{SO}_{2(aq)} / \text{S}_2\text{O}_{3(2-)(aq)}$ و $\text{S}_{(s)} / \text{S}_2\text{O}_{3(2-)(aq)}$



1-2-3 خلاصة :

بصفة عامة ، يكون تطور مجموعة كيميائية أسرع ، كلما كان التركيز البديئي للمتفاعلات أكبر .

4- تطبيقات العوامل الحركية :

4-1- تسرير تحول كيميائي :

في بعض الحالات ، يكون الكيميائي مضطرا لتسريع التحولات الكيميائية ، فيقوم مثلا برفع درجة الحرارة .
أمثلة: تصنيع الأمونياك - احتراق البنزين - استعمال طنجرة الضغط لطهي المواد الغذائية

4-2- تخفيض سرعة تحول كيميائي أو توقفه :

يمكن التحكم في العوامل الحركية من أجل تخفيض سرعة بعض التحولات الكيميائية التي تكون سريعة جدا أو توقفها.

أمثلة: التحولات المحررة للطاقة - حفظ المواد الغذائية - توقف تحول كيميائي (لحظة إنجاز قياسات تحليل تركيب خليط معين ، الاحتفاظ بالخلايا البيولوجية ...)