

الجزء الثاني : التحولات غير الكلية لمجموعة كيميائية

التحولات الكيميائية التي تحدث في المنجين *Transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens*

دینیلہ العالی
اللہ عالیٰ حلقہ دار حلقہ دار
اللہ عالیٰ حلقہ دار حلقہ دار

- * نسمى حمضا ، حسب برونشت ، كل نوع كيميائي قادر على فقدان بروتون H^+ خلال تحول كيميائي .
 - * نسمى قاعدة ، حسب برونشت ، كل نوع كيميائي قادر على اكتساب بروتون H^+ خلال تحول كيميائي .
 - * المزدوجة قاعدة / حمض هي عبارة عن زوج مكون من حمض و قاعدة متراافقين . وتعرف بنصف المعادلة حمض - قاعدة : $BH^+ \rightleftharpoons B + H^+$ أو $HA \rightleftharpoons A^- + H^+$.
 - * نسمى أمفوليت كل نوع كيميائي يلعب دور حمض في مزدوجة و دور قاعدة في مزدوجة أخرى .
 - * التحول حمض - قاعدة تفاعل يتم خلاله تبادل بروتونات H^+ بين حمض وقاعدة .
 - * محلول المائي خليط سائل متجانس ، ناتج عن إذابة مذاب (نوعي كيميائي أو أكثر) في المذيب (الماء) .
 - * بالنسبة للمحاليل المائية ذات التراكيز الضعيفة : $pH = -\log[H_3O^+]$ و $[H_3O^+] = 10^{-pH}$
 - * قياس pH محلول مائي مفيد جدا ، فهو يمكن من تحديد $[H_3O^+]$ ، وكذلك الحالة النهائية لتفاعل كيميائي .
 - * التحول الكلي: تحول يتوقف تطوره باختفاء كلي لأحد المتفاعلات على الأقل في المجموعة الكيميائية $x_f = x_{max}$
 - * التحول غير الكلي: تحول يتوقف تطوره دون اختفاء كلي لأي متفاعل من المجموعة الكيميائية $x_f < x_{max}$.

* نسبة التقدم النهائي τ لتفاعل كيميائي هي :

- * عند الحالة النهائية لتحول غير كلي ، تتوقف المجموعة الكيميائية عن التطور وتميّز بوجود جميع المتفاعلات والنواتج بنسب ثابتة ، وبعدم تغيير كمية مادتها على المستوى الماكروسโคبي مع مرور الزمن ، تسمى هذه الحالة : **حالة التوازن الديناميكي** .

pH	2	3, 4	5, 7	9, 3	12, 5
$[H_3O^+]$ $(mol \cdot L^{-1})$					-2

تمرين 3

محلول حمض الكلوريديك (H_3O^+, Cl^-) هو $pH = 3$.

- احسب تركيز $[H_3O^+]$ و $[Cl^-]$ في محلول .
 - نخفف محلول عشر مرات بإضافة الكمية اللازمة من الماء الخالص .

- . 1- احسب الترکیز الجدید ل $[H_3O^+]$ و $[Cl^-]$

تمرين 4

نعتبر محلولاً مائياً لحمض الفلوريديك (H_3O^+, F^-) ترکیزه $C = 9,8 \cdot 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$ و حجمه $nH = 2,6$ و $V = 1L$

- أنشئ جدول تقدم التفاعل ثم حدد قيمة x_{max} للتفاعل.
 - حدد قيمة x_f للتفاعل الحاصل في المحلول.
 - استنتج قيمة نسبة التقدم النهائي α للتفاعل.

تمرين ١

تمرين 2 :

أتم ملأ الدول في، الحالتين، التالبتين:

$[H_3O^+]$ (mol.L ⁻¹)	10^{-3}	$5 \cdot 10^{-3}$	$2,5 \cdot 10^{-8}$	$1,8 \cdot 10^{-11}$
pH				

**الجزء الثاني : التحولات
غير الكلية لمجموعة كيميائية
الوحدة 3**


ذ. هشام سعدي

التحولات الكيميائية التي تحدث في المنحنيين

**Transformations chimiques
s'effectuant dans les deux sens**

**دینیل الشیخ الحسینی
دینیل الشیخ الحسینی در حکم داد و ساخت
الثانیة بакالوریا
الکیمیاء-جعیل الشعب
الصفحة : $\frac{2}{2}$**

ـ **pH** جمه $V_T = 2L$. **pH** المحلول هو 2 معادلة الذوبان هي



ـ احسب تركيز $[H_3O^+]$ و $[Cl^-]$ في المحلول S

ـ نسبة التقدم النهائي للتفاعل هي $\tau = 100\%$

ـ انشئ جدول التقدم واحسب قيمة x_f

ـ احسب الحجم V لکلورور الهیدروجين عند $25^\circ C$

ـ نعطي $V_m = 24L \cdot mol^{-1}$ عند $25^\circ C$

تمرين 9 :

ـ نتوفر على محلول مائي لحمض HA تركيزه $C = 10^{-x} mol \cdot L^{-1}$. يعطي قياس **pH** هذا المحلول القيمة $pH = x$

ـ بين أن τ لتفاعل الحمض HA مع الماء هي $\tau = 100\%$

ـ اكتب معادلة التحلل البروتوني للماء

ـ بين بالنسبة لتفاعل محدود (حمض ضعيف) يكون $pH > x$

تمرين 9 :

ـ نريد تحضير محلول مائي S مخفف لحمض الميثانويك $HCOOH$ تركيزه $C = 5 \cdot 10^{-2} mol \cdot L^{-1}$ وذلك بتخفيف محلول تجاري S_0 يحمل الإشارات التالية :

❖ كثافة المحلول : $d = 1,22$

❖ نسبة حمض الميثانويك : $p = 94,3\%$

ـ احسب التركيز C_0 للمحلول التجاري.

ـ حدد الحجم V_0 اللازم تخفيضه لتحضير $1L$ من المحلول المخفف S

ـ علماً أن نسبة التقدم النهائي لتفاعل حمض الميثانويك في المحلول S هي $5,6\%$

ـ احسب **pH** المحلول S

ـ نعطي : $M(C) = 12 g/mol$

ـ و $M(O) = 16 g/mol$

ـ و $M(H) = 1 g/mol$

ـ و الكثافة الحجمية للماء $\rho = 1 kg \cdot L^{-1}$

تمرين 5 :

ـ نتوفر على محلول مائي لحمض النيتري (HNO_2) ، تركيزه $C = 10^{-2} mol \cdot L^{-1}$ و جمه $V = 50mL$ علماً أن النسبة النهائية لتقدم تفاعل هذا الحمض مع الماء هو 22%

ـ اكتب معادلة هذا التفاعل .

ـ احسب x_{max} التقدم الأقصى للتفاعل .

ـ احسب x_f التقدم الأقصى للتفاعل .

ـ استنتج قيمة **pH** المحلول.

تمرين 6 :

ـ باعتبار لتر واحد من الماء الخالص و عند $25^\circ C$ ، تكون قيمة **pH** = 7 .

ـ اكتب معادلة التحلل البروتوني للماء .

ـ احسب كمية المادة البديلة الماء .

ـ انشئ جدول التقدم ثم استنتاج قيمة x_{max} و x_f .

ـ احسب نسبة التقدم النهائي للتفاعل . ماما تستنتاج ؟

ـ نعطي : $M(H_2O) = 18 g \cdot mol^{-1}$
والكتلة الحجمية الماء $= 1kg \cdot L^{-1}$

تمرين 7 :

ـ نذيب قرصاً من الأسبرين (لتبييض) نرمز له بـ HA) كتلته $m = 500mg$ في حجم $V = 100mL$ من الماء الخالص . قياس **pH** المحلول الحصول عليه أعطى $pH = 2,6$

ـ اكتب معادلة التفاعل حمض – قاعدة بين الأسبرين والماء .

ـ حدد التركيز النهائي لـ H_3O^+ في المحلول.

ـ حدد كمية المادة البديلة للأسبرين في القرص .

ـ نعطي الكتلة المولية للأسبرين $M = 180g \cdot mol^{-1}$

ـ انشئ الجدول الوصفي لتقدير التفاعل .

ـ حدد التقدم النهائي للتفاعل .

ـ حدد التركيز المولي للأسبرين عند نهاية التفاعل .

تمرين 8 :

ـ نذيب حجماً V من غاز الكلورور الهيدروجين HCl في الماء للحصول على محلول مائي S لحمض الكلوريديك