



## قوانين نيوتن les lois de Newton



نيل المنضدة بزاوية  $10^\circ$  بالنسبة للمستوى الأفقي, نحر الحامل الذاتي بدون سرعة بدئية فتحصل على التسجيل (أ).

نضبط المنضدة في وضع أفقي, نربط الحامل الذاتي بخيط ونجره بطريقة عشوائية فتحصل على التسجيل (ب).



1. أحسب سرعة الحامل الذاتي عند النقطتين  $G_2$  و  $G_4$
  2. مثل متجهة السرعة  $\vec{V}_2$  في الموضعين  $G_2$  و  $G_4$  باعتبار السلم  $1\text{cm} \rightarrow 0,5 \text{ m.s}^{-1}$
  3. أنشئ عند النقطة  $G_3$  المتجهة  $\Delta\vec{V} = \vec{V}_4 - \vec{V}_2$
  4. قس طول المتجهة  $\Delta\vec{V}_3$  واستنتج ملتمتها  $\|\Delta\vec{V}_3\|$
  5. استنتاج متجهة التسارع  $\vec{a}_3$  عند الموضع  $G_3$
  6. مثل متجهة التسارع  $\vec{a}_3$  في الموضع  $G_3$  باعتبار السلم  $1\text{cm} \rightarrow 1\text{m.s}^{-2}$

تمرين تطبيقي: <

احداثيات متوجهة الموضع  $\vec{O}$  خلال حركة جسم صلب في م م  $R(O; \vec{t}; \vec{j}; \vec{k})$  هي  $z(t)=10 ; y(t)=5t^2 ; x(t)=2t$  هي  $R(O; \vec{t}; \vec{j}; \vec{k})$  هي  $t = 10s$ .  
1. أكتب متغير متوجهة الموضع في المعلم ثم احسب منظتها عند اللحظة


١١. اكتب تعريف مجسم الموضع في المعلم ثم احسب مساحته عند اللحظة  $t=10s$

١٢. حدد إحداثيات مجسمة السرعة  $\vec{v}_G$ ، واحسب  $v_G$  في اللحظة  $t=10s$ .

١٣. اوجد إحداثيات مجسمة التسارع  $\vec{a}_G$  في نفس المعلم وأحسب قيمة  $a_G$ .

١٤. حدد طبيعة الحركة : تتم وفق مسقتم او مستوى او فضاء

نضبط المنضدة أفقياً ونطبق على حامل ذاتي كتلته  $m=450\text{g}$  قوة أفقية ثابتة شدتها  $F=0.27\text{N}$  فنحصل على التسجيل (أ).



استثمار :

- أثبت أن:  $(\sum \bar{F}_{ext})$  مجموع القوى الخارجية المطبقة على الحامل الذاتي تكافى القوة  $\bar{F}$ . 1.

بالنسبة للتسجيل (أ) مثل منحنى تغيرات  $\Delta V_G = V_{G1} - V_{G2}$  بدلالة  $\Delta t = t_1 - t_2$  حيث: 2.


$\sum \bar{F}_{ext} = m \frac{\Delta \bar{V}_G}{\Delta t}$  قارن بين المعامل الموجه للمنحنى مع المقدار  $m$ , ثم تحقق من العلاقة: 3.

أجب على السؤالين (2) و(3) في حالة التسجيل (ب) مع تعويض المقدار  $m$  بالمدار  $\frac{F}{m}$ . 4.

ما تأثير الكتلة على المفعول التحربي ل:  $\sum \bar{F}_{ext}$ . 5.

## ◀ نشاط تجربی 4 : دراسة حركة مستقيمة علمي مستوى مائل بدون احتكاك:

نرسل جسمًا صلباً (S) ذات كتلة  $m$  ومركز قصوره  $G$  بسرعة  $\vec{v}_0$  بزاوية  $\alpha$  نحو الجزء الأعلى لمستوى مائل بزاوية  $\beta$  بالنسبة للخط الأفقي. يتحرك الجسم (S) بدون احتكاك فوق المستوي المائل حسب خطه الأكبر ميلاً الذي يجسده المحور  $(0, \vec{t})$  لعلم متعدد منظم  $R(0, \vec{t}, \vec{j}, \vec{k})$ . في اللحظة  $t_0 = 0$ ، يوجد  $G$  في الأصل  $O$  للمحور  $(0, \vec{t})$  بحيث  $\vec{v}_0 = v_0 \vec{t}$ .



١. حدد المجموعة المدروسة ثم اجرد القوى المطبقة عليها ومثل هذه القوى في التبیانة دون اعتبار السلم

٢. اوجد احداثیة  $\vec{a}_G$  متجهی التسارع لنقطة G على المحور  $(0, \vec{i})$

٣. ما طبیعة حرکة النقطة G ؟

٤. اعط المعادلة التفاضلیة التي تتحققها احداثیة  $\vec{v}$  لمتجهی السرعة  $\vec{v}_G$


٥. عبر عن  $\vec{v}$  و  $\vec{x}$  بدلالة  $t$  ،  $x$  هو أقصول G في المعلم  $(R(0, \vec{i}, \vec{k}))$

٦. احسب قيمة  $v_0$  التي تمكن من بلوغ G موضعا بیعد عن O بمسافة 80 cm

المعطیات :

الزاویة  $\alpha = 10,0^\circ$  ، شدة مجال الثقالة  $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$  ، الاحداثیات مھمہة

نضع حسماً صلباً (S) ككتلة  $m=80\text{Kg}$  على مستوى مائل بالزاوية  $\alpha=12,0^\circ$  بالنسبة لخط الأفق. نطبق بواسطة حبل ، على (S) قوة ثابتة  $\vec{F}$  وفق الخط الأكبر ميلاً للمستوى الأفقي ، فيلتزلق (S) على المستوى حيث تتسارع مركز قصورة ثابت قيمته  $a=2,00\text{ m.s}^{-1}$ . نعتبر خلال هذه الحركة أن شدة المركبة المماسية  $R$  للقوة التي يطبقها المستوى المائل على الجسم (S) وشدة مركبتها المنظرية  $R_z$ . نطبق بينهما العلاقة  $R_z = 0,25 R$ .



3. أكتب بدلالة الزمن  $t$  ، المعادلة الزمنية  $x(t)$  لحركة  $G$  باعتبار النقطة  $O$  موضع  $G$  في اللحظة  $t_0$  وسرعته  $v_0$  معدمة