

## تمرين في الأقمار الصناعية

قرر مركز الأبحاث الفضائية إرسال بعثة من أجل دراسة بيئية للغلاف الجوي للأرض .  
دراسة بعض مراحل الرحلة .

### الجزء الأول : مرحلة الانطلاق

عند تشغيل المحرك يكون الانطلاق رأسيا ونقبل ان اندفاع الغازات المحترقة يكافئ قوة خارجية شدتها  $N = 32,4 \cdot 10^4$  نسمى قوة الدفع . نهمل الاحتكاك ونعتبر شدة مجال الثقالة ثابتة عند سطح الأرض قيمتها  $g_0 = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$  و كتلة المركبة عند الانطلاق  $M = 2041 \cdot 10^3 \text{ kg}$  .

1-أجرد القوى المطبقة على المركبة الفضائية عند لحظة الانطلاق .

2-أحسب تسارع المركبة  $a_0$  عند لحظة الانطلاق .

3-أحسب السرعة و الارتفاع التي تصل إليها المركبة عند التاريخ  $t = 2,5 \text{ mn}$  إذا افترضنا ان التسارع ثابت .

4-في الحقيقة سرعة المركبة أكبر من السرعة التي تم حسابها سابقا . اعط تفسيرا لذلك .

### الجزء الثاني : الحركة الدائرية حول الأرض

بعد  $10 \text{ mn}$  من الانطلاق ، تدخل المركبة إلى مدارها الدائري حول الأرض على ارتفاع  $z = 300 \text{ km}$  وتكون كتلتها  $m = 69,68 \cdot 10^3 \text{ kg}$  . نعتبر المركبة نقطة مادية والأرض كروية الشكل شعاعها  $R_T = 6400 \text{ km}$  .

1-مثل على الشكل 1 مجاهدة القوة  $\vec{F}$  المطبقة على المركبة .

2-بتطبيق القانون الثاني لنيوتون أوجد تعبير تسارع المركبة بدلالة  $M_T$  ،  $R_T$  ،  $z$  كتلة الأرض و  $G$  ثابتة التجاذب الكوني .

3-أعط تعبير سرعة المركبة بدلالة  $M_T$  ،  $R_T$  و  $G$  .

4-تحقق من القانون الثالث لكيلر .

5-علمما ان سرعة المركبة هي  $V = 7,74 \text{ km.s}^{-1}$  ، أحسب كتلة الأرض  $M_T$  .

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

### الجزء الثالث : مرحلة النزول

1-فتح المظلة

خلال مرحلة النزول تكون حركة المركبة رأسية . عند الارتفاع  $z_1$  تفتح المظلة المرتبطة بالمركبة فتخضع المجموعة إلى قوة احتكاك منحاها معاكس لمنحي السرعة و التي ننمذج شدتها ب  $f = kV_z^2$  حيث  $V_z$  سرعة المركبة على المحور  $Oz$  و  $k$  ثابتة .


نهمل دافعه ارميدين ونختار المحور  $Oz$  موجه نحو الأعلى أصله  $O$  عند سطح الأرض .

1.1-أكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها السرعة  $V_z$  .


2.1-تصل سرعة المركبة إلى قمة حدية  $V_{lim} = 10 \text{ m.s}^{-1}$  . حدد وحدة الثابتة  $k$  ثم أحسب قيمتها .  
نعتبر كتلة المركبة ثابتة وتساوي  $m$  .

### 2-انفلات جسم من المركبة

عندما تصل المركبة إلى النقطة  $M_0$  ذات الإحداثيين  $(x_0 = 0, z_0 = h = 3 \text{ km})$  في معلم  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}, O)$  نعتبره غاليليا بسرعة  $V_0 = V_{lim} = 10 \text{ m.s}^{-1}$  في لحظة نعتبرها أصلا للتاريخ ، ينفلت جسم  $(S)$  من المركبة بسرعة  $V$  تكون زاوية  $\alpha = 11^\circ$  مع الخط الراسي (أنظر الشكل 2) .



- 1.2-أكتب المعادلتين الزمئيتين لحركة الجسم ( $S$ ) في المعلم  $(\vec{r}, \vec{t})$  .  
 2.2-أكتب المعادلة الزمنية لحركة المركبة .  
 3.2-حدد أيهما يصل الأول إلى سطح الأرض المركبة أم الجسم ( $S$ ) .  
 4.2-حدد المدة الزمنية الفاصلة بين وصول كل منهم إلى سطح الأرض .



### التصحيح :

الجزء الأول : مرحلة الانطلاق

1-جرد القوى المطبقة على المركبة الفضائية عند لحظة الانطلاق

تخضع المركبة إلى :

قوة الدفع :  $\vec{F}$

وزنها :  $\vec{P}$

2-حساب تسارع المركبة  $a_0$  عند لحظة الانطلاق

حسب بالقانون الثاني لنيوتن :  $\vec{F} + \vec{P} = m \cdot \vec{a}$

نسقط العلاقة على المحور  $Oz$  الموجه نحو الاعلى :

$$F - P = ma_0 \Rightarrow a_0 = \frac{F}{m} - \frac{P}{m} = \frac{32,4 \cdot 10^3}{2041 \cdot 10^3} - 9,81 = 6,06 \text{ m.s}^{-2}$$

3-حساب السرعة و الارتفاع التي تصل إليها المركبة عند التاريخ

$$a_0 = \frac{dV}{dt} \Rightarrow V = a_0 \cdot t + V_0$$

لدينا عند  $t = 0$  سرعة المركبة منعدمة  $V_0 = 0$  ومنه  $V = a_0 \cdot t$  :  $V = 6,06 \times 2,5 \times 60 = 909 \text{ m.s}^{-1}$

المعادلة الزمنية تكتب :  $z = \frac{1}{2} a_0 \cdot t^2 + z_0$  لدينا عند  $t = 0$  انسوب المركبة منعدم  $z_0 = 0$  ومنه :

$$z = \frac{1}{2} \times 6,06 \times 2,5 \times 60 = 454,5 \text{ m} \Leftarrow z = \frac{1}{2} a_0 \cdot t^2$$

4-لماذا سرعة المركبة أكبر من التي تم حسابها ؟

تعتبر شدة الثقالة عند الارتفاع  $z$  هو :  $g = g_0 \cdot \frac{R_T^2}{(R_T+z)^2}$  إذن كلما تزايد الارتفاع  $z$  تناقصت قيمة  $g$  وبالتالي قيمة التسارع  $a$  تتزايد حسب العلاقة :  $a = \frac{F}{m} = g - \frac{v^2}{R}$  وبالتالي سرعة المركبة أكبر من القيمة التي تم حسابها .

الجزء الثاني : الحركة الدائرية حول الأرض

1-تمثيل ، على الشكل 1 ،  $\vec{F}$  متجهة القوة المطبقة على المركبة من طرف الأرض

2-تعبير  $a$  تسارع المركبة

تحضع المركبة إلى قوة التجاذب الكوني التي تطبقها الأرض تعبيتها :

$$\vec{F} = G \frac{m \cdot M_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{n}$$

القانون الثاني لنيوتن يكتب :  $m \cdot \vec{a} = G \frac{m \cdot M_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{n}$  أي :  $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$

$$a = G \frac{M_T}{(R_T + h)^2} \quad (1)$$

تعبير التسارع هو :

في معلم فريني متجهة التسارع تكتب :

$$a = a_N = \frac{v^2}{R_T + z} \quad (2) \quad \text{و } a_T = 0$$

من العلاقات (1) و (2) نكتب :  $\frac{v^2}{R_T + z} = G \frac{M_T}{(R_T + h)^2}$  وبالتالي :

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R_T + z}} \quad (3)$$

4-التحقق من القانون الثالث لكبلير

نعلم أن  $\omega \cdot \omega \cdot r^3 = V^2 \cdot r$  حسب العلاقة (3) أي :  $V = (R_T + h) \cdot \frac{2\pi}{T}$

$$\sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R_T + z}} = (R_T + h) \cdot \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \frac{G \cdot M_T}{R_T + z} = \frac{4\pi^2 \cdot (R_T + z)^2}{T^2}$$

$$\frac{T^2}{(R_T + z)^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M_T} = C^{te}$$

5-حساب  $M_T$  كتلة الأرض


العلاقة (3) تكتب :  $M_T = \frac{V^2 \cdot (R_T + z)}{G}$  أي :  $G \cdot M_T = V^2 \cdot (R_T + z)$  إذن :  $V^2 = \frac{G \cdot M_T}{R_T + z}$

$$M_T = \frac{(7,74 \times 10^3)^2 \times (6400 \times 10^3 + 300 \times 10^3)}{6,67 \times 10^{-11}} \approx 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

ت.ع :

الجزء الثالث : مرحلة النزول

## 1-مرحلة فتح المظلة



1.1- كتابة المعادلة التفاضلية التي تتحققها السرعة  $V_z$

تخصيص المظلة لقوة الاحتكاك  $f$  والوزن  $P$ .

تطبيق القانون الثاني لنيوتن :  $\vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}$

$$kV_z^2 - m \cdot g = m \cdot \frac{dV_z}{dt} \quad \text{أي: } f - P = m \cdot a \quad \text{الإسقاط على المحور } Oz$$

$$\frac{dV_z}{dt} = \frac{k}{m} \cdot V_z^2 - g$$

## 2.1- وحدة قيمة الثابتة $k$

$$[k] = \frac{kg \times m \times s^{-2}}{m^2 \times s^{-2}} = kg \cdot m^{-1}$$

في النظام الدائم يكون  $\frac{dV_z}{dt} = 0$  إذن :  $V_z = V_{lim} = C^{te}$  المعادلة التفاضلية تكتب :

$$k = \frac{69,68 \times 10^3 \times 9,81}{100} = 6835,6 \approx 6,8 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \quad \text{ت.ع: } k = \frac{m \cdot g}{V_{lim}^2} \quad \text{أي: } \frac{k}{m} \cdot V_{lim}^2 - g = 0$$

## 2-مرحلة انفلاتات جسم من المركبة

### 1.2- المعادلية الزمنيتين لحركة الجسم ( $S$ )

نطبق القانون الثاني على الثاني لنيوتن على الجسم ( $S$ ) في المعلم  $(\vec{r}, \vec{t}, \vec{J})$  :

$$\vec{a}_G = \vec{g} \quad m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}_G \quad \text{أي: } \vec{P} = m \cdot \vec{a}_G$$

$$\begin{cases} V_{0x} = V_0 \cdot \sin \alpha \\ V_{0z} = -V_0 \cdot \cos \alpha \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} x_0 = 0 \\ z_0 = h \end{cases} \quad \text{حسب الشروط البدئية أي عند لحظة الانفلات :}$$

الإسقاط على  $x$  :  $a_x = 0$  :  $Ox$   $x(t) = V_0 \cdot \sin \alpha \cdot t + x_0$  ومنه :  $V_x = V_{0x} = V_0 \cdot \sin \alpha$   $\text{أي: } a_x = 0$

$$x(t) = 7,74 \cdot 10^3 \sin(11^\circ) \cdot t = 1,48 \cdot 10^3 \text{ m} \quad \text{ت.ع: } x(t) = V_0 \cdot \sin \alpha \cdot t$$

الإسقاط على  $z$  :  $a_z = -g$  :  $Oz$   $V_z = -g \cdot t + V_{0z} = -g \cdot t - V_0 \cdot \cos \alpha$   $\text{أي: } a_z = -g$

$$z(t) = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 - V_0 \cdot \cos \alpha \cdot t + z_0 \quad \text{أي: } z(t) = -\frac{1}{2} g \cdot t^2 - V_0 \cdot \cos \alpha \cdot t + z_0 \quad \text{ومنه: } z(t) = -4,9t^2 - 7,74 \cdot 10^3 \times \cos(11^\circ) \cdot t + 300 \times 10^3$$

$$z(t) = -4,9t^2 - 7,6 \cdot 10^3 \cdot t + 3 \cdot 10^5 \quad \text{أي: } z(t) = -4,9t^2 - 7,74 \cdot 10^3 \times \cos(11^\circ) \cdot t + 300 \times 10^3 \quad \text{ت.ع:}$$

### 2.2-المعادلة الزمنية لحركة المركبة

بما أن سرعة المركبة ثابتة ، فإن حركتها مستقيمية منتظمة وتقع على المحور  $Oz$  أي:  $V_x = 0$  و  $x = 0$

$$V_{0z} = -V_{lim} \quad z_0 = h \quad \text{حسب الشروط البدئية:}$$

$$z = -10 \cdot t + 3 \cdot 10^5 \quad \text{ت.ع: } z = -V_{lim} \cdot t + h \quad \text{المعادلة الزمنية تكتب:}$$

3.2-لتكن  $t_1$  تاريخ وصول الجسم ( $S$ ) إلى سطح الأرض

$$-\frac{1}{2}g \cdot t^2 - V_0 \cdot \cos\alpha \cdot t + h = 0 \quad \text{عند سطح الأرض يكون } z = 0 \text{ ومنه:}$$

$$t_1 = \frac{-7,6 \cdot 10^3 + \sqrt{(7,6 \cdot 10^3)^2 - 4 \times 4,9 \times (-3 \cdot 10^5)}}{2 \times 4,9} = 1590 \text{ s} \quad \text{نجد: } 4,9 \cdot t^2 + 7,6 \cdot 10^3 \cdot t - 3 \cdot 10^5 = 0$$

لتكن  $t_2$  تاريخ وصول المركبة إلى سطح الأرض:

$$t_2 = \frac{3 \cdot 10^5}{10} = 3 \cdot 10^4 \text{ s} \quad \text{وبالتالي: } -10 \cdot t_2 + 3 \cdot 10^5 = 0 \quad \text{عند سطح الأرض يكون } z = 0 \text{ ومنه:}$$

الجسم ( $S$ ) يصل قبل المركبة إلى سطح الأرض.

4.2-حساب  $\Delta t = t_2 - t_1$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 3 \cdot 10^4 - 1590 = 28410 \text{ s} \Rightarrow \Delta t \approx 7,9 \text{ h}$$