

المادة: علوم الحياة والأرض مسلك: علوم فيزيائية / علوم الحياة والأرض مدة الإنجاز: 2 ساعات المعامل: 5	الأسدوس الأول الفرض المحروس الثاني 2015/12/14	
الاسم الكامل: القسم: الفوج:		
الموضوع الأول (6 ن)		
1- عين الاقتراح الصحيح من بين الاقتراحات التالية (2 ن) - تعتبر الطفرة تغيرا وراثيا للخلية الطافرة ناتجا عن تواجد ستربتومسين في الوسط. ☐ تغيرا وراثيا ناتجا عن تسرب علة محولة إلى الخلية الطافرة. ☐ تغيرا في الخبر الوراثي نتيجة استبدال حمض أميني بآخر على مستوى ADN. ☐ تغيرا فجانيا في بروتين ناتج عن الترجمة. ☐ - خلال النسخ الجزيئي تتشكل ADN بنت خلال المرحلة التمهيديّة ☐ خلال المرحلة الانفصالية ☐ عند الخلية الأم ☐ عند الخلية البنت ☐ - الترجمة تحدث في النواة ☐ تسمح بتشكيل ARN انطلاقا من احد لولبي ADN ☐ تسمح بتشكيل بروتين ☐ تحدث في الميتوبلازم انطلاقا من ADN ☐ - العاتية هي عبارة عن بكتيريا محاطة بمحفظة ☐ بكتيريا غير محاطة بمحفظة ☐ حمة تتطفل على البكتيريا ☐ بكتيريا تتطفل عليها حمة ☐ 2 - عرف ما يلي (2 ن) مورثة - نوكلويد 3 - اعد كتابة الجملة أو الجمل الصحيحة و صحح الخاطئة (2 ن) يسمح ARN بوليمراز بدمج نيكلويدات ADN حسب تكامل القواعد الأزوتية. تتم ترجمة ARN_m من طرف عدة ARN بوليمراز في نفس الوقت. لولبا ADN متوازيان ولهما اتجاهان متعاكسان. يتم تركيب البروتين في الميتوبلازم خلال مرحلة النسخ.		
1		


الموضوع الثاني (8 ن)

قصد إبراز كيفية نقل الخبر الوراثي عن طريق الانقسام غير المباشر نقترح المعطيات التالية :

- تم زرع خلايا جسدية حيوانية $2n = 4$ في أوساط زرع ملانمة يؤدي تكاثرها إلى تشكل بساط خلوي.

يمثل الجدول أسفله تطور عدد الخلايا حسب الزمن في كل 1cm^2 من البساط الخلوي و تمثل الوثيقة 1 رسوما تخطيطية أنجزت انطلاقا من ملاحظات مجهرية على مستوى البساط الخلوي.

الزمن بالساعات (h)	بداية التجربة (T_0)	$T_0 + 30h$
عدد الخلايا في كل cm^2 من البساط	$12,5 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$





1- تعرف مرحلة الانقسام الخلوي التي يمثلها كل شكل من أشكال الوثيقة 1. مغللا اجابتك (1 ن)

ب- أنجز رسما تفسيريا لمرحلة الانقسام الخلوي غير المباشر الموالي للشكل 2. (1 ن)

2- استخرج من الجدول أعلاه مدة الدورة الخلوية. علل اجابتك. (1 ن)

تم تتبع تطور كمية ADN في نواة خلية نباتية حسب الزمن الوثيقة 2 كما تمت الملاحظة المجهرية للخبيطات النووية خلال بعض فترات الدورة الخلوية (الوثيقة 3)



3- صف تطور كمية ADN خلال دورة خلوية (الوثيقة 2) و بين العلاقة بين هذا التطور و تغير مظهر الخبيطات النووية (الوثيقة 3) (2 ن).

- لتوضيح ما يحدث على المستوى الجزيئي للصبغيات ننجز عند دبابه الخل التجربة الممثلة في الوثيقة 4.

الوثيقة 4

مشع : 
غير مشع : 

المرحلة الأولى	المرحلة الثانية
بيضات ذبابة الخل في وسط زرع ملاتم يحتوي على السيتوزين (Cytosine) المشع خلال مدة دورة خلوية.	استخراج جزء من البيضات وغسلها ثم وضعها في وسط غير مشع، وتتبع نسبة الاشعاع على مستوى الصبغيات.
 صبغيات مشعة 100 %	 صبغيات مشعة 50 %
مظهر الصبغيات بعد المعالجة بالكولشيسين قطعة من جزيئة ADN <pre> A C T G G T G A C C </pre>	

4- معتمدا على الرسم التخطيطي لقطعة جزيئة ADN الممثل في الوثيقة 4.

أ. فسر النتائج المحصل عليها في المرحلة الاولى. (1 ن)

ب. فسر النتائج المحصل عليها في المرحلة الثانية. (1 ن)

5- معتمدا على ما سبق فسر كيف يسمح تعاقب اطوار الدورة الخلوية من الحفاظ على ثبات الخبر الوراثية.

الموضوع الثالث (6 ن)

في بعض الحالات تنتج خلايا الكبد بروتينا في شكل أنزيم يدعى Antitrypsine يرمز له ب at. يحمي هذا الانزيم خلايا الجسم من تأثير بعض الأنزيمات المفرزة و الموجهة ضد بعض الجراثيم عند دخوله الجسم.

تتميز المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين at بوجود عدة حنيلات يتحكم كل واحد منهم في تركيب شكل معين لهذا الانزيم.

تعطي الوثيقة 1 متاليتين لبعض الأحماض الأمينية بالنسبة لشكلين من أشكال الانزيم at الشكل M وهو شكل فعال والشكل Z وهو شكل غير فعال ناتج عن حدوث طفرة في المورثة المعنية.

الوثيقة 1

الرقم الترتيبي للحمض الأميني داخل السلسلة البروتينية	340	341	342	343	344	345
الشكل M	ازولوسين	حمض الأسبرتيك	حمض كلوتاميك	ليزين	كليسسين	تريونين
الشكل Z	ازولوسين	حمض الأسبرتيك	فالين	ليزين	كليسسين	تريونين

- 1- قارن متتاليتي الأحماض الأمينية بين الشكلين M و Z . (0.5 ن)
- 2- اعط متتالية القواعد الأزوتية المكونة لشريط ال ADN الذي يحدد متتالية الأحماض الأمينية في كل من الشكل M والشكل Z مستعملا جدول الوثيقة 2. (1.5 ن)

الوحدات الرمزية	الأحماض الأمينية
ACU	تريونين
GGU	كليسرين
AAG	ليزين
GAG	حمض كلوتاميك
GAU	حمض الأسبرتيك
AUU	إزولوسين
GUG	فالين

الوثيقة 2

- 3- استنتج فيما تتجلى الطفرة التي أعطت التحليل المسؤول عن تركيب الشكل Z . (1ن)
- ان إفراز الانزيم at في الدم من طرف خلايا الكبد يتطلب توفر هذا الانزيم على تفرعات سكرية مثبتة على حمض كلوتاميك .
- 4- اعتمادا على هذا المعطى و على بنية الشكل Z فسر عدم فعالية هذا الشكل من الانزيم at . (1.5 ن)
- 5- استنتج مما سبق العلاقة التالية : مورثة-بروتين- صفة. (1.5 ن)