

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

حلول تمارين استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة

حل التمرين 1 :

1) سجل من خلال الوثيقة 1 أن:

- ✓ الألياف عضلات عدائي المسافات الطويلة (الألياف A)، غنية بالشعيارات الدموية والميتوكوندريات وتحتوي على تركيز قوي من أنزيم MDH.
- ✓ الألياف عضلات عدائي المسافات القصيرة (الألياف B)، تفتقر للشعيارات الدموية والميتوكوندريات وتحتوي على تركيز قوي من أنزيم LDH.

سجل من خلال الوثيقة 2 أن:

- ✓ دور أنزيم MDH، يتمثل في تحفيز تفاعلات هدم حمض البيروفيك الذي يعطي CO_2 و RH_2 ، وبالتالي فإن أنزيم MDH يعمل على مستوى ماتريس الميتوكوندري.
- ✓ دور أنزيم LDH، يتمثل في تحفيز تفاعل تحول حمض البيروفيك إلى حمض لبني، وبالتالي فإن أنزيم LDH يعمل على مستوى الجبلة الشفافة.

2) الألياف المهيمنة عند عدائي المسافات الطويلة غنية بالميتوكوندريات وبأنزيم MDH، وبالتالي فإن طبيعة التفاعلات المنتجة للطاقة عند عدائي هذه المسافات هي تفاعلات حي هوائية: أكسدة تنفسية.

- الألياف المهيمنة عند عدائي المسافات القصيرة تفتقر للميتوكوندريات وغنية بأنزيم LDH، وبالتالي فإن طبيعة التفاعلات المنتجة للطاقة عند عدائي هذه المسافات هي تفاعلات حي لاهوائية: تخمر لبني.

3) عند عدائي المسافات القصيرة، تهيمن التفاعلات اللاهوائية (التخمر اللبني) من أجل تجديد جزيئات L'ATP وهو ما ينتج عنه تراكم الحمض اللبني الذي يسبب انخفاض PH العضلة وبالتالي انخفاض فعالية الأنزيمات وانخفاض الإستقلاب العضلي مما يؤدي إلى التعب العضلي.

4) يؤدي استعمال مادة EPO إلى الزيادة في عدد الكريات الحمراء وبالتالي نقل كميات مهمة من الأكسجين إلى الألياف العضلية وبالتالي إلى الميتوكوندري (الغشاء الداخلي) حيث يستعمل في تفاعلات السلسلة التنفسية ، مما يرفع من كميات L'ATP المركبة والتي تزيد من تحسين الأداء الرياضي للعداء.

حل التمرين 2 :

1) ★ تحليل الشكل "أ" من الوثيقة 1:

- تؤدي إهاجة واحدة فعالة إلى حدوث رعشة منفردة بمرارتها الثلاث: مرحلة الكمون، مرحلة التقلص ومرحلة الارتقاء، للإشارة فوسيع هذه الرعشة يقدر ب 40 وحدة اصطلاحية (UA).

★ تحليل الشكل "ج" من الوثيقة 1:

يؤدي تطبيق عدة إهاجات متقاربة على أساس أن تطبق كل إهاجة خلال مرحلة تقلص الرعشة السابقة إلى ارتفاع وسع التقلص (فعل الإجمال) معبقاء العضلة متقلصة (منبسط مستقيم) ، وفي هذه الحالة تصاب العضلة بكراز تام. للإشارة تبقى هذه الألياف متقلصة طالما وجدت الإهاجات، عند توقف التبييه، ترتخي هذه الألياف

(2) ★ مميزات الألياف العضلية A:

- تقلص بوسع ضعيف (40UA).
- بطيئة التقلص (مدة الرعشة العضلية طويلة (S 11/100) ومدة الكمون طويلة).
- لا تتعبر خلال مدة التجربة (تبقي متقلصة طيلة وقت إحداث الإهاجات).

★ مميزات الألياف العضلية B:

- تقلص بوسع أكبر (60UA).
- سريعة التقلص (مدة الرعشة العضلية قصيرة (S 7/100) ومدة الكمون وجيدة)
- تتعبر بسرعة (ارتخت خلال مدة التجربة ولو مع استمرار تطبيق الإهاجات)

(3) ★ خصائص الألياف العضلية A: غنية بالشعيرات الدموية وكذا الميتوكوندريات، وتنبت كمية مهمة من الأوكسجين على الخضاب العضلي لكنها تفتقر إلى الكليكوجين وإلى أنزيم ATP_{ase} كما أن قطرها ضعيف.

★ خصائص الألياف العضلية B: تفتقر للشعيرات الدموية والميتوكوندريات، وتنبت كمية ضعيفة من الأوكسجين على الخضاب العضلي لكنها غنية بمخزون الكليكوجين وبأنزيم ATP_{ase} وتتميز بقطر كبير.

(4) ★ تستمد الألياف A الطاقة الضرورية لنشاطها من التنفس: تفاعلات حي هوائية
★ ترتكز الألياف B على ظاهرة التخمر (تفاعلات حي لاهوائية) لإمدادها بالطاقة.

(5) تفسير اختلاف كيفية تقلص الألياف A و B:

★ نفس ضعف وسع الألياف A بضعف قطرها وباستعمالها البطيء لجزئيات L'ATP: حيث تتوفر على كمية قليلة من أنزيم ATP_{ase} المحفزة لحتمة L'ATP.

★ نفس ارتفاع وسع الألياف B بكبر قطرها وباستعمالها السريع لجزئيات L'ATP: حيث تتوفر على كمية كبيرة من أنزيم ATP_{ase} المحفزة لحتمة L'ATP.

★ يتم تجديد L'ATP عند الألياف A عن طريق التفاعلات الهوائية (التنفس)، يترتب عنها إنتاج كمية كبيرة من الطاقة الشيء الذي يسمح بتقلصها لمدة أطول دون حدوث التعب.

★ يتم تجديد L'ATP عند الألياف B عن طريق التفاعلات اللاهوائية (التخمر)، يترتب عنها إنتاج كمية قليلة من الطاقة مع تراكم الحمض اللبني الذي يؤدي إلى تعبها السريع.

حل التمارين 3 :

(1) سجل من خلال الوثيقة 1 أن:

✓ ألياف عضلات عدائي المسافات الطويلة (الألياف A)، غنية بالشعيرات الدموية والميتوكوندريات وتحتوي على تركيز قوي من أنزيم MDH.

✓ ألياف عضلات عدائي المسافات القصيرة (الألياف B)، تفتقر للشعيرات الدموية والميتوكوندريات وتحتوي على تركيز قوي من أنزيم LDH.

سجل من خلال الوثيقة 2 أن:

✓ دور أنزيم MDH، يتمثل في تحفيز تفاعلات هدم حمض البوروبيك الذي يعطي CO₂ و RH₂، وبالتالي فإن أنزيم MDH يعمل على مستوى ماتريس الميتوكوندري.

✓ دور أنزيم LDH، يتمثل في تحفيز تفاعل تحول حمض البوروبيك إلى حمض لبني، وبالتالي فإن أنزيم LDH يعمل على مستوى الجبلة الشفافة.

(2) - الألياف المهيمنة عند عدائي المسافات الطويلة غنية بالميتوكوندريات وأنزيم MDH، وبالتالي فإن طبيعة التفاعلات المنتجة للطاقة عند عدائي هذه المسافات هي تفاعلات حي هوائية: أكسدة تنفسية.

- الألياف المهيمنة عند عدائي المسافات القصيرة تفتقر للميتوكوندريات وغنية بـ أنزيم LDH، وبالتالي فإن طبيعة التفاعلات المنتجة للطاقة عند عدائي هذه المسافات هي تفاعلات حي لاهوائية: تخمر لبني.


(3) عند عدائي المسافات القصيرة، تهيمن التفاعلات اللاهوائية (التخمر لبني) من أجل تجديد جزيئات L'ATP، وهو ما ينتج عنه تراكم الحمض اللبني الذي يسبب انخفاض PH العضلة وبالتالي انخفاض فعالية الأنزيمات وانخفاض الاستقلاب العضلي مما يؤدي إلى التعب العضلي.

(4) يؤدي استعمال مادة EPO إلى الزيادة في عدد الكريات الحمراء وبالتالي نقل كميات مهمة من الأكسجين إلى الألياف العضلية وبالتالي إلى الميتوكوندري (الغشاء الداخلي) حيث يستعمل في تفاعلات السلسلة التنفسية، مما يرفع من كميات L'ATP المركبة والتي تزيد من تحسين الأداء الرياضي للعداء.


1) الغشاء الداخلي للميتوكوندري فقط هو الذي يحتوي على سلسلة نوافل الالكترونات تتدخل في تفاعلات السلسلة التنفسية و بالتالي قادرة على أكسدة النوافل RH_2 و نقل الالكترونات إلى الأكسجين المستقبل النهائي و الطاقة الناتجة عن انتقال الالكترونات تسبب دخول البروتونات من الماتريس إلى الحيز بيعشائي و أثناء رجوعها إلى الماتريس عبر الكرات ذات شمراخ تساعد على التفسير المؤكسد أي تركيب ATP.

2) التفاعلات:

أ - أكسدة النوافل RH_2 .



ب - التفسير المؤكسد.



1) الوسط 1 تكاثر مهم للخمائر مع إنتاج طاقة مهمة. الوسط 2 تكاثر ضعيف للخمائر مع إنتاج طاقة ضعيفة.

2) الوسط 1 في وجود الأكسجين تفكك تام للكلیکوز مع إنتاج طاقة مهمة ATP36 يستغل جزء مهم منها في التكاثر المهم للخمائر .

الوسط 2 في غياب الأكسجين تفكك جزئي للكلیکوز مع إنتاج طاقة ضعيفة ATP2 يستغل جزء ضعيف منها في التكاثر الضعيف لل الخمائر .

3) العضي M، هو الميتوكوندري يجب انجاز رسم تخطيطي له مرفقا بالأسماء المناسبة لمكوناته.

4) قارن الخلتين. الشكل 1 تحتوي على ميتوكوندريات كثيرة و كبيرة القد، الشكل 2 تحتوي على ميتوكوندريات قليلة جدا و ضامرة.

5) في الوسط الحيواني تتم التأكسدات التنفسية التي تستلزم وجود الميتوكوندريات، عكس الوسط الحيلاهوائي.

6) الشكل 1 ملاحظ بالوسط الحيواني الوسط 1 - الشكل 2 ملاحظ بالوسط الحيلاهوائي الوسط 2

7) تبقى نسبة الأكسجين ثابتة بعد إضافة الكلیکوز وتتحفظ بعد حقن حمض البيروفيك .

8) نستنتج أن الميتوكوندريات تستعمل حمض البيروفيك في استهلاك الأكسجين و لا تستعمل الكلیکوز مباشرة.

9) التفاعلات 1: انحلال الكلیکوز - التفاعلات 2 : أكسدة حمض البيروفيك (دوره كريبيس) - التفاعلات 3 : السلسلة التنفسية و التفسير المؤكسد.

10) التفاعلات 1: الجبلة الشفافة - التفاعلات 2 : ماتريس الميتوكوندري - التفاعلات 3 : الغشاء الداخلي للميتوكوندريات

11) التفاعلات 3.

12) ATP36

1) العضي X هو الميتوكوندري.

2) انخفاض في نسبة المستقلب نتيجة أكسدته على مستوى الميتوكوندري حيث يتم انتزاع الكربون على شكل CO_2 الذي ارتفع في الوسط وانخفاض الأكسجين نتيجة استهلاكه كمستقلب نهائي لالكترونات المنتزعة من المستقلب و الطاقة الناتجة عن انتقال الالكترونات تسبب دخول البروتونات من الماتريس إلى الحيز بيعشائي و أثناء رجوعها إلى الماتريس تساعد على التفسير المؤكسد أي انخفاض ADP و Pi وارتفاع في نسبة ATP .

(3) التأكسدات التنفسية.

4) انخفاض في نسبة المستقلب نتيجة أكسدته على مستوى الميتوكوندري حيث يتم انتزاع الكربون على شكل CO_2 الذي ارتفع في الوسط وانخفاض الأكسجين نتيجة استهلاكه كمستقلب نهائى للإلكترونات المنتزعه من المستقلب أما ثبات نسبة ADP و Pi و غياب ATP فيفسر بغياب الكرات ذات شمراخ أي عدم مرور البروتونات من الحيز بيعشائي إلى الماتريس وبالتالي غياب التفسير المؤكسد.


5) دور الكرات ذات شمراخ هو فسفرة ADP إلى ATP أي التفسير المؤكسد.

حل التمرين 7:

- 1) A تمثل الجبالة الشفافة و B تمثل الميتوكوندري.
- 2) ينخفض الإشعاع في وسط الزرع ويظهر في الوسط A الكليكوز و حمض البيروفيك و يختفي بعد ذلك من الوسط A و يظهر في الوسط B على شكل حمض البيروفيك، وأخيرا يختفي الإشعاع من الوسط B و يزداد في وسط الزرع CO_2 .
- 3) الكليكوز يدخل إلى الخلية و يفكك داخل الجبالة الشفافة إلى حمض البيروفيك هذا الأخير يدخل إلى الميتوكوندري لتنتمي أكسدته و انتزاع الكربون على شكل 2CO_2 الذي يغادر إلى خارج الخلية.
- 4) التفاعل الإجمالي للظواهر التي تحدث:
 - أ - في الوسط A .
 - ب - في الوسط B .



ب - في الوسط B .



حل التمرين 8:

- 1) الاسم المناسب للأرقام.
 - 1 : حز Z
 - 2 : شريط داكن
 - 3 : شريط فاتح
 - 4 - ساركومير - 4 :
- 2) بعد حقن بالكلالسيوم يقصر طول الساركومير و يختزل الشريط الفاتح و يبقى طول الشريط الداكن ثابت.
- 3) هذه الايونات تسبب تقلص الليف العضلي.
- 4) التغيرات التي طرأت على مكونات العضلة بعد التقلص:
 - أ - في الظروف العادية: نقصان نسبة الغليكوجين و ارتفاع نسبة الحمض اللبني.
 - ب - بعد معالجة العضلة بمادة تمنع اتحال الكليكوز: انخفاض نسبة الفوسفوكرياتين فقط
 - ج - بعد معالجة العضلة بمادة تمنع اتحال الكليكوز و CP: اختفاء ATP
- 5) في الظروف التجريبية 1 : تجديد ATP يتم عن طريق التخمر اللبني نظرا لظهور الحمض اللبني في العضلة. في الظروف التجريبية 2 : تجديد ATP يتم عن طريق تفكك الفوسفوكرياتين CP أي الطرق السريعة اللاهوائية نظرا لانخفاض نسبة الفوسفوكرياتين CP في العضلة وأيضا كبح اتحال الكليكوز.
- 6) اختفاء ATP نظرا لغياب مصادر تجديده.