

التمرين 1: bac_pc_2015_Nor

0.75 ن	1- أ • الخصائص البنيوية : - وجود تراكبات. - وجود فوالق معكوسة. - وجود طيات. • الخصائص الصخرية : - وجود صخور بلوتونية : الكرانوديوريت - أوفوليت. - صخور متحولة : الشيست الأخضر والشيست الأزرق.	
0.75 ن	ب • دليلي الطمر : - وجود الأوفوليت المتحول ← اختفاء محيط قديم. - الكرانوديوريت: صهارة أنديزيتية. • دليلي الاصطدام : (يقبل دليلين من بين الأدلة الثلاث الآتية) - تشوهات تكتونية من النوع الانضغاطي: تراكبات، طيات، فوالق معكوسة. - تواجد سلسلة جبال زاغروس في منطقة تجابه صفيحتين (مجالين قاريين). - وجود أوفوليت بين مجالين قاريين.	
0.5 ن	2 - • الشيست الأخضر ينتمي إلى المجال B : $0.4 \text{ GPa} < P < 1 \text{ GPa}$ $70^\circ \text{C} < T < 470^\circ \text{C}$ • الشيست الأزرق ينتمي إلى المجال C : $0.6 \text{ GPa} < P < 1.4 \text{ GPa}$ $100^\circ \text{C} < T < 390^\circ \text{C}$ هذه القيم تقريبية، تقبل كل قيمة درجة حرارة ($\pm 10^\circ \text{C}$) وضغط ($\pm 0.1 \text{ GPa}$)	
0.25 ن	3 تشكل كل من الشيست الأخضر والشيست الأزرق نتيجة حدوث تحول دينامي..... التعليل : التحول في ظروف ناجمة عن ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة نسبيا.....	0.25 ن
1 ن	4 خضوع الصفيحتين العربية والأوروأسيوية لقوى انضغاطية ← انغراز الغلاف الصخري المحيطي للصفيحة العربية ← ارتفاع مهم للضغط دون تغير ملحوظ في درجة الحرارة ← تحول دينامي ← تشكل صخور متحولة..... ملحوظة: يقبل الجواب إذا تجاوز المترشح مرحلة الطمر بتطرقه لظاهرة الاصطدام.	

التمرين 2: bac_pc_2014_Nor

0.5	1- أ التغيرات العيدانية: عند الانتقال من X إلى Y يلاحظ ظهور البيوتيت ثم البيجادي ثم الستوروتيد ثم الدستين ثم السليمانيت..... ب الخصائص البنيوية: الصخرة A (الميكاشيست): تتميز ببنية الشيستية (تقبل بداية التوريق) حيث تتشكل من أسرة داكنة من البيوتيت الموجهة وأسرة فاتحة مكونة من المرو فقط..... الصخرة B (الغنايس): تتميز ببنية مورقة حيث تتشكل من أسرة فاتحة من الفلدسبات والمرو تتناوب مع أسرة داكنة من البيوتيت..... الصخرة C (الميكمايت): تتميز بتداخل بنيتين بنية غنايسية وبنية كرانيتية.....	
0.25	2 أ - عند المرور من الصخرة A إلى الصخرة B: تزداد درجة الحرارة بشكل ملموس بينما يزداد الضغط بنسبة ضعيفة.....	

0.25		ب	- عند الانتقال من الصخرة B إلى الصخرة C: تزداد درجة الحرارة وينخفض الضغط.
0.25			- يتغير التركيب العيداني وتتغير البنية عند الانتقال من الميكاشيست إلى الغنايس.
0.25			- يصاحب التغيرات البنيوية والعيدانية ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة. إذن خضعت هذه الصخور للتحول.
0.25			- تشكلت هاتين الصخرتين في مجال التحول الدينامي الحراري.
1		3	- عند الانتقال من الصخرة A إلى الصخرة C تزداد شدة التحول، وفي أقصى ظروف التحول تخضع صخور الغنايس لانصهار جزئي يؤدي إلى ظهور سائل كرانييتي يتصلب ويبقى مرتبطا بالجزء الصلب من الغنايس فتتشكل صخرة الميكمايت.
0.75			- عندما يكون السائل الكرانييتي وافرا يتصلب ببطء في عمق القشرة الأرضية ليعطي صخرة الكرانييت.

التمرين 3: bac_pc_2013_Nor

1	المؤشرات البنيوية و الصخرية :	
1	الوثيقتان 1 و 2 (الخريطة و المقطع الجيولوجي لأوفيوليت كتلة Chenaillet): وجود بنية غلاف صخري محيطي ضمن جبال الألب و رواسب بحرية، ما مؤشر على انغلاق محيط قديم.	
1	الوثيقة 3: وجود التراكب في صخور كتلة Bornes (طبقات سمكية من الكلس ومشوهة تنتمي إلى الكريتاسي السفلي Cinf₂ راکبة فوق الكريتاسي العلوي) مؤشر على حدوث قوى انضغاطية. احتواء الكريتاسي السفلي Cinf₁ و Cinf₂ على مستحاثات بحرية (رخويات ومنخربات) مؤشر على أصل محيطي لهذه الصخور.	
0.75	الوثيقة 4: يبين رسم الصفيحة الدقيقة لصخرة الميتاكبرو وجود ثلاث معادن مؤشرة هي الكلوكوفان والبيجادي و الجادييت الشكل (أ). و حسب الشكل (ب) ظهور هذه المعادن يتم في ظروف ضغط مرتفع يفوق 1GPa و درجة حرارة ما بين 300°C و 500°C تقريبا : التحول الدينامي المميز لظاهرة الطمر	2
0.25	إذن سلسلة جبال الألب سلسلة اصطدام مسبق بطمر	
3	المراحل:	
2	- توضع رواسب الحقب الثاني البحرية المستحاثية (الكريتاسي 1 ثم 2). - تحرك وتقارب الصفيحتين الإفريقية والأوروبية نتيجة انغراز هذه الأخيرة تحت الصفيحة الإفريقية الأقل كثافة (الطمر). تحول دينامي للغلاف الصخري المحيطي المنغرز (ظهور معادن مؤشرة كالكوكوفان و البيجادي و الجادييت). - توقف الطمر واستسطاح الأوفيوليت. - انغلاق المحيط واصطدام الصفيحتين نتيجة القوى الانضغاطية، ما ينجم عنه تشوه صخور الكريتاسي السفلي والعلوي. تزايد الانضغاط وتراكب طبقات الكريتاسي السفلي فوق الكريتاسي العلوي وارتفاع السلسلة الجبلية. (ملحوظة: يراعى في سرد المراحل استثمار معطيات الوثائق، مع عدم احتساب مرحلة نشأة المحيط الألبى و تشكل القشرة المحيطية).	

التمرين 4: bac_pc_2012_Rat

1	+ مؤشرات انتماء سلسلة جبال كليدونيا إلى سلاسل الطفو:	
1 ن	الوثيقة 1: وجود سديم أوفيوليتية راکبة فوق وحدة Pouebo المطوية والمكونة من بازالت وصخور من أصل رسوبي ووحدات Diahot و Koumac الرسوبية التي تظهر فوالق معكوسة نتجت عن قوى انضغاطية؛	
1 ن	الوثيقة 2: تشابه مكونات السديم الأوفيوليتية لسلسلة جبال كليدونيا الجديدة ومكونات الغلاف الصخري المحيطي (المرجعي).	

2	- ظهور معدن (بلورات) الكلوكوان في وحدة Diahot يدل على انتمائها إلى مجال الاستقرار B و(أو) C .. - ظهور معدني البيجادي والجاديت في وحدة Pouebo يدل على انتمائها إلى مجال الاستقرار D .. - بالانتقال من الغرب نحو الشرق خضعت المجموعات الصخرية لتحول تزايدى تتميز بدرجة حرارة منخفضة وضغط مرتفع (الانتقال من مجال الاستقرار B إلى D) وهي ظروف تتميز التحول الدينامي الناتج عن ظاهرة الطمر ..	0.25 ن
3	- 50MA: انغراز غلاف صخري محيطي تحت غلاف صخري محيطي آخر (طمر محيطي) وتشكل موشور التضخم الذي أعطى وحدة Pouebo .. - 35MA: استمرار الطمر وجذب وحدتي Pouebo و Diahot من طرف الصفيحة المنغرفة نحو العمق (تحول دينامي) مع طفو جزء من الغلاف الصخري المحيطي من الشرق نحو الغرب .. - 30MA: طفو الغلاف الصخري المحيطي (السديمة الأوفيوليتية) فوق القشرة القارية وصعود الوحدات: نشوء سلسلة جبال كليدونيا الجديدة ..	0.5 ن
التمرين 5: bac_pc_2012_Nor		
1	- الوثيقة 1: انخفاض سريع لكمية الشابل المصطاد بالطن بنهر سبو ما بين 1963 و 1980 .. - الوثيقة 2: ارتفاع درجة حرارة مياه نهر سبو بعد إحداث معامل السكر ب 6°C .. - الوثيقة 3: انخفاض ذوبانية ثنائي الأوكسجين ب (10^{-3} mol/l) مع ارتفاع درجة حرارة مياه نهر سبو .. - التفسير: الأنشطة الصناعية المكثفة في حوض سبو أثرت سلبا على جودة مياهه عبر الرفع من درجة حرارتها ما نتج عنه انخفاض في ذوبانية ثنائي الأوكسجين في الماء، الشيء الذي تسبب في تراجع كميات الشابل المصطاد (ظروف عيش وتوالد غير ملائمة) ..	0.25 ن
2	- على امتداد 40 km أثناء فترة طرح المرجين من معاصر الزيتون، يرتفع DBO5 إلى قيم تتعدى 60mg/l مقارنة مع ما قبل هذه الفترة. ثم ينخفض إلى أقل من 10mg/l بالابتعاد عن موقع طرح نفايات فاس .. - على امتداد نفس المسافة (أي حوالي 40 km) ينخفض تركيز ثنائي الأوكسجين الذائب في مياه نهر سبو، أثناء فترة طرح المرجين، إلى حدود 0mg/l قياسا إلى ما قبلها. ثم تعود كمية O₂ إلى الارتفاع بالابتعاد عن موقع طرح نفايات فاس ..	0.75 ن
3	تتسبب النفايات العضوية في تدهور مياه نهر سبو (تغير الجودة) من خلال تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية والإحيائية لهذا الوسط البيئي (انخفاض ذوبانية O₂ في الماء وارتفاع DBO5) ..	1 ن
4	+ معالجة النفايات العضوية (وغير العضوية) الناتجة عن النشاط الصناعي قبل طرحها في الأوساط الطبيعية. + التوقف عن قذف النفايات العضوية في نهر سبو .. ملحوظة: قبول تدبير واحد ملائم.	1 ن
التمرين 6: bac_pc_2011_Nor		
1	- الوثيقة 1: - وجود تراكبات وزحف. - تجابه كتلة الهامش الأفريقي وكتلة الهامش الأوروبي (تجابه صفيحتين). - استسطاح الأوفيوليت .. الوثيقة 2 الشكل (أ): - ارتفاع كتلة Chenaillet ب 2650 m عن سطح البحر .. الشكل (ب): - تراكب وحدات الصفيحة الإفريقية - طفو وزحف الأوفيوليت والقشرة القارية الإفريقية فوق القشرة القارية الأوروبية ..	0.75 ن
		0.25 ن
		0.5 ن

2	الوثيقة 3: - الانتقال من الكابرو إلى الشيست الأزرق فالإكلوجيت. - اختفاء معادن البلاجيوكلاز والبيروكسين وظهور الكلكوفان ثم الجادييت والبيجادي يعني تصاعد شدة التحول من الغرب إلى الشرق. الوثيقة 4: - الانتقال من المجال A (مجال استقرار البلاجيوكلاز) إلى المجال D (مجال استقرار البيجادي + الجادييت ± الكلكوفان) يؤثر على تحول دينامي (ضغط مرتفع و T° متوسطة حوالي 500°C). الظاهرة: الطمر بانغراز القشرة المحيطية للصفحة الأوروبية تحت القشرة القارية للصفحة الإفريقية.	0.5 ن	0.5 ن	0.5 ن
3	- تقارب الصفيحتين الأوروبية والإفريقية. - طمر الصفحة الأوروبية واختفاء المحيط الألبى. - تحول دينامي لصخور القشرة المحيطية المنغرفة. - طفو وزحف الأوفولييت وتراكب القشرة القارية الإفريقية على القشرة الأوروبية.	2 ن		
التمرين 7: bac_pc_2010_Rat				
1	التمرين الرابع (5 نقط) - الخصائص التي تدل على ظاهرة طمر سابق هي: + المركب الأوفولييتي + بؤر زلزالية ذات أعماق كبيرة + وجود بلوتون من الكرانوديوريت. - الخصائص التي تدل على ظاهرة الاصطدام: + تحرك الصفحة العربية نحو الصفحة الأورواسيوية + وجود تراكبات وفوالق معكوسة وطيّات + غلاف صخري سميك.	0,75	0,75	
2	- يبرز جدول الشكل (أ) أن الغابرو والميتاغابرو لهما نفس التركيب الكيميائي ويبين الشكل (ب) أنه ليس لهما نفس التركيب العيداني. - بما أن للصخرتين نفس التركيب الكيميائي وصخرة الغابرو تنتمي للقشرة المحيطية وصخرة الميتاغابرو تكونت في ظروف ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة تتناسب مع منطقة الطمر: إذن الميتاغابرو ناتج عن تحول الغابرو إثر ظاهر الطمر.	0,5	0,5	
3	- تقاطع منحني ارتفاع درجة حرارة الرداء العلوي مع منحني انصهار البيريديوتيت المميهة ابتداء من عمق 60km اثناء ظاهرة الطمر تحرر صخور القشرة المحيطية المنغرفة الماء إثر التحول، يؤدي هذا إلى تمييه بيريديوتيت الرداء العلوي وبالتالي انصهارها جزئيا مع تكون صهارة تتبرد في العمق تعطي صخرة الكرانوديوريت.	1		
4	تسلسل الأحداث التي أدت إلى تشكل سلسلة جبال زاغروس: - زحف الصفحة العربية نحو صفحة أوراسيا؛ - طمر الغلاف الصخري المحيطي للصفحة العربية تحت صفحة أوراسيا؛ - تحول صخور القشرة المحيطية المظمورة نتيجة ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة؛ - انصهار جزئي لبيريديوتيت الرداء العلوي وتشكل صهارة أعطت صخرة الكرانوديوريت؛ - انغلاق المحيط القديم؛ - اصطدام الصفيحتين العربية والأوراسيوية مما أدى إلى حدوث تراكبات وطيّات.	1,5		

3	ربط العلاقة بين الصفة لون زغب الأرانب ونشاط أنزيم التيروسيناز: - عند السلالة من الصنف الهيملاي: ارتفاع درجة الحرارة عن 33°C ← أنزيم التيروسيناز غير نشيط ← جسم أبيض ما عدا الأطراف والأذنين لكون درجة حرارتهما لا تتعدى 33°C. - عند السلالة المتوحشة يبقى أنزيم التيروسيناز نشيطا في درجة الحرارة تفوق 33°C ← يكون جسمها أسودا. يعود اللون الأسود إلى صبغة الميلانين التي تتطلب تدخل أنزيم التيروسيناز (بروتين) الذي يمكن من تحويل التيروسين إلى دوبا. في حالة عدم فعالية هذا الأنزيم تظهر صفة المهق. مما يدل عن العلاقة بروتين صفة.	1,5
1	التمرين الثالث (5 ن) - استغلال الوثيقة 1: يوفر تركيز ATP بالعضلة ما بين 5,1 إلى 7,5KJ لكن المجهود العضلي يتطلب 35KJ، وعليه فالمخزون العضلي من الطاقة غير كاف لتلبية حاجات المجهود العضلي. - يستوجب ضمان استمرار النشاط العضلي التجديد المستمر لجزيئات ATP داخل العضلات.....	1
2	- الشكل أ: أثناء التمرين العضلي يبقى تركيز ATP في العضلة شبه ثابت نستنتج على أنه يتجدد باستمرار..... - ينخفض تركيز الفوسفوكرياتين في العضلة تدريجيا، نستنتج أنه يستعمل في تجديد جزيئات ATP التي استعملت في التقصص العضلي حسب التفاعل $\text{CP} + \text{ADP} \rightarrow \text{ATP} + \text{C}$..... - يرتفع تركيز الحمض اللبني في الدم تدريجيا أثناء التمرين العضلي، ينتج هذا الحمض اللبني عن ظاهرة التخمر اللبني في العضلات والتي تمكن من تجديد جزيئات ATP المستعملة في التقصص العضلي..... - في حالة المجهود العضلي لمدة طويلة (الشكل ب) يرتفع استهلاك الأوكسجين بسرعة ويستقر في قيمة قصوى تعادل 2L/min مما يدل على تجديد ATP بواسطة الأكسدة التنفسية.....	0,25 0,5 0,5 0,5
3	الشكل أ: - بين الزمنين t_1 و t_2 يعود إنتاج ATP إلى تدفق H^+ من الماتريس إلى الوسط الخارجي عبر السلسلة التنفسية فيتشكل ممال H^+. يعود H^+ إلى الماتريس عبر الكرات ذات الشمراخ مما يؤدي إلى تركيب ATP..... - بعد الزمن t_2 عند إضافة مادة FCCP يصبح الغشاء الداخلي نفوذا للبروتونات مما يؤدي إلى غياب ممال البروتونات بين جهتي الغشاء الداخلي، وبالتالي عدم تركيب ATP من طرف الكرات ذات شمراخ.....	0,5 0,5

1 أ-	المعايير المؤشرة على وجود منطقة الطمر: - وجود حفرة بين الصفيحة الهندية الاسترالية وصفيحة الهادي؛ - وجود نشاط زلزالي مميز، بحيث يزيد عمق بؤر الزلازل كلما تم الابتعاد من الحفرة في اتجاه الصفيحة الهندية الاسترالية. - وجود براكين.....	1.5 ن
ب	إنجاز رسم تخطيطي مفسر يبين: انغراز صفيحة الهادي تحت الصفيحة الهندية الاسترالية، توزيع بؤر الزلازل حسب مستوى بنيوف؛ تمثيل البراكين.....	1 ن
2	- يبين الشكل أ من الوثيقة 2، أنه في غياب الماء لا يتقاطع منحنى الدرجة السعيرية لمنطقة الطمر مع منحنى الانصهار الجزئي للبيروديت، في هذه الظروف لا يحدث الانصهار الجزئي للبيروديت؛ - بينما يبين الشكل ب من الوثيقة 2 أنه بوجود الماء، يتقاطع منحنى الدرجة السعيرية لمنطقة الطمر مع منحنى تصلب البيروديت، يسهل وجود الماء الانصهار الجزئي للبيروديت حيث تنخفض درجة حرارة بداية الانصهار ..	1.5 ن

- خلال ظاهرة الطمر، تتعرض صخور الغلاف الصخري المحيطي المنغرز لتأثير عاملي الضغط ودرجة الحرارة مما يؤدي إلى تحرير الماء الذي ينتشر عبر الرداء ويسهل الانصهار الجزئي لبريدوتيت الغلاف الصخري للصفحة الراكبة ويبدأ. تصعد الصهارة عموديا نحو السطح مؤدية إلى براكين الجزيرة

التمرين 10: bac_pc_2009_Nor

2 ن

1 ن

2 ن

1-أ

ب

2

2

3

- عند الانتقال من الجنوب إلى الشمال، يلاحظ ظهور البيوتيت ثم الدستين فالسليمانيت؛
- يفسر هذا التسلسل في تشكل المعادن بارتفاع تدريجي للضغط ودرجة الحرارة؛
- ب - تحول دينامي حراري (أو إقليمي) (+ التعليل)
- 2 - المرحلة الأولى: تقارب الصفيحتين A و B وانغراز الغلاف الصخري المحيطي للصفحة A تحت الغلاف الصخري القاري للصفحة B؛
- المرحلتان الثانية والثالثة: تجابه الصفيحتين A و B نتيجة قوى انضغاطية، ظهور تشوهات وتشكل صخور متحولة؛
- نتج عن حركية الصفيحتين A و B ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة المسؤولين عن التحول الدينامي الحراري الذي عرفته المنطقة المدروسة.

التمرين 11: bac_pc_2008_Rat

1

2

3

- تتواجد الصخور المتحولة في المجال رقم 2 وهو مجال التحول الدينامي الحراري الذي يتميز بضغط مرتفع وحرارة متوسطة.
- 2 - تنتمي جبال عمان إلى نمط سلاسل الطفو
- 3 - التعليل: تدل البنية الجيولوجية 3 (السديمة الأفيلوتية) على انغلاق بحر قديم نتج عنه زحف للقشرة المحيطية فوق القشرة القارية بفعل تقارب الصفيحتين الإفريقية والأوروآسيوية

مراحل التشكل:

+ 95 MA - : بفعل تأثير قوى تكتونية انضغاطية تم طمر الغلاف الصخري المحيطي للصفحة الإفريقية تحت الصفحة الأوروآسيوية؛

+ 80 MA - : انغلاق مجال المحيط نتيجة زحف الصفحة المحيطية الأوروآسيوية فوق الصفحة الإفريقية أدى إلى تكون تراكبات مهمة للصخور الرسوبية (موشور التضخم) وصعود الأفيلوت فوق الصفحة الإفريقية؛ استمرار القوى التكتونية الانضغاطية أدى إلى تكون تشوهات جيولوجية وتكون صخور متحولة.

1	1 - يظهر المقطع نوعين من التشوهات التكتونية : الطيات والفوالق . 2 - نمط السلسلة : سلسلة الطمر 3 - الظاهرة المسببة لها ظاهرة الطمر 4 - من بين الأدلة التي تؤكد ذلك : • وجود نشاط بركاني • وجود نشاط زلزالي : ازدياد عمق بؤر الزلازل كلما ابتعدنا عن الحفرة في اتجاه القارة (مستوى Benioff) • وجود حفرة محيطية موازية للهامش النشط، • السلسلة الجبلية موازية للحافة القارية . 3 - بفعل تعرض الصفيحة المحيطية المنغرفة والمشبعة بالماء لارتفاع الضغط والحرارة ، تفقد الماء تدريجيا ، هذا الماء ينتشر عبر الرداء مما يجعل هذا الأخير تحت ظروف الإنصهار الجزئي ، نحصل في النهاية على صهارة . تتعرض لتبريد بطيء قبل وصولها إلى السطح لنحصل على بلوتونات كرانيتويدية و نتيجة للحت تستسطح الكتل البلوتونية . 4 - الرسم التخطيطي لظاهرة الطمر : في حدود الشكل التالي	(1 ن) (0,5 ن) (0,5 ن) (1 ن) (1 ن) (1 ن)
2) منطقة الشيفت الانقصر 3) منطقة الشيفت الارقي 4) منطقة الاكلوجيت		

0.25	التغيرات العيدانية :	1
0.25	1 - عند الانتقال من R1 إلى R2 ن سجل : - اختفاء الكلوريت - ظهور البيوتيت والموسكوفيت 2 - عند الانتقال من R3 إلى R4 ن سجل : - اختفاء الأندلوسيت والموسكوفيت - ظهور السيليمانيت و الفلدسبات البوتاسي ..	
0.5	تفسير التغيرات العيدانية :	2
0.5	1 - عند الانتقال من R1 إلى R2 : ارتفاع في درجة الحرارة ← المرور من مجال استقرار الكلوريت إلى مجال استقرار البيوتيت 2 - عند الانتقال من R3 إلى R4 : ارتفاع كل من الضغط و درجة الحرارة ← المرور من مجال استقرار الأندلوسيت إلى مجال استقرار كل من السيليمانيت و الفلدسبات البوتاسي.	
0.5	تفسير تشكل الصخرة R5 :	3
0.5	ارتفاع الضغط و درجة الحرارة ← انصهار جزئي للصخرة R4 ← جزء لم ينصهر له بنية شبيهة بصخرة الغنايس R4 و جزء سائل تصلب ببطيء في مكانه ليعطي بنية حبيبية تشبه صخرة الكرانيت R6	

0.25	الظروف الدنيا للضغط و درجة الحرارة التي عرفتها المنطقة هي ظروف تشكل الصخرة R1 : $P = 2 \text{ Kbars}$	4
0.25	و $T = 370^\circ\text{C}$ الظروف القصوى للضغط و درجة الحرارة التي عرفتها المنطقة هي ظروف تشكل الصخرة R6 $P = 3.3 \text{ Kbar}$	
0.25	و $T = 700^\circ\text{C}$ (تقبل الأجوبة القريبة من هذه القيم).....	
0.25	نمط التحول الذي عرفته المنطقة هو تحول دينامي حراري.....	
0.25	الظاهرة الجيولوجية المسؤولة عن هذا التحول هي ظاهرة الاصطدام.....	

التمرين 14: bac_svt_2014_Rat

0.5	1 - يتموضع الكرانيت الانداسي في شكل كتلة محدودة جغرافيا تحيط بها صخور متحولة في شكل هالة تتكون من الشبست المبقع والكورنيين (الوثيقة 1). يظهر الشكل أ من الوثيقة 2 أن الكرانيت يخترق الصخور المحيطة به.....	2
0.25	لم تتعرض الطبقات الرسوبية التي تنتمي إلى الكمبري للتحول لكونها ترسبت بعد تموضع الكتلة الكرانيتية.....	
0.5	يدل وجود حبيسة الغنايس أن الصهارة التي أعطت هذا الكرانيت قادمة من العمق الذي تكون فيه الكرانيت الأناتكتي بمحاذاة صخور الغنايس. انفصلت، هذه الصهارة، في شكل كتلة صعدت نحو الأعلى فأعطت الكرانيت الانداسي.	
0.25	3 - يستقر معدن الببوتيت في درجة حرارة أكبر من 400°C	3
0.25	يستقر الكورديريت بين درجة حرارة بين 510°C و 580°C	
0.25	يستقر معدن الأنديوسيت بين درجة حرارة 450°C ودرجة 650°C	
0.25	يستقر معدن السيليميت في درجة حرارة أكبر من 650°C ؛..... (يمكن قبول أي قيم قريبة من القيم المذكورة أعلاه) استنتاج: تشير هذه المعادن أن درجة حرارة استقرار الصخور المكونة لهالة التحول ترتفع تدريجيا كلما اقتربنا من الكتلة الكرانيتية.....	
0.5	4 تتكون عند صعود الصهارة الكرانيتية كتل انداسية تتبرد وتتصلب قبل الوصول إلى السطح فتتعرض الصخور المحيطة بها إلى ارتفاع في درجة الحرارة فتتشكل معادن جديدة مؤشرة على هذه الظروف مكونة صخور تحول التماس.	

التمرين 15: bac_svt_2013_Rat

0.25	1 المميزات الصخرية والبنوية:	1
0.25	- وجود حفرة محيطية.....	
0.25	- وجود بركانية أندزيتية وصخور بلوتونية من الكرانيتويدات.....	
0.25	- وجود مؤشر التضخم.....	
0.25	- وجود فوالق معكوسة.....	2
0.25	- توزيع بؤر الزلازل حسب العمق بشكل مائل في اتجاه القارة حسب مستوى Benioff.....	
0.25	- وجود شدوذ في منحنيات تساوي درجة الحرارة بحيث تنغرز مائلة حسب مستوى Benioff.....	
0.25	3 - كثافة القشرة المحيطية أكبر من كثافة القشرة القارية.....	3
0.25	لا يمكن تفسير هذه الخصائص إلا باعتبار أن الصفيحة المحيطية تنغرز تحت الصفيحة القارية أي حدوث ظاهرة الطمر.....	
0.25	الشكل أ : بوجود الماء ← تقاطع بين منحنى الدرجة الحرارة (1) لمنطقة الطمر ومنحنى تصلب البيريدوتيت المميهة (2) ← انصهار جزئي للبيريديوتيت.....	
0.25	- توجد منطقة الانصهار الجزئي للبيريديوتيت في عمق حوالي 100km ودرجة حرارة 1000°C	
0.25	الشكل (ب): وجود منطقة الانصهار الجزئي بمحاذاة منحنى درجة الحرارة 1000°C مع وجود صهارة بركانية تعلو منطقة الانصهار الجزئي.....	3
0.25	ظروف تشكل الصخور الصهارية في مناطق الطمر:	
0.25	• انغراز الغلاف الصخري المحيطي ← ارتفاع كبير للضغط ← تحرير الماء من طرف القشرة المحيطية المنغرفة ← تحقق شروط الانصهار الجزئي للبيريديوتيت ← تكون الصهارة.....	
0.25	• تبريد جزء من الصهارة في العمق ← تشكل الصخور البلوتونية.....	
0.25	• صعود جزء من الصهارة إلى السطح ← البركانية الأندزيتية.....	

1	مؤشرا القوى الانضغاطية:	0.25	• وجود سديمة؛
0.25	• وجود مؤشر التضخم؛	0.25	• وجود أفيوليت
0.25	مؤشرا اختفاء مجال محيطي:	0.25	• وجود رواسب بحرية (رواسب الحواسنة)
0.25	• وجود رواسب بحرية (رواسب الحواسنة)	0.25	عمق بداية تشكل الشيست الأزرق: ابتداء من 42km (تقبل القيم ما بين 40 و 45km)
0.25	عمق بداية تشكل الإيكولوجيت : ما فوق 53K (تقبل القيم ما بين 50 و 55km)	0.25	استنتاج: نوع التحول هو دينامي لكون العامل الأساسي هو ارتفاع الضغط.
0.5	الوثيقة 1: يدل وجود الأفيوليت والرواسب البحرية فوق الغلاف الصخري القاري عن طفو غلاف صخري محيطي	0.5	الوثيقة 2: يدل التحول الدينامي على أن الصخور المتحولة (شيست أزرق و الإيكولوجيت) هي ناتجة عن تحول لغلاف صخري محيطي إثر ظاهرة الطمر
0.5	وعليه فسلالة جبال عمان هي ناتجة عن حجز الطمر متبوع بطفو.		

التمرين 17: bac_svt_2012_Rat

1	- مؤشرات القوى الانضغاطية هي:	0.25	• وجود فوالق معكوسة وتراكبات
0.25	• وجود سدائم	0.25	• وجود طيات
0.25	المؤشر الدال على اختفاء محيط هو: وجود خياطة أفيولوتية بين الهامشين القاريين	0.25	السحنات المناسبة لصخور المتاكابرو هي:
0.25	• MG_1 ينتمي لسحنة الشيست الأخضر لانه يحتوي على التجمع المعدني كلوريت واكتينوت	0.25	• MG_2 ينتمي لسحنة الشيست الأزرق لانه يحتوي على التجمع المعدني كلوكوفان وايدوت
0.25	• MG_3 ينتمي لسحنة الإيكولوجيت لاحتوائه على التجمع المعدني بجادي وجادييت	0.25	نلاحظ عند الانتقال من MG_1 إلى MG_2 إلى MG_3 ارتفاعا مهما في قيمة الضغط وارتفاع ضعيف في درجة الحرارة ← تحول دينامي
0.5	المراحل المؤدية إلى تشكل سلسلة جبال الألب :		
0.25	- وجود مؤشرات التحول الدينامي ← حدوث طمر	0.25	- وجود خياطة أفيولوتية ← انغلاق مجال محيطي
0.25	- وجود تشوهات مهمة دالة على قوى انضغاطية ← اصطدام الصفيحتين	0.25	

التمرين 18: bac_svt_2012_Nor

1	- بالنسبة للبنية: نمر من البنية الشيستية بالنسبة للميكاشيست إلى البنية المورقة بالنسبة للغنايس .	0.25	(يمكن قبول بنية مورقة بالنسبة للميكاشيست)
0.25	- بالنسبة للتركيب العيداني:	0.5	اختفاء معدن الكلوريت؛
0.25	ظهور معادن جديدة كاللثوردجيت والفلدسبات والسليمانيت	0.25	- إذن عند المرور من الميكاشيست إلى الغنايس هناك تغيرات بنيوية وعيدانية وبالتالي المنطقة خضعت لظاهرة التحول
0.25	- حدود اختفاء الكلوريت: درجة الحرارة من 350°C إلى 450°C تقريبا	0.25	- حدود ظهور الكورديييت: درجة الحرارة من 500°C إلى 680°C تقريبا
0.25	- حدود ظهور الفلدسبات: درجة الحرارة من 620°C إلى 880°C تقريبا	0.25	إذن كلما انتقلنا من الصخرة R إلى الصخرة G_1 تزداد درجة الحرارة
0.25	كلما انتقلنا من الصخرة R إلى الصخرة G_1 تزداد شدة التحول،	0.25	وفي أقصى ظروف التحول تخضع الصخور المتحولة لانصهار جزئي معطية سائلا له تركيب كرانيتي،
0.25	عند تصلبه يبقى مرتبطا مع مادة لم تنصهر بعد (الغنايس) مشكلة الميكمايت	0.5	

0.25	وجود بؤر زلزالية يزداد عمقها كلما اتجهنا داخل القارة.....	1
0.25	وجود حفرة محيطية وجود براكين.....	
0.25	تحرك الصفيحة المحيطية لنازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية في اتجاه معاكس.....	
0.25	الصفيحة المنغرفة هي صفيحة نازكا والصفيحة الراكبة هي صفيحة أمريكا الجنوبية..	
0.25	الشكل (أ): غياب الماء ← عدم تقاطع بين منحنى الدرجة السعيرية لمنطقة الطمر ومنحنى تصلب البيريدوتيت ← عدم توفر ظروف الانصهار الجزئي للبيريديوتيت في منطقة الطمر.....	2
0.25	الشكل (ب): بوجود الماء ← تقاطع بين منحنى الدرجة السعيرية لمنطقة الطمر ومنحنى تصلب البيريدوتيت ← انصهار جزئي للبيريديوتيت.....	
0.25	ظروف الانصهار الجزئي للبيريديوتيت المميه في منطقة الطمر: عمق بين 80 و 200Km ودرجة حرارة بين 750°C و 1200°C.....	
0.5	توجد منطقة الانصهار الجزئي للبيريديوتيت في عمق حوالي 100 Km ودرجة حرارة حوالي 1000°C.....	3
0.75	انغراز الغلاف الصخري المحيطي ← ارتفاع كبير للضغط ← تحول الصخرة R1 إلى R2 وتحول الصخرة R2 إلى R3 وحدث تفاعلات عيدانية ← تحرير الماء ← تحقق شروط الانصهار الجزئي للبيريديوتيت ← تشكل الصحارة.....	4

التمرين 20: bac_svt_2010_Rat

1	- تتطابق صخور المجموعة A مع صخور الغلاف الصخري المحيطي (المعملة في الوثيقة 2) - تواجد صخور المجموعة A (جزء من الغلاف الصخري المحيطي) فوق صخور الغلاف الصخري القاري يدل على وجود طفو لغلاف صخري محيطي فوق غلاف صخري قاري: السلسلة المدروسة سلسلة طفو.....	1 ن
2	- وجود معادن الكوكوفان في المجموعة الصخرية B مؤشر على خضوعها لتحول تحت ضغط مرتفع (تحول دينامي). - طفو جزء من الغلاف الصخري المحيطي فوق الغلاف الصخري القاري ← ارتفاع الضغط ← تحول دينامي.....	1 ن
3	- قبل 50 Ma حدث طمر ضممحيطي؛ - قبل 39 Ma انفصال جزء من أستراليا وتشكل مجال محيطي " بحر الكوراي " واستمرار الطمر الضممحيطي؛ - قبل 23 Ma : طفو جزء من الغلاف الصخري المحيطي فوق الجزء القاري المنفصل من أستراليا، مما أدى إلى تشكل سلسلة جبال غينيا الجديدة التي تتميز بتشوهات تكتونية و تشكل صخور متحولة مع حت جزء من الغلاف الصخري المحيطي.....	1 ن

التمرين 21: bac_svt_2010_Nor

0,5 ن	- ظهور معادن مؤشرة جديدة من الشمال نحو الجنوب - ارتفاع تدريجي للضغط و درجة الحرارة من الشمال إلى الجنوب.....	1
1 ن	- المجال A ← سحنة الشيست الأخضر، والمجالان B و C ← سحنة الأمفيبوليتات. إذن السحنات المميزة للمنطقة هي سحنة الشيست الأخضر وسحنة الأمفيبوليتات، وذلك عند الانتقال من الشمال إلى الجنوب. - تنتمي هذه السحنات إلى المجال 2. - نمط التحول : تحول دينامي- حراري : ضغط و درجة حرارة متوسطان.....	2
1,5 ن	- تجابه الصفيحتين نتيجة لقوى انضغاطية ← تقصير الغلاف الصخري وازدياد سمكه ← انغراز صخور الغلاف الصخري في العمق ← ارتفاع الضغط و درجة الحرارة ← خضوع الصخور لتحول دينامي- حراري (إقليمي).....	3

0.5	1	تتوفر الصخرة M1 على معادن البروكسين والكلوكوفان والبلاجيوكلاز. مجال التجمعات المعدنية الذي يطابق هذه الصخرة هو المجال C.
0.5		تتوفر الصخرة M2 على معادن البيجادي والجدييت. مجال التجمعات المعدنية الذي يطابق هذه الصخرة هو المجال E
0.5	2	تشكلت الصخرة M1 في عمق يتراوح ما بين 15 و 35 Km وتحت درجة حرارة أقل من 450°C تتميز هذه الصخرة بكثافة تتراوح ما بين 2.8 و 3
0.5		تشكلت الصخرة M2 في عمق يفوق 30 Km و درجة حرارة تتراوح ما بين 250°C و 550°C تقريبا تتميز هذه الصخرة بكثافة مرتفعة (أكثر من 3).
1		عند انغراز القشرة المحيطية تتعرض الصخور للتحول، فتمر الصخرة M1 من المجال C ذي درجة حرارة وضغط منخفضين إلى المجال E ذي ضغط ودرجة حرارة مرتفعين، مصحوب بارتفاع الكثافة. تشهد هذه التحولات المعدنية والكثافة عن وجود طمر قديم.

التمرين 23: bac_svt_2008_Rat

1	1	ذكر أربعة مؤشرات من بين ما يلي: - وجود ثلاثة تراكبات (فوالق معكوسة ذات بعد كبير) ممتدة في اتجاه الجنوب الغربي؛ - تموضع انقطاع Moho الذي يفصل بين القشرة والرداء على عمق كبير يتجاوز 50 كلومترا، ويشير هذا إلى زيادة سمك القشرة القارية في هذه المنطقة؛ - وجود قشرة قارية مشوهة ومتحولة؛ - وجود الأوفيوليت في الشمال الشرقي وهو قطعة من الغلاف الصخري المحيطي؛ - وجود بلوتون كرانيتي يخترق الرواسب البحرية.
1	2	يبرز الشكل (أ) أن الغابرو يتضمن معدني البيروكسين والبلاجيوكلاز بينما الميتاغابرو يتضمن معدني الجادييت والكلوكوفان. تدل معطيات الوثيقة 3 أن معدني الجادييت والكلوكوفان المميزين لصخرة الميتاغابرو (الوثيقة 2) تكونا تحت ظروف درجة حرارة بين 100°C و 400°C وضغط بين 0,6 و 1,5GPa (المجال C). يتناسب هذا المجال مع تغير درجة الحرارة السعيرية السائدة في مناطق الطمر.
2	3	تشهد الأوفيوليت المحصورة بين الطبقات القارية عن انغلاق محيط قديم وتؤكد التراكبات وسمك القشرة القارية عن وجود قوى انضغاطية. تدل هذه الخصائص على أن سلسلة جبال الهيمالايا سلسلة ناتجة عن اصطدام غلافين صخريين. إذن فقد نتجت سلسلة جبال الهيمالايا عن المراحل التالية: - زحف القارة الهندية نحو الصفيحة الأوروأسيوية، وقد كان هذا الزحف مصحوبا بطمر القشرة المحيطية تحت الصفيحة الأوروأسيوية؛ - انغلاق هذا المحيط حيث لم يبقى منه سوى قطعة من الأوفيوليت؛ - التقاء الهامشين القاريين للهند وآسيا مع حدوث اصطدام وتشكل تراكبات.

التمرين 24: bac_svt_2008_Nor

1	1	المعطيات التي تدل عن انغلاق محيط قديم وتجابه صفيحتين صخريتين: - وجود رواسب تنتمي لقعر المحيط؛ - وجود الأوفيوليت وهو مركب ينتمي للقشرة المحيطية؛ - وجود فوالق معكوسة وطيات تدل عن قوى تقصيرة؛ - وجود أراضي قديمة (تنتمي للحقب الثاني) تتركب أراضي حديثة (تنتمي للحقب الثالث) في اتجاه الشمال الغربي؛
0.5	2	يتكون الإكلوجيت تحت درجة حرارة تناهز 400°C وضغط يناهز 15kbar. تتناسب هذه الظروف مع منطقة التحول الدينامي. المنطقة الملائمة لهذه الظروف هي منطقة الطمر.

- تسلسل الأحداث:
- تكون الأوفوليت المكون للقشرة المحيطية في مستوى الذروة وتوضعت عليه الصخور الرسوبية؛
 - تقارب القارة الإفريقية والقارة الأوروبية.
 - انغراز القشرة المحيطية للصفحة الأوروبية تحت الصفحة الإفريقية (أو ظاهرة الطمر)
 - فتعرضت صخور المركب الأوفوليتي لشدة تحول دينامي ترتب عنه تكون صخرة الإكلوجيت؛
 - التقاء الهامشين القاريين لإفريقيا وأوروبا إثر الاصطدام مع تكون طيات وفوالق وتراكب في اتجاه الشمال الغربي؛
 - رفع الصخور من الأعماق الكبيرة إلى الأعلى عبر الظواهر الجيولوجية المصاحبة لتكون سلاسل الاصطدام؛
 - تعرض الصخور للحت مع استسطاح صخور الأوفوليت.

التمرين: 25 bac_svt_2015_Rat

0.5 4 ×	(1، ب) ، (2، أ) ، (3، أ) ، (4، د)	I
0.5 0.5 0.25 4 ×	تعريف صحيح من قبيل: الصخور المتحولة: صخور ناتجة عن تغيرات بنيوية و/أو عيانية لصخور سابقة الوجود في الحالة الصلبة تحت تأثير تغير عاملي الضغط ودرجة الحرارة. المعدن المؤشر: معدن يتشكل في ظروف ضغط ودرجة حرارة محددة، يؤشر تواجده في الصخور على الظروف التي خضعت لها هذه الصخور أثناء تحولها	II
0.25 4 ×	أ. صحيح ب. خطأ ج. خطأ د. صحيح	III
0.25 4 ×	1 ← هـ ؛ 2 ← و . ؛ 3 ← أ ؛ 4 ← ج	IV

المكون الثاني : الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين الأول (3 نقط)

0.25 0.25	- وصف توزيع الألياف العضلية: - بالنسبة لعداء 10000 متر : تتوفر العضلات على نسبة مهمة من الألياف F_I (70 %) و نسبة أقل من الألياف F_{II} (30 %) - بالنسبة لعداء 100 متر : تتوفر العضلات على نسبة مهمة من الألياف F_{II} (65 %) و نسبة أقل من الألياف F_I (35 %)	1
0.25 0.25	- خصائص التقلص : - بالنسبة للألياف F_I : تقلص بشدة متوسطة (1.2 UA) و تحافظ على نفس الشدة لمدة طويلة. - بالنسبة للألياف F_{II} : تقلص بشدة كبيرة (2 UA) وتنخفض هذه الشدة سريعا حتى تتعدم.	2
0.5 0.5	- المسلك الاستقلابي المميز لكل نوع من الألياف : - بالنسبة للألياف F_I : تتميز بالتنفس الخلوي . التعليل (تعلييل من بين) : - حجم كبير للميتوكوندريات - نسبة مهمة للخصاب الدموي المثبت لـ O_2 - وفرة أنزيم MDH - القابلية للتعب ضعيفة. - بالنسبة للألياف F_{II} : تتميز بالتخمر اللبني. التعليل (تعلييل من بين) : - وفرة أنزيم LDH - صغر حجم الميتوكوندريات - نسبة ضعيفة للخصاب الدموي المثبت لـ O_2 - القابلية للتعب كبيرة.	3
0.5 0.5	- تفسير الاختلاف بين العدائين : - تتطلب مسافة 100 m مجهودا بشدة كبيرة و لمدة وجيزة و هذا يتوافق مع سيادة الألياف F_{II} التي تتميز بارتفاع شدة تقلصها في مدة قصيرة و اعتمادها على التخمر اللبني كمصدر للطاقة الضرورية لانجاز هذا المجهود العضلي - تتطلب مسافة 10000 m مجهودا بشدة منخفضة و لمدة طويلة و هذا يتوافق مع سيادة الألياف F_I التي تتميز بطول مدة تقلصها بشدة ضعيفة و اعتمادها على التنفس الخلوي كمصدر للطاقة الضرورية لانجاز هذا المجهود العضلي	4

التمرين: 26 bac_pc_2015_Rat

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	تواجد سلسلة جبلية في هامش قاري نشيط. وجود حفرة محيطية. وجود بركانية أنديزيتية. طيات وفوالق معكوسة تدل على تعرض المنطقة لقوى انضغاطية. جبال البيزا تنتمي إلى صنف سلاسل الطمر.	1
--------------------------------------	---	---

0.25 ن	2	جبال البيرو تنتمي إلى صنف سلسل جبال في غياب الماء تكون درجة الحرارة الضرورية لانصهار البيريدوتيت دائما أكبر من درجة الحرارة السعيرية، وبذلك لا ينصهر البيريدوتيت مهما كان العمق..... بوجود الماء تنخفض درجة الحرارة الضرورية لانصهار البيريدوتيت لتصبح أقل من درجة الحرارة السعيرية في عمق يتراوح بين 80km و 200km..... $25\text{kbar} < P < 63\text{kbar}$ و $800^{\circ}\text{C} < T < 1200^{\circ}\text{C}$ وضغط $(\pm 5\text{kbar})$ وحرارة $(\pm 20^{\circ}\text{C})$ هذه القيم تقريبية، تقبل كل قيمة درجة حرارة
0.25 ن	3	الوثيقة 3 : عند المرور من الغابرو إلى الميتاغابرو 1 ثم إلى الإيكلوغيت ، يلاحظ اختفاء معادن وظهور معادن أخرى..... هذا التغير في التركيب العيداني يدل على حدوث ظاهرة التحول..... الوثيقة 4 : معادن الميتاغابرو 1 تستقر في المجال B . معادن الميتاغابرو 2 تستقر في المجال C . معادن الإيكلوغيت تستقر في المجال D وبالتالي فالمرور من الميتاغابرو 1 إلى الميتاغابرو 2 ثم إلى الإيكلوغيت ناتج عن ارتفاع هام للضغط وارتفاع نسبي لدرجة الحرارة..... تحول دينامي.....
0.25 ن	4	انغراز الغلاف الصخري المحيطي لصفحة نازكا - ارتفاع هام للضغط وارتفاع نسبي لدرجة الحرارة - حدوث تحول دينامي وتحرير الماء - انصهار جزئي للبيريديوتيت - تشكل صهارة أنديزيتية.

التمرين: 27 bac_pc_2016_Nor

I	- التحول : ظاهرة جيولوجية تؤدي إلى تغير كل من التركيب العيداني وبنية صخور في حالتها الصلبة تحت تأثير تغير ظروف الضغط ودرجة الحرارة..... - المعدن المؤشر: معدن يمكن من تحديد ظروف الضغط ودرجة الحرارة السائدة أثناء تشكل الصخرة التي تحتوي عليه.														
0.5 ن															
0.5 ن															
II	ذكر خاصيتين من قبيل: 1- سلاسل الطمر: وجود حفر محيطية – حدوث بركانية أنديزيتية – توزيع مائل للبور الزلزالية – متتالية صخرية تحويلية (الشيسيت الأخضر – الشيسيت الأزرق – الاكلوجيت) 2- الكرانيت الأناتيكتي: مساحته شاسعة – يتشكل في عمق كبير – حدوده غير واضحة مع الصخور المتحولة – مرتبط بالتحول الدينامي الحراري														
0.5 ن															
0.5 ن															
III	-الاختيار من المتعدد: (4× 0.5) (1 ؛ ج) ؛ (2 ؛ ب) ؛ (3 ؛ د) ؛ (4 ؛ ب)														
2 ن															
IV	المزاوجة: (4× 0.25) <table><tr><td>أرقام عناصر المجموعة 1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>الحرف الذي يشير إلى التعريف</td><td>ج</td><td>ب</td><td>أ</td><td>د</td></tr></table>					أرقام عناصر المجموعة 1	1	2	3	4	الحرف الذي يشير إلى التعريف	ج	ب	أ	د
أرقام عناصر المجموعة 1	1	2	3	4											
الحرف الذي يشير إلى التعريف	ج	ب	أ	د											
1 ن															

0.5 4 ×	(1، ب) ، (2، ب) ، (3، ب) ، (4، أ)	I
0.5	أ. نمطين من التشوهات التكتونية المميزة لمناطق التقارب من قبيل : - الفوالق المعكوسة - الطيات - السدائم	II
0.5	ب. تعريف صحيح لظاهرة التحول: هو تغير في بنية وعيدانية صخور سابقة الوجود في الحالة الصلبة تحت تأثير تغير الضغط ودرجة الحرارة.....	
0.25 4 ×	أ. خطأ ب. صحيح ج. صحيح د خطأ	III
0.25 4 ×	1 : غلاف صخري قاري ؛ 2 : غلاف صخري محيطي ؛ 3 : حفرة محيطية 4 : بركانية أنديزيتية	IV

التمرين: 29 bac_pc_2016_Rat

0.25 0.25 0.25	أدلة على اختفاء محيط قديم وتجابه الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأوربية: - وجود الأفيوليت بين الهامش الأفريقي والهامش الأوربي - وجود تشوهات تكتونية انضغاطية: طيات وفوالق معكوسة وتراكبات - تجابه الهامشين القاريين الإفريقي والأوربي.....	1												
0.5 0.5 0.5	مقارنة التركيب العيداني للعينات الصخرية: أ- عينة 1 و عينة 2: يتضمنان البيروكسين والبلاجيوكلاز، في حين تحتوي العينة 2 إضافة إلى ذلك على الأبيدوت وتفتقر للهرنبلاند ب- عينة 3 و عينة 4: يتضمنان البلاجيوكلاز والغلوكوفان ، في حين تفتقر العينة 4 لمعدني البيروكسين والأبيدوت وظهر بها معدني البيجادي والجادييت ج- عينة 4 و عينة 5: يتوفران على معدن البلاجيوكلاز، كما تتوفر العينة 5 على الأبيدوت والهرنبلاند، واختفى منها كل من الغلوكوفان والبيجادي والجادييت	2												
0.75	ظروف الضغط ودرجة حرارة تشكل كل من الغابرو والعينتين الصخريتين 3ع و 5ع: (تقبل كل القيم المقاربة للقيم الواردة في الجدول: بالنسبة لدرجة الحرارة $20^{\circ}\text{C} \pm$ ، وبالنسبة للضغط $0.2\text{Kbar} \pm$)	3.أ												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>العينة الصخرية</th><th>الضغط بـ Kbar</th><th>درجة الحرارة بـ $^{\circ}\text{C}$</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الغابرو</td><td>3</td><td>980</td></tr> <tr> <td>عينة 3</td><td>9</td><td>300</td></tr> <tr> <td>عينة 4</td><td>11</td><td>680</td></tr> </tbody> </table>	العينة الصخرية	الضغط بـ Kbar	درجة الحرارة بـ $^{\circ}\text{C}$	الغابرو	3	980	عينة 3	9	300	عينة 4	11	680	
العينة الصخرية	الضغط بـ Kbar	درجة الحرارة بـ $^{\circ}\text{C}$												
الغابرو	3	980												
عينة 3	9	300												
عينة 4	11	680												
0.25 0.25 0.25 0.25	استنتاج: - بالنسبة للعينة 3: تحول دينامي، درجة حرارة منخفضة وضغط مرتفع - بالنسبة للعينة 4: تحول دينامي حراري، درجة حرارة مرتفعة وضغط مرتفع الظواهر الجيولوجية المؤدية لتشكل كل من العينتين 3 و 5: - بالنسبة للعينة 3: ظاهرة الطمر (انغراز صخرة الغابرو) - بالنسبة للعينة 5: ظاهرة الاصطدام على إثر تجابه مجالين قاريين	3.ب												
0.5 0.25 0.25	4 - زحف القارة الإفريقية نحو القارة الأوروبية، مصحوبا بطمر القشرة المحيطية تحت القشرة القارية..... - انغلاق المحيط الذي لم يتبقى منه سوى قطع من الأفيوليت الناتجة عن ظاهرة الطفو - تجابه الهامشين القاريين لإفريقيا وأوروبا ← تعرض الصخور لتشوهات تكتونية انضغاطية ← ارتفاع التضاريس ← تشكل سلاسل جبلية.....													

0.25		1	- الأدلة على القوى الانضغاطية التي عرفتھا المنطقة (ذكر دليل واحد على الأقل): وجود تراكبات و سدائم
0.25			- الأدلة على اختفاء محيط قديم (ذكر دليل واحد على الأقل): وجود رواسب بحرية و أوفيوليت
0.25		2	أ-التغيرات التي تطرأ على الصخور :
0.25			عند الانتقال من R_1 إلى R_2 نسجل اختفاء البلاجيوكلاز و ظهور الجاديبيت و البيجاداي.....
0.25			ظروف تشكل الصخرتين R_1 و R_2 :
2 ×			- R_1 : الضغط من 0.45 GPa إلى 1.1 GPa ودرجة الحرارة من 80 °C إلى 480 °C.
0.5			- R_2 : الضغط من 0.8 GPa إلى 1.9 GPa ودرجة الحرارة من 250 °C إلى 540 °C.
0.5		3	ب-تفسير التغيرات العيدانية:
0.5			- عند الانتقال من المجال A إلى المجال C تخضع الصخور لارتفاع كبير في الضغط مقارنة مع ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية ينتج عنها اختفاء البلاجيوكلاز و ظهور الجاديبيت و البيجاداي (يقبل أي تفسير صحيح)
0.25			نمط التحول الذي خضعت له المنطقة : تحول دينامي (أو تحول الطمر).....
0.25		3	مراحل تشكل سلسلة جبال الألب:
x3			- طمر الغلاف الصخري المحيطي تحت الغلاف الصخري القاري نتيجة لقوى انضغاطية (تحول دينامي) ← اختفاء مجال محيطي ← تجابه الهامشين القاريين الإفريقي والأوروبي وتشوه الطبقات الصخرية (سدائم وتراكبات) و تشكل سلسلة جبال الألب.