

### Exercice 1 :

#### ⌚ 1<sup>ère</sup> partie :

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = (2-x)e^{-x} + 1$

- ① - a - Calculer  $g'(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- b - Etudier les variations de la fonction  $g$ .
- ② - En déduire que :  $g(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

#### ⌚ 2<sup>ème</sup> partie :

Soit  $f$  la fonction définie par :  $f(x) = (x-1)e^{-x} + x$ .

- ① - Calculer :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .
- ② - Etudier les variations de  $f$ .
- ③ - a - Etudier les branches infinies de courbe  $(\mathcal{C}_f)$   
b - Etudier les positions relatives de la courbe  $(\mathcal{C}_f)$  et la droite  $(\Delta)$  d'équation  $y = x$ .
- ④ - Tracer  $(\mathcal{C}_f)$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

### Exercice 2 :

#### ⌚ 1<sup>ère</sup> partie :

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = e^x - 2x + 2$

- ① - Calculer  $g'(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- ② - a - Etudier le signe de  $g'(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et en déduire les variations de la fonction  $g$  (le calcul des limites n'est pas demandé).  
b - En déduire que  $g(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

#### ⌚ 2<sup>ème</sup> partie :

Soit  $f$  la fonction définie par :  $f(x) = xe^{-x} + \frac{x}{2} + 1$ .

- ① - a - Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  et interpréter le résultat graphiquement.  
b - Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ f(x) - \left( \frac{1}{2}x + 1 \right) \right]$  et interpréter le résultat graphiquement.  
c - Etudier les positions relatives de la courbe  $(\mathcal{C}_f)$  et la droite  $(\Delta)$  d'équation :

$$y = \frac{1}{2}x + 1.$$

- ② - a - Montrer que :  $f'(x) = \frac{g(x)}{2e^x}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

b - Dresser le tableau de variations de  $f$ .

- ③ - a - Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha$  dans  $]-1; 0[$

b - Déterminer l'équation de la tangente  $(T)$  à la courbe  $(\mathcal{C}_f)$  au point d'abscisse  $0$ .

④ - Calculer  $f''(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , puis déterminer le point d'inflexion de la courbe  $(\mathcal{C}_f)$

⑤ - Tracer  $(\mathcal{C}_f)$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . ( On prends  $e \approx 2,7$  et  $\frac{2}{e^2} \approx 0,27$  ).

## Exercice 3 :

### ① 1<sup>ère</sup> partie :

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = e^x - x$

① - Etudier les variations de la fonction  $g$ .

② - En déduire le signe de  $g(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .

### ② 2<sup>ème</sup> partie :

Soit  $f$  la fonction définie par :  $f(x) = \frac{xe^x - 1}{e^x - 1}$ .

① - a - Déterminer  $D_f$  l'ensemble de définition de la fonction  $f$ .

b - Trouver les limites de  $f$  aux bornes des intervalles de l'ensemble de définition  $D_f$ .

② - a - Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$  et interpréter le résultat graphiquement.

b - Etudier le signe de  $f(x) - x$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

c - En déduire la position relative de la courbe  $(\mathcal{C}_f)$  et la droite  $(\Delta)$  d'équation  $y = x$ .

③ - Calculer  $f'(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , puis dresser le tableau de variations de  $f$ .

④ - Tracer  $(\mathcal{C}_f)$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

## Exercice 4 :

### ① 1<sup>ère</sup> partie :

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = 1 - \frac{x}{2} - \frac{2}{e^x + 1}$ .

① - a - Vérifier que :  $1 - \frac{1}{e^x + 1} = \frac{1}{e^{-x} + 1}$ .

b - Etudier la parité de  $f$  et interpréter les résultats graphiquement.

② - Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ f(x) - \left( 1 - \frac{x}{2} \right) \right]$  et interpréter le résultat graphiquement.

③ - a - Calculer  $f'(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , puis étudier les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}^+$ .

b - En déduire que :  $(\forall x \in \mathbb{R}^+) : 1 - \frac{1}{e^x + 1} \leq \frac{x}{2}$ .

④ - Tracer  $(\mathcal{C}_f)$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

### ② 2<sup>ème</sup> partie :

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :  $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 1 - \frac{1}{e^{u_n} + 1} \end{cases} ; (\forall n \in \mathbb{N})$ .

① - Montrer par récurrence que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n > 0$ .

② - Montrer que  $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_{n+1} \leq \frac{u_n}{2}$  puis en déduire que la suite  $(u_n)$  est décroissante.

③ - Montrer que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n \leq \left( \frac{1}{2} \right)^n$  et déterminer sa limite.