

I. Lois de kepler.

❖ 1^{er} loi de Kepler (1906) : Loi des orbites

Chaque planète décrit une ellipse dont le centre du Soleil occupe un des foyers.

Ellipse dans un plan est un ensemble de points M qui satisfont à la relation : $FM + F'M = 2a$

F et F' deux points constants nommés foyers de l'ellipse

2a : Longueur du grand axe de la trajectoire elliptique

a : est le demi grand axe de la trajectoire elliptique

❖ 2^{eme} loi de Kepler (1906) : Loi des aires



Le segment de droite (rayon) reliant le centre du Soleil S au centre de la planète P balaie des aires égales pendant des durées égales.

Le segment de droite SP balaie des aires proportionnelles aux durées mise pour les balayer

La surface balayée ΔA par le segment SP au cours de son mouvement est proportionnel à la durée du balayage Δt

$$C = \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

C : Constante dépendante des planètes



❖ 3^{eme} loi de Kepler (1618) : Loi des périodes

Le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ entre le carré de la période de révolution et le cube du demi grand axe est constant.

$$\frac{T^2}{a^3} = K_S = C^{te}$$

Avec K_S : une constante pour toutes les planètes gravitantes autour du soleil, $K_S = 2,97 \cdot 10^{-19} \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-3}$

II. Etude du mouvement d'un satellite terrestre .


1. Type de mouvement:

Système : un satellite de masse m, assimilé à un point matériel, situé à une distance du centre de la Terre $R = R_T + h$ et la masse de la terre est M_T

Référentiel : géocentrique supposé galiléen

Bilan des forces : la seule force extérieure qui s'exerce sur le satellite est l'attraction terrestre \vec{F}

- La 2^{eme} loi de Newton appliquée au système étudié s'écrit : $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$
 - L'accélération \vec{a} est **colinéaire à \vec{F}** donc dirigée vers O en tout point de la trajectoire.
 - Le mouvement étant circulaire, on peut utiliser un **repère de Frénet**. \vec{a} étant centripète : $\vec{a}_n = \vec{a}$ et $\vec{a}_u = \vec{0}$
- On a : $a_u = \frac{dv}{dt} = 0$, on en déduit que la vitesse v est constante. Le mouvement est donc **circulaire et uniforme**.



2. Mouvement circulaire uniforme :

❖ **Conditions d'un mouvement circulaire uniforme**

Soit un mobile de masse m et que son centre d'inertie G est animé d'un mouvement circulaire uniforme de rayon r .

- Soit $\sum \vec{F} = \vec{F}$ la somme des forces agissante sur le mobile
- La 2^{eme} loi de Newton $\vec{F} = m \cdot \vec{a}_G$
- On a $\vec{a}_G = \frac{v^2}{r} \cdot \vec{n}$ vu que Le mouvement est uniforme et $a_u = \frac{dv}{dt} = 0$ donc $\vec{F} = m \cdot \frac{v^2}{r} \cdot \vec{n}$

Conclusion :

Pour que le mouvement du centre d'inertie d'un mobile circulaire uniforme il faut que :

- La somme vectorielle des forces soit centrifuge (dirigée vers le centre)
- Le module de la somme vectorielle des forces est constant et vérifie la relation $F = m \cdot \frac{v^2}{r}$

3. Mouvement planétaire des planètes et satellites :


Soit une planète de masse m décrivant un mouvement circulaire uniforme autour d'une autre planète référentielle de masse M (Le soleil par exemple ou autres planètes)
 m en mouvement autour de M : m est le mobile et M est le référentiel

Dans un repère galiléen la planète (m) est soumis à la force gravitationnelle

$$\vec{F} = G \cdot \frac{m \cdot M}{d^2} \cdot \vec{n} = G \cdot \frac{m \cdot M}{r^2} \cdot \vec{n} \text{ avec } d=r : \text{le rayon de la trajectoire}$$

On applique la 2^{eme} loi de Newton sur le repère de Frénet

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G = \vec{F} \text{ et } \vec{F}_{Fn} = 0$$



Sur l'axe \vec{u}

$$F_u = m \cdot a_u = 0 \text{ et } a_u = 0$$

$$\text{D'où } a_u = \frac{dv}{dt} = 0$$

$$V = C^{\text{te}}$$

Le mouvement est donc uniforme

Sur l'axe \vec{n}

$$F_n = m \cdot a_n = G \cdot \frac{m \cdot M}{r^2} \text{ donc } a_n = G \cdot \frac{M}{r^2}$$

Conclusion :

L'accélération de mouvement de la planète mobile (m) :

- Indépendante de sa masse (m)
- Dépend de M la masse de la planète référentielle
- Dépend de la position de (m) par rapport à (M)

$$a_n = G \cdot \frac{M}{r^2} = \frac{V^2}{r}$$

$$r = G \cdot \frac{M}{V^2} = C^{\text{te}}$$

et le mouvement est circulaire

$$V^2 = G \cdot \frac{M}{r} \text{ et } V = \sqrt{G \cdot \frac{M}{r}}$$

Conclusion :

La vitesse de mouvement de la planète mobile (m) :

- Indépendante de sa masse (m)
- Dépend de M la masse de la planète référentielle
- Dépend de la position de (m) par rapport à (M)

Le mouvement est donc circulaire uniforme


* Expression de l'accélération en deux points

Au niveau du sol (position (1)) :

$$a_0 = G \cdot \frac{M}{R^2}$$

A une altitude h du sol (position (2)) :

$$a_h = G \cdot \frac{M}{(R+h)^2}$$



$$a_h = a_0 \cdot \frac{R^2}{(R+h)^2}$$

4. Période de révolution :

La période de révolution, aussi appelée période orbitale, est la durée mise par un astre pour accomplir une révolution complète autour d'un autre astre (par exemple une planète autour du Soleil ou un satellite autour d'une planète).

$$V = \frac{L}{T} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r}{T} = \sqrt{G \cdot \frac{M}{r}} \quad L = 2 \cdot \pi \cdot r : \text{le périmètre du cercle de rayon } r \quad \text{Et on a } \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot r^2}{T^2} = G \cdot \frac{M}{r} \quad \text{d'où } \frac{T^2}{r^3} = \frac{4 \cdot \pi^2}{G \cdot M}$$

On en déduit que $\frac{T^2}{r^3} = K = C^{\text{te}}$ est une constante qui ne dépend que de la masse la planète référentielle et concorde bien avec la 3^{eme} loi de Kepler

$$\text{Et la période de révolution } T \text{ est } T = \sqrt{\frac{4 \cdot \pi^2}{G \cdot M} \cdot r^3} = 2 \cdot \pi \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot M}}$$

5 La satellisation

Lancer un corps dans l'espace avec une vitesse lui permettant de décrire, autour de la terre un mouvement circulaire uniforme et sous le seul effet de la force d'attraction qu'exerce la terre sur lui et se fait en deux étapes :


- Porter le satellite loin de la terre (à une hauteur $h > 200$ km) où la pesanteur est presque nulle (Eviter le frottement fluide)
- Libérer le satellite avec une vitesse \vec{V}_0 normale au rayon R_s de sa trajectoire et de module $v_0 = \sqrt{\frac{G \cdot m_T}{r_T + h}}$

6. Les satellites géostationnaires

Les satellites géostationnaires : des satellites fixes (*stationnaire*) par rapport à la terre (*géo*).

Pour que ce soit le cas, il faut que

- Ils décrivent un **mouvement circulaire uniforme** dans un plan perpendiculaire à l'axe des pôles terrestres. Ils évoluent donc dans un **plan contenant l'équateur**.
- Qu'ils **tournent dans le même sens que la terre** autour de l'axe de ses pôles.
- Leur **période de révolution soit exactement égale à la période de rotation de la terre** autour de l'axe de ces pôles (24h).



On peut calculer l'altitude à laquelle le satellite doit se situer pour satisfaire cette dernière condition :

— Utilisons l'expression de la période à ce satellite :

$$T = 2 \cdot \pi \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot M_T}} \text{ avec } r = r_T + h \text{ donc } T = 2 \cdot \pi \sqrt{\frac{(r_T+h)^3}{G \cdot m_T}} \text{ d'où } r = \sqrt[3]{\frac{G \cdot M_T \cdot T^2}{4 \cdot \pi^2}} = r_T + h \text{ et } h = \sqrt[3]{\frac{G \cdot M_T \cdot T^2}{4 \cdot \pi^2}} - r_T = 36000 \text{ Km}$$

NB :

On peut considérer que $P = F$ et $a_G = g$