

## Série des exercices 1 : Continuité d'une fonction numérique

### Exercice 01 :

Calculer les limites suivantes si elles existent :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 4x^2 - x + 5 \quad ; \quad 2) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 + x - 7$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{4x} \quad ; \quad 4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - x - 2}{x - 1}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 1^+} \left( \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-x^2} \right) \quad ; \quad 6) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 1} - 2x)$$

### Exercice 02 :

Soit  $f$  la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 2}{x^2 - 1} & ; \quad x \neq 2 \\ f(2) = \frac{-1}{3} & \end{cases}$$

Étudier la continuité de  $f$  en  $x_0 = 2$

### Exercice 03 :

On considère la fonction  $g$ , définie par :

$$\begin{cases} g(x) = \frac{x^2 - 1}{1 - 2x} & ; \quad x \geq 0 \\ g(x) = 3 - x^2 & ; \quad x < 0 \end{cases}$$

Étudier la continuité de  $g$  en  $x_0 = 0$

### Exercice 04 :

Justifier la continuité de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle  $I$  :

$$1) f(x) = (x^2 - 5)^4 ; I = \mathbb{R} \quad // \quad 2) f(x) = \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x} ; I = \mathbb{R}^*$$

$$3) f(x) = \left( \frac{3x - 4}{x - 1} \right)^2 ; I = ]1; +\infty[$$

$$4) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} ; I = ]-\infty; 0] \quad / \quad 5) f(x) = \sqrt{x^2 + 3} ; I = \mathbb{R}$$

### Exercice 05 :

$f$  est la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 + x - 3}{x - 1} & ; \quad \text{si } x < 1 \\ \frac{\sqrt{5x - 1} - 2}{x^2 - 1} & ; \quad \text{si } x > 1 \\ \frac{5}{8} & ; \quad \text{si } x = 1 \end{cases}$$

- 1) Montrer que  $f$  est continue à droite en 1.
- 2) Est-ce que  $f$  est continue en 1 ?

### Exercice 06 :

$f$  est la fonction définie sur  $[-1; +\infty[$  par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^3 + 1} - 3}{x - 2} & ; \quad \text{si } x \neq 2 \\ m & ; \quad \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Déterminer la valeur de  $m$  pour que  $f$  soit continue en 2.

### Exercice 07 :

1) Montrer que l'équation  $(E)$  admet au moins une solution dans  $I$ , dans chaque cas :

a.  $(E): x^5 - 2x^3 + x - 4 = 0 ; I = [-1; 2]$

b.  $(E): \sqrt{x^3 + 1} - 2x = 0 ; I = ]0; 1[$

- 2) Montrer que l'équation  $(E)$  admet une unique solution dans  $I$ , dans chaque cas :

a.  $(E): x^3 + 5x = 4 ; I = [-1; 2]$

b.  $(E): x\sqrt{x} + x = 1 ; I = ]0; 1[$

- 3) Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x - 1$$

1. Étudier les variations de  $f$ .
2. Déduisez que l'équation  $f(x) = 0$  admet une solution  $\alpha$  dans  $]2; 3[$ .
3. Déterminer un encadrement de  $\alpha$  d'amplitude 0.25.

### Exercice 08 :

Soit dans  $\mathbb{R}$  l'équation suivante :

$$x^3 - 3x^2 + 1 = 0 \quad (E)$$

- 1) Montrer que l'équation  $(E)$  admet une solution dans l'intervalle  $]-1; 0[$ .
- 2) On pose  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ , pour  $x \in \mathbb{R}$ 
  - a- Calculer  $f(0)$  et  $f(3)$
  - b- Peut-on appliquer le T.V.I sur  $f$  dans  $[0; 3]$  ?
  - c- Calculer  $f(2)$  et en déduire que l'équation  $(E)$  admet deux autres solutions.
- 3) Donner un encadrement d'amplitude 0.5 dans chacune des trois solutions.

### Exercice 09 :

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^+$  par :

$$f(x) = \sqrt{x} + x^2 - 4$$

- 1) Montrer que  $f$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}^+$
- 2) En déduire que  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}^+$  sur lui-même.
- 3) Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $[0; +\infty[$  et que  $1.6 < \alpha < 1.7$

### Exercice 10 :

$g$  est définie sur  $I = [1; +\infty[$  par :  $g(x) = x^2 + 2x - 4$

- 1) Montrer que  $g$  est continue et strictement croissante sur  $I$ .
- 2) En déduire que  $g$  admet une fonction réciproque  $g^{-1}$  définie sur l'intervalle  $J$  à déterminer vers  $I$ .
- 3) Déterminer  $g^{-1}(x)$ ,  $\forall x \in J$ .

### Exercice 11 :

$h$  est définie sur  $]1; +\infty[$  par :  $h(x) = \frac{2x + 3}{x - 1}$

- 1) Montrer que  $h$  admet une fonction réciproque  $h^{-1}$  définie sur l'intervalle  $J$  à déterminer.
- 2) Déterminer  $h^{-1}(x)$ ,  $\forall x \in J$ .