



I. الاشتاق في نقطة الاشتاق على اليمين و اليسار:

01. تعريف (ذكير) :

لتكن f دالة عدية معرفة على مجال مفتوح مرکزه x_0 و $\ell \in \mathbb{R}$ نقول أن : الدالة f قابلة للاشتاق في x_0 إذا كان:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \ell \text{ أو أيضا: } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

02. خاصية:

لتكن f دالة قابلة للاشتاق في x_0 .

- معادلة المماس (T) لمنحنى الدالة f في النقطة التي أقصولها x_0 هي :
- كل دالة قابلة للاشتاق في x_0 تكون متصلة في x_0 . (العكس ليس دائماً صحيحاً).
- تكون f قابلة للاشتاق في x_0 إذا وفقط إذا كان يوجد عدد حقيقي a و توجد دالة ϵ حيث :
- $f'(x_0) = a$. $\lim_{x \rightarrow x_0} \epsilon(x) = 0$ مع $\forall x \in D_f \setminus \{x_0\} f(x) = f(x_0) + a(x - x_0) + (x - x_0)\epsilon(x)$. و في هذه الحالة

03. الدالة التاليفية h بجوار f :

تعريف :

لتكن f دالة قابلة للاشتاق في x_0 .

الدالة h المعرفة بـ $h(x) = (x - x_0)f'(x_0) + f(x_0)$ تسمى الدالة التاليفية المماسة لـ f بجوار x_0 .
نكتب $f(x) \approx h(x)$ (أي h تقريب لـ f بجوار x_0)

04. ملحوظة :

منحنى الدالة h هو المستقيم (T) المماس لمنحنى f في النقطة التي أقصولها x_0

05. نشاط 2 :

لنتعتبر الدالة العدية f للمتغير الحقيقي x المعرفة بما يلي:

1. أدرس اشتاق f على يمين $x_0 = 1$. ثم أنشئ نصف المماس.


2. أدرس اشتاق f على يسار $x_0 = 1$. ثم أنشئ نصف المماس.

3. هل f قابلة للاشتاق في $x_0 = 1$ ؟

4. حدد معادلتي نصف المماس لمنحنى الدالة f على يمين و يسار النقطة ذات الأقصول $x_0 = 1$.

الجواب

طريقة مبانية





ملاحظة: النقطة ذات الأقصول $x_0 = 1$ تسمى نقطة مزواة .

06. تعريف: (الاشتراق على يمين x_0)

لتكن f دالة معرفة على مجال من شكل $[x_0, x_0 + \alpha]$ ($\alpha > 0$)

f قابلة للاشتراق على اليمين في x_0 إذا كان $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell_d = f'_d(x_0) \in \mathbb{R}$

العدد $f'_d(x_0)$ يسمى العدد المشتق على اليمين x_0 لـ f .

07. تعريف: (الاشتراق على يسار x_0)

لتكن f دالة معرفة على مجال من شكل $[x_0 - \alpha, x_0]$ ($\alpha > 0$)

f قابلة للاشتراق على اليسار في x_0 إذا كان $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell_g = f'_g(x_0) \in \mathbb{R}$. العدد $f'_g(x_0)$ يسمى العدد المشتق على اليسار x_0 .

08. خاصية:

تكون f قابلة للاشتراق في x_0 إذا وفقط إذا كانت ما يلي:

- f قابلة للاشتراق على اليمين في x_0 .
- f قابلة للاشتراق على اليسار في x_0 .

العدد المشتق على اليمين يساوي العدد المشتق على اليسار في x_0 . أي $(f'_d(x_0) = f'_g(x_0))$.

09. تمرين تطبيقي :

أدرس اشتراق f في $x_0 = 1$: $f(x) = |x - 1|$ على يمين و على يسار $x_0 = 1$ على اليمين .

II. اشتراق دالة على مجال – الدالة المشتقة الأولى دالة:

01. تعريف:

- إذا كانت الدالة f قابلة للاشتراق في كل نقطة x_0 من $[a, b]$ نقول أن الدالة f قابلة للاشتراق على المجال $[a, b]$.
- دالة عدية قابلة للاشتراق على المجال $[a, b]$ إذا كانت
- الدالة f قابلة للاشتراق على المجال $[a, b]$.
- قابلة للاشتراق على اليمين في a .

02. الدالة المشتقة للدالة:

▪ تعريف:

الدالة التي تربط كل عنصر x_0 من المجال I بالعدد $(f'(x_0))$ تسمى الدالة المشتقة لـ f و نرمز لها بـ f' .

▪ ملحوظة :

- إذا كان : $I = [a, b]$ و $f'(b) = f'_g(b)$ و $f'(a) = f'_d(a)$ و $I = [a, b]$ نصطلح ان :
- مثال : الدالة المشتقة لـ $f(x) = 3x^2$ على \mathbb{R} هي $f'(x) = 6x$.



III. جدول الدوال المشتقة لبعض الدوال الاعتيادية: (الجدول 1)

مجموعة تعريف f'	الدالة المشتقة $f'(x) =$	مجموعة تعريف f	الدالة $f(x) =$	مجموعة تعريف f'	الدالة المشتقة $f'(x) =$	مجموعة تعريف f	الدالة $f(x) =$
$D_{f'} =]0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$D_f = \mathbb{R}^{+*}$	\sqrt{x}	$D_{f'} = \mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$D_f = \mathbb{R}$	a
$D_{f'} = \mathbb{R}$	$-\sin x$	$D_f = \mathbb{R}$	$\cos x$	$D_{f'} = \mathbb{R}$	$f'(x) = 1$	$D_f = \mathbb{R}$	x
$D_{f'} = \mathbb{R}$	$\cos x$	$D_f = \mathbb{R}$	$\sin x$	$D_{f'} = \mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$D_f = \mathbb{R}$	x^n $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$
$\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$ $c \neq 0$	$\frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}{(cx+d)^2}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$ $c \neq 0$	$\frac{ax+b}{cx+d}$	$D_{f'} = \mathbb{R}^*$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$D_f = \mathbb{R}^*$	$f(x) = x^n$ $n \in \mathbb{Z}^* \setminus \{1\}$
$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$1 + \tan^2 x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$\tan x$	$D_{f'} = \mathbb{R}^*$	$f'(x) = \frac{-1}{x^2}$	$D_f = \mathbb{R}^*$	$f(x) = \frac{1}{x}$

IV. العمليات على الدوال المشتقة:

01. خاصيات: (الجدول 2)

لتكن f و g دالتين قابلتين للاشتراق على مجال I.

شرط	مشتقتها	الدالة	شرط	مشتقتها	الدالة
لا تندم g على I	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \times g - f \times g'}{g^2}$	$\frac{f}{g}$		$(f+g)' = f' + g'$	$f+g$
$n \in \mathbb{N}^*$	$(f^n)'(x) = n \times (f(x))^{n-1} \times f'(x)$	f^n	$\alpha \in \mathbb{R}$	$(\alpha \times f)' = \alpha \times f'$	$\alpha \times f$
f و $n \in \mathbb{Z}^{-*}$ لا تندم على I	$(f^n)'(x) = n \times (f(x))^{n-1} \times f'(x)$	f^n		$(f \times g)' = f' \times g + f \times g'$	$f \times g$
موجبة g وقابلة الاشتراق	$(\sqrt{g(x)})' = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$	$\sqrt{g(x)}$	لا تندم على g I	$\left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{-g'}{g^2}$	$\frac{1}{g}$

02. أمثلة: أحسب الدالة المشتقة ' f في الحالات التالية

أ- 1- $f(x) = 1 + (3x+2)^4$ ب- $f(x) = 2x \cos x$ ج- $f(x) = \frac{3x-1}{x^2-1}$ د- $f(x) = -2x^4 + 3x^2$

V. الدالة المشتقة الثانية - المشتقات المتتالية (أو المتتابعة) لدالة f.

1. مفردات :

المشتقة ل f تسمى المشتقة الثانية ل f . نرمز لها ب : $(f'(x))' = f''(x) = f^{(2)}(x)$

إذا كانت $f^{(2)}$ بدورها قابلة للاشتراق على I فدالتها المشتقة $(f^{(2)}(x))' = f^{(3)}(x)$ تسمى المشتقة الثالثة ل f ونرمز لها ب



المشتقة من الرتبة n للدالة f (أي $f^{(n)}(x)$ هي المشتقة لـ $f^{(n-1)}(x)$) ونرمز لها بـ:

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$$

3. مثال:

أحسب $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$ حيث : أ - $f(x) = x^5$ ب - $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ج - بين أن :

مشتقة مركب دالتي - مشتقة الدالة العكسية VI.

01. مشتقة مركب دالتي :
(1) مبرهنة 1 :

إذا كانت f قابلة للاشتراق في x_0 و $g \circ f$ قابلة للاشتراق في x_0 .

$$\text{و لدينا: } (g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \times f'(x_0).$$

(2) مبرهنة 2 :

لتكن f و g دالتي قابلتين للاشتراق على I و (I) على التوالي

إذا كان x_0 عنصرا من I و كانت f قابلة للاشتراق على I و $g \circ f$ قابلة للاشتراق على I .

$$\text{و لدينا: } \forall x \in I : (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \times f'(x).$$

(3) نتائج : (الجدول 3)

مجموعة تعريف f'	الدالة المشتقة $f'(x) =$	مجموعة تعريف f	الدالة $f(x) =$	مجموعة تعريف f'	الدالة المشتقة $f'(x) =$	مجموعة تعريف f	الدالة $f(x) =$
$D_{f'} = \mathbb{R}$	$-a \times \sin(ax + b)$	$D_f = \mathbb{R}$	$\cos(ax + b)$	$x \in D_{g'}$ $g(x) > 0$	$\frac{g'(x)}{2 \times \sqrt{g(x)}}$	$x \in D_g$ $g(x) \geq 0$	$\sqrt{g(x)}$
$ax + b \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$a \times [1 + \tan^2(ax + b)]$	$ax + b \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$\tan(ax + b)$	$D_{f'} = \mathbb{R}$	$a \times \cos(ax + b)$	$D_f = \mathbb{R}$	$\sin(ax + b)$

(4) مثال:

$$f'(x) = (\sqrt{x^2 - x})' = \frac{(x^2 - x)'}{2\sqrt{x^2 - x}} = \frac{2x - 1}{2\sqrt{x^2 - x}} \text{ . جواب : } f(x) = \sqrt{x^2 - x}$$

$$f'(x) = (\cos(2x - 4))' = (2x - 4)' \cos'(2x - 4) = -2x \sin(2x - 4) \text{ . جواب : } f(x) = \cos(2x - 4)$$

02. مشتقة الدالة العكسية



(1) مبرهنة 1 :

لتكن f متصلة و رتيبة قطعا على I (لأن الدالة f تقابل من المجال I إلى المجال $J = f(I)$).
إذا كانت f قابلة للاشتراق في x_0 و $f'(x_0) \neq 0$ فإن الدالة العكسية f^{-1} قابلة للاشتراق في $y_0 = f(x_0)$

$$\cdot (f^{-1})'(y_0) = (f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(x_0)} \text{ لدينا:}$$

(2) برهان :

يمكن f متصلة على I إذن دالتها العكسية f^{-1} متصلة على $J = f(I)$ و منه لكل y_0 من J لدينا $y_0 = f(x_0)$ مع x_0 من I . نضع $x = f^{-1}(y_0)$. لدينا:

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} &= \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{1}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)} \in \mathbb{R} ; (f'(x_0) \neq 0) \\ &= \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} ; (f^{-1}(y_0) = x_0) \\ &= \frac{1}{f' \circ f^{-1}(y_0)} \end{aligned}$$

خلاصة : f^{-1} قابلة للاشتراق في $f(x_0) = y_0$ من $J = f(I)$ حيث :

(3) مبرهنة 2 :

لتكن f دالة تقابل من المجال I إلى المجال $J = f(I)$.
إذا كانت f قابلة للاشتراق على I و دالتها المشتقة f' لا تتعدم على I (أي $f'(x) \neq 0 \forall x \in I$) فإن الدالة f^{-1} قابلة للاشتراق المجال $J = f(I)$. لدينا:

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

(4) تطبيق 1 : مشتقة: $\sqrt[n]{x}$ و x^r و $g(x) = [f(x)]^r$. (الجدول 4)

f قابلة للاشتراق على I و f موجبة قطعا و قابلة للاشتراق على I

g قابلة للاشتراق على $[0, +\infty)$

$$g'(x) = \left((x)^{\frac{1}{n}} \right)' = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$$

$$g(x) = \sqrt[n]{x}$$

$$g'(x) = (x^r)' = rx^{r-1}$$

$$g(x) = x^r$$

$$g'(x) = \frac{1}{n} \times f'(x) \times (f(x))^{\frac{1}{n}-1}$$

$$g(x) = \sqrt[n]{f(x)}$$

$$g'(x) = ([f(x)]^r)' = r \times f'(x) \times [f(x)]^{r-1}$$

$$g(x) = [f(x)]^r$$



أمثلة: أحسب f' مع:

$$f(x) = \sqrt[5]{(x^2 + 1)^7} \quad .f(x) = \sqrt[5]{x^2 + 1} \quad .f(x) = \sqrt[5]{x}$$

جواب:

$$\left[f(x) = \sqrt[5]{x} \right]' = \left[x^{\frac{1}{5}} \right]' = \frac{1}{5} x^{\frac{1}{5}-1} = \frac{1}{5} x^{\frac{-4}{5}} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{\sqrt[5]{x^4}}$$

$$\left[f(x) = \sqrt[5]{(x^2 + 1)^7} \right]' = \left[(x^2 + 1)^{\frac{7}{5}} \right]' = \frac{1}{5} (x^2 + 1)^{\frac{1}{5}-1} (x^2 + 1)^{\frac{7}{5}} = \frac{14}{7} x (x^2 + 1)^{\frac{4}{5}} = \frac{14}{7} x \sqrt[5]{(x^2 + 1)^4}$$

$$\left[f(x) = \sqrt[5]{(x^2 + 1)^7} \right]' = \left[(x^2 + 1)^{\frac{7}{5}} \right]' = \frac{7}{5} (x^2 + 1)^{\frac{7}{5}-1} (x^2 + 1)^{\frac{7}{5}} = \frac{14}{7} x (x^2 + 1)^{\frac{2}{5}} = \frac{14}{7} x \sqrt[5]{(x^2 + 1)^2}$$

تطبيقات الدالة المشتقة : VII

مطابق دالة عددي قابلة للاشتراق.

A

نشاط:

1


المنحنى الآتي يمثل دالة قابلة للاشتراق على مجال مفتوح I . a عنصر من I .

(1) هل f تقبل مطابق في a ؟

(2) أعط قيمة $f'(a)$. ثم أعط الخاصية.

خاصية:


2



f دالة قابلة للاشتراق على مجال مفتوح I . a عنصر من I .

إذا كانت f قابلة للاشتراق في النقطة a و تقبل مطابق في النقطة a فإن $f'(a) = 0$.

الدالة $f(x) = 2x^3$



ملحوظة: إذا كان $f'(a) = 0$ فهذا لا يعني بالضرورة أن f مطابق للدالة f .

مثال:

4

لدينا: $f(x) = 6x^2$ ومنه: $f'(0) = 0$. ولكن f ليس مطابق لـ f .

خاصية:

5

f دالة قابلة للاشتراق على مجال مفتوح I . a عنصر من I .

إذا كانت f تتعذر في النقطة a و تغير إشارتها بجوار a فإن f مطابق لـ f .

B. إشارة المشتقة الأولى و رتابة دالة:

خاصية:

1

f دالة قابلة للاشتراق على مجال I .

إذا كانت $f'(x) > 0 \forall x \in I$ فإن f تزايدية قطعا على I . (يمكن للدالة f أن تتعذر في بعض النقاط المنعزلة من I وهذا لا يؤثر على رتابة f)


إذا كان $f'(x) < 0 \forall x \in I$ فإن f تنافصية قطعا على I . (نفس الشيء يمكن للدالة f أن تتعذر في بعض النقاط المنعزلة من I)

إذا كان $f'(x) = 0 \forall x \in I$ (على I بكماله) فإن f ثابتة على I .

مثال:

2

أدرس تغيرات f على \mathbb{R} مع $f(x) = (2x+4)^2$.



- هل الدالة f تقبل مطraf .
جواب :

- ندرس تغيرات الدالة f
(1) حساب f' :
لدينا:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \left[(2x+6)^4 \right]' \\
 &= 4(2x+6)'(2x+6)^3 \\
 &= 4 \times 2(2x+6)^3 \\
 &= 8(2x+6)^3
 \end{aligned}$$

(2) إشارة f' :

إشارة f' هي إشارة $2x+6$
و منه :

$$f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 2x+6 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x \geq -3$$

اذن : f' موجبة على $[-3, +\infty)$ و سالبة على $[-\infty, -3]$ ومنه جدول تغيرات f .

(3) تغيرات الدالة f بواسطة الجدول التالي :

$$\text{لدينا : } \lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{|x| \rightarrow \infty} (2x+6)^4 = \lim_{|x| \rightarrow \infty} (2x)^4 = +\infty$$

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
f'	$+\infty$		$+\infty$
f	\searrow	\nearrow	

$f(-3) = 0$

- مطاريف الدالة f :

من خلال جدول تغيرات الدالة f نستنتج أن الدالة f تقبل قيمة دنبا في النقطة التي أقصولها $-3 = x_0$