



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا  
الدورة العادية 2009  
عناصر الإجابة

المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتعليم العالي  
وتكوين الأطر  
والبحث العلمي  
المركز الوطني لتتقويم والامتحانات



C:NR32

7	المعامل:	علوم الحياة والأرض	المادة:
3	مدة الإنجاز:	شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض	الشعب (ة) أو المسلك:

رقم السؤال	التمرين الأول (4 نقط)	سليم التتقيط
	عناصر الإجابة	
0.5	- تعريف الاستجابة المناعية ذات المسلك الخلطي: استجابة مناعية نوعية تتدخل فيها اللفوايات B المفروزة لمضادات الأجسام بعد تفريقها إلى بلزيمات.....	
0.5	- تعريف الاستجابة المناعية ذات المسلك الخلوي: استجابة مناعية نوعية تتدخل فيها اللفوايات T8 التي تتفرق إلى لفاويات قاتلة Tc. ( قبول كل تعريف صحيح ) .....	
0.5	- مصدر ومكان نضج اللفاويات: تنتمي LT4 إلى صنف اللفاويات T وهي لفاويات تنتج على مستوى النخاع العظمي وتكتسب كفايتها المناعية على مستوى الغدة السعترية. ....	
1	آلية تدخل اللفاويات T4 خلال مرحلتي الحث والتضخيم من الاستجابة المناعية: - خلال مرحلة الحث أو التحريض: تتعرف T4 على المحددات المستضادية المعروضة بواسطة CMHII من طرف الخلية العارضة CPA (التعرف الثنائي) يتدخل في هذا التعرف المستقبل T وهي جزيئة غشائية خاصة باللفوايات T ومستقبل CD4 المميز للفاويات T4. يؤدي هذا التعرف إلى تنشيط LT4 بواسطة أنترلوكينات تفرزها CPA. ....	
0.75	- خلال مرحلة التضخيم: بعد تنشيطها تتكاثر LT4 وتتفرق إلى لفاويات T مساعدة (LTh). + في حالة الاستجابة الخلطية، تفرز اللفاويات T المساعدة IL2 (وأنترلوكينات أخرى) والتي تؤثر على اللفاويات B النوعية لمولد المضاد فتتنشط تكاثرها وتفرقها إلى بلزيمات. ....	
0.75	+ في حالة الاستجابة الخلوية، تؤثر اللفاويات T المساعدة بواسطة IL2 (وأنترلوكينات أخرى) على اللفاويات T8 النوعية لمولد المضاد فتتنشط تكاثرها وتفرقها إلى لفاويات قاتلة TC. ....	
	التمرين الثاني (4 نقط)	
1	- الألياف العضلية من الصنف A: تتميز بقطر صغير وتتوفر على عدد كبير من الميتوكوندريات ومحاطة بعدد مهم من العروق الدموية..... - الألياف العضلية من الصنف B: تتميز بقطر كبير وتتوفر على عدد قليل من الميتوكوندريات ومحاطة بعروق دموية قليلة. ....	
2	هناك مسلكان لهدم الكليكويز على مستوى الليف العضلي: المسلك ( أ ) : مسلك لا هوائي (بدون استهلاك O <sub>2</sub> ) ويؤدي إلى تكون الحمض اللبني وإنتاج كمية قليلة من ATP. يتدخل في هذا المسلك الأنزيم F..... المسلك (ب): مسلك هوائي (باستهلاك O <sub>2</sub> ) يتم خلاله هدم كلي للكليكويز عبر تفاعلات دورة Krebs والتأكسيدات التنفسية على مستوى الميتوكوندري المرتبطة باستهلاك الأوكسجين الذي يعتبر المتقبل النهائي للإلكترونات. يؤدي هذا المسلك إلى تكون الماء و CO <sub>2</sub> وإنتاج كمية كبيرة من ATP. يتدخل في هذا المسلك الأنزيم E.....	
3	تفسير الاختلاف الملاحظ بين العدائين:	

1	<p>- تتوفر عضلات عدائي المسافات الطويلة على عدد كبير من الألياف العضلية من الصنف A المتميزة بتوفرها على عدد كبير من الميتوكوندريات ومحاطة بعدد مهم من العروق الدموية والغنية بالخضاب العضلي. تتوفر هذه الخلايا على الأنزيم E المتدخل في المسلك (ب)، مما يجعلها تعتمد أساسا في نشاطها المعتدل والطويل على ATP المنتجة أثناء الهدم الكلي للكلبيكوز الدموي.</p> <p>- تتوفر عضلات عدائي المسافات القصيرة على عدد كبير من الألياف العضلية من الصنف B المتميزة بتوفرها على عدد قليل من الميتوكوندريات والمحاطة بعدد قليل من العروق الدموية. تتميز هذه الخلايا بتوفرها على كمية مهمة من الغليكوجين والأنزيم F مما يجعلها تعتمد بالأساس في نشاطها القوي والسريع على ATP المنتجة خلال الانحلال اللاهوائي للكلبيكوز باستعمال مدخرات الغليكوجين الذي يتم هدمه ليعطي الكلبيكوز ثم الحمض البيروفيك والحمض اللبني.</p>	1										
التمرين الثالث (9 نقط)												
1	<p>- تمثيل دورة صبغية صحيحة باستعمال رموز سليمة تتضمن:</p> <p>طور ثاني الصبغية الصبغية.</p> <p>طور أحادي الصبغية الصبغية</p> <p>موقع كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب.....</p> <p>- يمثل الطور الثنائي الصبغية الصبغية في نبات الطماطم وهو الطور السائد في دورة حياة نبات الطماطم، بينما يختزل الطور أحادي الصبغية الصبغية في شكل الأمشاج على مستوى النبات المشيجي الذكري والأنثوي.....</p>	0,5										
2	<p>- الانتقاء المنجز فعل ويمكن من تحسين المردودية:</p> <p>- أفراد الجماعة P2 أقل تشتتا بالمقارنة مع أفراد الجماعة P1: للجماعة P2 انحراف معياري أصغر من الجماعة P1.</p> <p>اختفاء ثمار ذات قطر صغير 20mm-30mm بعد الانتقاء.....</p> <p>- مضلع ترددات الجماعة P2 له منوال أكبر من منوال الجماعة P1.</p> <p>- للجماعة P2 معدل الحسابي أكبر من الجماعة P1.</p>	0,25 0,75 0,25 0,25										
3	<p><b>التزاوج الأول:</b></p> <p>- يتعلق الأمر بهجونة ثنائية: صفة قد ثمار الطماطم وصفة نضج الثمار.</p> <p>- تم تزاوج نباتات متشابهة الاقتران بالنسبة للمورثتين مع نباتات مختلفة الاقتران بالنسبة للمورثتين. أعطى هذا التزاوج أربعة مظاهر خارجية بنسب متساوية.</p> <p>تنطبق هذه النتائج مع القانون الثالث لماندل : المورثتان المدروستان مستقلتان.</p> <p>النمط الوراثي للأبوين: (P<sub>1</sub>) g//g R//R (P<sub>2</sub>) G//g R//I ×</p> <p>يعطي P<sub>1</sub> نمطا واحدا من الأمشاج : g/ R/</p> <p>يعطي P<sub>2</sub> أربعة أنماط من الأمشاج: g/ I/ و g/ R/ و G/ I/ و G/ R/.....</p> <p><b>شبكة التزاوج</b></p> <table><tr><td>أمشاج P2 P1</td><td>G/ R/ 25%</td><td>G/ I/ 25%</td><td>g/ R/ 25%</td><td>g/ I/ 25%</td></tr><tr><td>g/ R/ 100%</td><td>G//g R//R [GR] 25%</td><td>G//g R//I [GRI] 25%</td><td>g//g R//R [gR] 25%</td><td>g//g R//I [gRI] 25%</td></tr></table> <p>تنطبق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية.</p> <p><b>التزاوج الثاني:</b></p> <p>الأنماط الوراثية للنباتات التي تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج بطيء: g//g R//I × g//g R//I</p>	أمشاج P2 P1	G/ R/ 25%	G/ I/ 25%	g/ R/ 25%	g/ I/ 25%	g/ R/ 100%	G//g R//R [GR] 25%	G//g R//I [GRI] 25%	g//g R//R [gR] 25%	g//g R//I [gRI] 25%	0,75 0,75
أمشاج P2 P1	G/ R/ 25%	G/ I/ 25%	g/ R/ 25%	g/ I/ 25%								
g/ R/ 100%	G//g R//R [GR] 25%	G//g R//I [GRI] 25%	g//g R//R [gR] 25%	g//g R//I [gRI] 25%								

0.5

تعطي هذه النباتات نوعين من الأمشاج:  $g/R$  و  $g/I$  .....  
شبكة التزاوج

$\begin{matrix} \text{♂} \\ \text{♀} \end{matrix}$	$g/R/50\%$	$g/I/50\%$
$g/R/50\%$	$g/g R/R$	$g/g R/I$
$g/I/50\%$	$g/g R/I$	$g/g I/I$

0.75

- 25% نباتات طماطم تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج سريع  $[gR]$   
- 50% نباتات طماطم تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج بطيء  $[gRI]$   
- 25% نباتات طماطم تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج مكبوح  $[gI]$   
تتطابق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية المحصل عليها في التزاوج الثاني.  
- للحصول على 100% من نباتات طماطم تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج بطيء نخضع لنباتات طماطم تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج بطيء سريع  $(g/g R/R)$  مع نباتات طماطم كبيرة القد وذات نضج مكبوح  $(g/g I/I)$ .  
0.5

1

4 - تتميز ثمار الطماطم غير الناضجة بنشاط ضعيف لأنزيم ACC synthase وبنيشاط أقل لأنزيم ACC oxydase بالمقارنة مع ثمار الطماطم الناضجة. يحفز هذان الأنزيمان بالتتالي تحول S-Adényl-Méthionine إلى إيثيلين. إذن ينتج نضج الطماطم عن تركيب كميات مهمة من الإيثيلين إثر زيادة نشاط الأنزيمين ACC synthase و ACC oxydase اللذين يحفزان التفاعلات المؤدية إلى تركيبه.

1

5 تسمح تقنيات الهندسة الوراثية من الحصول على ARNm معكوس متكامل مع ARNm عادي الذي يحمل رسالة تركيب أنزيم ACC synthase. يؤدي هذا التكامل بين ARNm المعكوس و ARNm العادي إلى منع عملية الترجمة في مستوى الريبوزومات وبالتالي عدم تركيب ACC synthase. ينتج عن غياب هذا الأنزيم عدم تركيب الإيثيلين وبالتالي عدم نضج ثمار الطماطم بسرعة (تبقى الثمار خضراء) مما يجعلها قابلة للتخزين.

### التمرين الرابع (3 نقط)

0.5

1 تتوفر الصخرة M1 على معادن البروكسين والكلوكوفان والبلاجيوكلاز. مجال التجمعات المعدنية الذي يطابق هذه الصخرة هو المجال C.

0.5

تتوفر الصخرة M2 على معادن البيجادي والجدييت. مجال التجمعات المعدنية الذي يطابق هذه الصخرة هو المجال E

0.5

2 تشكلت الصخرة M1 في عمق يتراوح ما بين 15 و 35 Km وتحت درجة حرارة أقل من  $450^{\circ}\text{C}$

0.5

تتميز هذه الصخرة بكثافة تتراوح ما بين 2.8 و 3 .....  
تشكلت الصخرة M2 في عمق يفوق 30 Km و درجة حرارة تتراوح ما بين  $250^{\circ}\text{C}$  و  $550^{\circ}\text{C}$  تقريبا  
تتميز هذه الصخرة بكثافة مرتفعة (أكثر من 3).  
عند انغراز القشرة المحيطية تتعرض الصخور للتحول، فتمر الصخرة M1 من المجال C ذي درجة حرارة وضغط منخفضين إلى المجال E ذي ضغط ودرجة حرارة مرتفعين، مصحوب بارتفاع الكثافة. تشهد هذه التحولات المعدنية والكثافة عن وجود طمر قديم.

1