



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2009
عناصر الإجابة

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي
وتكوين الأطر
والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات



C:RR32

المعامل: 7

مدة الإنجاز: 3

المادة: علوم الحياة والأرض

الشعب(ة) أو المسلك : شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض

رقم السؤال	عناصر الإجابة	سليم التنقيط
	التمرين الأول (4 ن)	
	- تعريف الأناتيكيتية والتحول: تعريف الأناتيكيتية: انصهار جزئي لصخور سابقة الوجود عند خضوعها لارتفاع درجة الحرارة والضغط إثر غورها في العمق..... تعريف التحول: تغير في الحالة الصلبة للمعادن المكونة لصخرة ما تحت تأثير تغيرات ظروف الضغط ودرجة الحرارة..... - ظروف تكون كل من الكرانيت الأناتيكيتي والكرانيت الانداساسي ظروف تكون الكرانيت الأناتيكيتي: تحت تأثير الارتفاع المتزامن للضغط ودرجة الحرارة، تخضع الصخور للتحول . عند توفر ظروف الانصهار الجزئي (الأناتيكيتية)، تخضع الصخور المتحولة لانصهار جزئي مشكلة خليطا من صخور متحولة وأجزاء منصهرة تعطي بعد تبريدها وتبلورها مادة كرانيتية حديثة التكون تبقى مرتبطة بالصخور المتحولة..... ظروف تكون الكرانيت الانداساسي: مع زيادة السائل الناتج عن الانصهار الجزئي، تحت تأثير تزايد ارتفاع درجة الحرارة والضغط، تتجمع القطرات الصهارية مكونة كتلا من المادة المنصهرة التي تندفع إلى الأعلى بين الصخور المحيطة عبر التمددات والتشققات مكونة كتلا اندساسية تتبرد وتتصلب قبل الوصول إلى السطح فتشكل الكرانيت الانداساسي..... علاقة الكرانيت الانداساسي بالصخور المتحولة المجاورة: تحدث الصهارة الكرانيتية الصاعدة ذات درجة حرارة مرتفعة تغيرات بنيوية وبيدانية، في الصخور المجاورة فتصبح هذه الأخيرة متحولة مشكلة هالة تحول. يدعى هذا التحول بالتحول الحراري أو تحول التماس.....	0.5 0.5 1 1 1
	التمرين الثاني (6 نقط)	
1	- تفسير السلسلة التجريبية الأولى: • تفسير نتائج التزاوجين الأول والثاني: يتعلق الأمر بهجونة ثنائية: انتقال صفتي لون الجسم ولون العيون. الجيل F_1 مكون من أفراد ذوي مظهر متوحش بجسم مخطط وعيون بُنية. إذن القانون الأول لـ Mendel قد تحقق (قانون تجانس هجناء الجيل الأول): الحليل المسؤول عن الجسم المخطط سائد (نرمز له بـ bl^+) على الحليل المسؤول عن اللون الأسود (نرمز له بـ bl)، والحليل المسؤول عن لون العيون البنية سائد (نرمز له بـ cd^+) على الحليل المسؤول عن لون العيون الحمراء (نرمز له بـ cd)..... أعطى التزاوج الثاني (التزاوج الاختباري) جيلا F_2 بمظاهر خارجية أبوية وجديدة التركيب بنسب مختلفة: نسب المظاهر الخارجية جديدة التركيب ضعيفة بالمقارنة مع نسب المظاهر الخارجية الأبوية، مما يدل على عدم تحقق القانون الثالث لـ Mendel (قانون استقلالية أزواج الحليلات). إذن المورثتان مرتبطتان. يعود ظهور الأنماط الجديدة التركيب إلى حدوث ظاهرة العبور عند الإناث أثناء تشكل الأمشاج.....	0,5 0,5

• التزاوج الأول:

الأنماط الوراثية للأباء: $bl\ cd // bl\ cd$ × $bl^+ cd^+ // bl^+ cd^+$
المظاهر الخارجية: $[bl, cd]$ × $[bl^+, cd^+]$
الأمشاج: $bl\ cd / ; 100\%$ × $bl^+ cd^+ / ; 100\%$

F₁ أفراد

النمط الوراثي
المظهر الخارجي

0,5

التزاوج الاختباري:
الأنماط الوراثية: $bl^+ cd^+ // bl\ cd$ × $bl\ cd // bl\ cd$
المظاهر الخارجية: $[bl^+, cd^+]$ × $[bl, cd]$
الأمشاج: $bl^+ cd^+ / ; bl^+ cd / ; bl\ cd^+ / ; bl\ cd /$ × $bl\ cd / (100\%)$

شبكة التزاوج:

F ₁ \ P ₁	$bl^+ cd^+ /$ 45.5%	$bl^+ cd /$ 4.5%	$bl\ cd^+ /$ 4.5%	$bl\ cd /$ 45.5%
$bl\ cd /$ 100 %	$bl^+ cd^+ // bl\ cd$ 45,5 %	$bl^+ cd // bl\ cd$ 4,5 %	$bl\ cd^+ // bl\ cd$ 4,5 %	$bl\ cd // bl\ cd$ 45,5 %

0,5

تفسير السلسلة التجريبية الثانية:

- نتائج التزاوجين الأول والثاني:

يتعلق الأمر بهجونة ثنائية: انتقال صفتي لون الجسم ولون العيون.

- تجانس هجناء الجيل F₁ ، إذن القانون الأول - Mendel قد تحقق: التحليل المسؤول عن الأجنحة بعروق مستعرضة سائد (نرمز له بـ n+) على التحليل المسؤول عن الأجنحة بدون عروق مستعرضة (نرمز له بـ n)، والتحليل المسؤول عن لون العيون البنية سائد (نرمز له بـ cd+) على التحليل المسؤول عن لون العيون الحمراء (نرمز له بـ cd).

0,5

- أعطى التزاوج الثاني (التزاوج الاختباري) جيلا F₂' بمظاهر خارجية أبوية وجديدة التركيب بنسب متساوية (نسب المظاهر الخارجية جديدة التركيب مماثلة لنسب المظاهر الخارجية الأبوية)، مما يدل على تحقق القانون الثالث لماندل (قانون استقلالية أزواج الحليلات). إذن المورثتان مستقلتان.

0,5

يظهر أن المظاهر الخارجية عند أفراد الجيل F₂' غير متجانسة بين الجنسين فيما يخص صفة شكل الأجنحة: جميع الذكور بأجنحة بدون عروق مستعرضة وجميع الإناث بأجنحة ذات عروق مستعرضة، مما يدل على أن هذه الصفة مرتبطة بالجنس (محمولة على الصبغي x).

0,5

شبكة التزاوج الأول:

الأنماط الوراثية للأباء: $cd^+ // cd^+ ; X_{n+} X_{n+}$ ♀ × $cd // cd ; X_n Y$ ♂
المظاهر الخارجية: $[cd^+, n^+]$ × $[cd, n]$
الأمشاج: $cd^+ / X_{n+} 100\%$ × $cd / X_n 50\%$ × $cd / Y 50\%$

	F₁ أفراد <table><tr><td> ♂ ♀ </td><td>cd / X_n (50%)</td><td>cd / Y (50%)</td></tr><tr><td>cd⁺ / X_{n+} (100%)</td><td>cd⁺//cd ; X_{n+}X_n [cd⁺, n⁺]♀</td><td>cd⁺//cd ; X_{n+}Y [cd⁺,n+] ♂</td></tr></table> [cd⁺, n⁺] من الأفراد 100% على شبكة التزاوج الثاني: الآباء: النمط الوراثي: المظهر الخارجي: أمشاج: cd / X_n cd⁺ / X_{n+} ; cd / X_{n+} ; cd⁺ / Y ; cd / Y شبكة التزاوج: <table><tr><td> ♂ ♀ </td><td>cd⁺ / X_{n+} 25%</td><td>cd / X_{n+} 25%</td><td>cd⁺ / Y 25%</td><td>cd / Y 25%</td></tr><tr><td>cd / X_n 100 %</td><td>cd⁺//cd ; X_{n+}X_n ♀ [cd⁺, n⁺] 25%</td><td>cd//cd ; X_{n+}X_n ♀ [cd, n⁺] 25%</td><td>cd⁺//cd ; X_nY ♂ [cd+, n] 25%</td><td>cd//cd ; X_nY ♂ [cd, n] 25%</td></tr></table>	♂ ♀	cd / X _n (50%)	cd / Y (50%)	cd ⁺ / X _{n+} (100%)	cd ⁺ //cd ; X _{n+} X _n [cd ⁺ , n ⁺]♀	cd ⁺ //cd ; X _{n+} Y [cd ⁺ ,n+] ♂	♂ ♀	cd ⁺ / X _{n+} 25%	cd / X _{n+} 25%	cd ⁺ / Y 25%	cd / Y 25%	cd / X _n 100 %	cd ⁺ //cd ; X _{n+} X _n ♀ [cd ⁺ , n ⁺] 25%	cd//cd ; X _{n+} X _n ♀ [cd, n ⁺] 25%	cd ⁺ //cd ; X _n Y ♂ [cd+, n] 25%	cd//cd ; X _n Y ♂ [cd, n] 25%	
♂ ♀	cd / X _n (50%)	cd / Y (50%)																
cd ⁺ / X _{n+} (100%)	cd ⁺ //cd ; X _{n+} X _n [cd ⁺ , n ⁺]♀	cd ⁺ //cd ; X _{n+} Y [cd ⁺ ,n+] ♂																
♂ ♀	cd ⁺ / X _{n+} 25%	cd / X _{n+} 25%	cd ⁺ / Y 25%	cd / Y 25%														
cd / X _n 100 %	cd ⁺ //cd ; X _{n+} X _n ♀ [cd ⁺ , n ⁺] 25%	cd//cd ; X _{n+} X _n ♀ [cd, n ⁺] 25%	cd ⁺ //cd ; X _n Y ♂ [cd+, n] 25%	cd//cd ; X _n Y ♂ [cd, n] 25%														
0,5																		
1																		
2	وجود توافق بين معطيات الوثيقتين 1 و 2 والتفسير الصبغي للنتائج المحصلة: - المورثتان المسؤولتان عن لون الجسم ولون العيون مرتبطتان ومتوضعتان على صبغي لا جنسي (الصبغي 2)؛ - نسبة التركيبات الجديدة (9%) مطابقة للمسافة الملاحظة في الوثيقة 1 (9cMg) ؛ - المظاهر الجديدة التركيب ناتجة عن تخطيط ضمصبغي الذي تجسده ظاهرة العبور الممتلئة في الوثيقة 2؛ - المورثة المسؤولة عن شكل الأجنحة مستقلة عن المورثتين السابقتين ومت موضعة على الصبغي الجنسي X.	2																
التمرين الثالث (3 نقط)																		
1	- يلاحظ، في منطقة Birmingham المميزة بأشجار ذات جذوع داكنة، ارتفاع نسبة الفراشات الداكنة وانخفاض نسبة الفراشات الفاتحة من بين الفراشات المصطادة بالمقارنة مع الفراشات المحررة، والعكس بالنسبة لمنطقة Dorset المميزة بأشجار ذات جذوع فاتحة. - هناك علاقة بين لون الفراشات ولون جذوع الأشجار: الفراشات ذات الشكل الميلاني أكثر تكيفا مع المناطق التي بها أشجار داكنة والفراشات ذات الشكل الفاتح أكثر تكيفا مع المناطق التي بها أشجار فاتحة.	1																
2	- يبين جدول الوثيقة 2 أن عدد الفراشات المصطادة من طرف طائر أبي الحناء (الخاضعة للانتقاء الطبيعي) تختلف حسب المناطق: - في منطقة Dorset المميزة بأشجار فاتحة تكون الفراشات الداكنة الأكثر تعرضا للاقتراس، وفي منطقة Birmingham تكون الفراشات الفاتحة الأكثر تعرضا للاقتراس. - تبرز الوثيقة 3 أنه بعد تطبيق القانون يلاحظ تناسب انخفاض تردد الشكل الميلاني (الداكن: متشابهة الاقتران c⁺//c⁺ أو مختلفة الاقتران c⁺//c) مع انخفاض تردد الحليل c⁺. كما أن ارتفاع تردد الشكل الفاتح (متشابهة الاقتران c//c) يتناسب مع ارتفاع تردد الحليل c. يعود هذا التناسب إلى خضوع الفراشات لانتقاء طبيعي بحيث، خضعت الفراشات الداكنة للاقتراس أكثر من الفراشات الفاتحة، مما قلص من تردد الحليل c⁺ ورفع من تردد الحليل c.	2																

التمرين الرابع (3 نقط)

1	– خلال التجربة الشاهدة: - تنقلص العضلة طيلة مدة التهيج لتوفرها على الطاقة (ATP) اللازمة لهذا النقل؛ - تتجدد هذه (ATP) عن طريق حلمة الكليوجين وتحوّل إلى كليكوز الذي يتعرض لسلسلة من التفاعلات المحررة لـ (ATP) مما يفسر ثبات كمية هذه الأخيرة؛ – بعد حقن oligomycin: تتوقف العضلة عن النقل نتيجة نفاذ (ATP) التي تُستهلك ولا تتجدد. وهذا راجع لعدم تحويل الغليوجين نتيجة توقف التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة به مما يفسر ثبات كميته.	1
0.75	أكسدة R'H₂ مع تركيب ATP: - تفاعل أكسدة R'H₂: $R'H_2 \longrightarrow R' + 2H^+ + 2e^-$ - تركيب ATP: $ADP + Pi \xrightarrow{ATP\ synthetase} ATP$ تتم هذه التفاعلات بوجود O₂ المتقبل النهائي للإلكترونات والبروتونات وفق التفاعل التالي: $\frac{1}{2} O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2O$	2
1.25	يلخص الشكل (أ) من الوثيقة 3 أهم التفاعلات التي تتم في الحالة العادية على مستوى الغشاء الداخلي للمتكوندري عند تركيب ATP. حسب الشكل (ب): يمنع المضاد الحيوي oligomycin تدفق أيونات H⁺ من الحيز البيغشائي إلى الماتريس ← عدم الحصول على الطاقة التي يتم تحريرها عادة عند اندفاع هذه الأيونات إلى الماتريس ← عدم توفر الطاقة اللازمة لتنشيط الكرات ذات شمراخ وبالتالي عدم تحفيز تفاعل تركيب ATP انطلاقا من Pi و ADP. ولعدم خروج أيونات H⁺ إلى الماتريس يتوقف تفاعل تكوّن الماء، ولنفس السبب أيضا لا تتم إعادة أكسدة المركبات R'H₂ إلى R' . يؤدي عدم توفر هذا الناقل (R') إلى توقف تفاعلات هدم الكليكوز الناتج عن حلمة الكليوجين على مستوى الخلية العضلية ← عدم تجديد ATP ← إحساس الشخص بالعياء.	3
1	التمرين الخامس (4 نقط) التجربة 1: تعرض الفأر NOD السليم لتدمير خلاياه المناعية ثم حُقن بلمفاويات T لفأر من نفس السلالة فأصبح مصابا بمرض السكري. تفسير: تبرز هذه التجربة أن اللمفاويات T المنقولة من الفأر المصاب قد تعرفت على الخلايا β كعناصر غير ذاتية وتمكنت من هدمها مما نتج عنه عدم إفراز الأنسولين وبالتالي ظهور مرض السكري..... التجربة 2: يظهر عند الفأر NOD مرض السكري المرتبط بالأنسولين بعد بلوغ عمر الفئران 10 أسابيع. عند الفئران بدون لمفاويات T8 أو بدون لمفاويات T4 لم تظهر أعراض هذا المرض. تفسير: يؤدي غياب اللمفاويات T8 التي تتفرق إلى خلايا Tc قاتلة إثر تنشيطها إلى عدم تدمير الخلايا β وبالتالي عدم ظهور المرض. يؤدي حقن مضادات أجسام ضد اللمفاويات T4 إلى كبح مفعولها وبالتالي عدم تنشيط اللمفاويات T8 ومن ثم عدم إثارة استجابة نوعية ضد الخلايا β.....	1
1	هناك تشابه بين السلسلتين الببتيديتين باستثناء الحمضين الأمينيين Met و Gly اللذين عوضا على التوالي بـ Ile و Pro في بروتين P2C. تؤدي الإصابة بفيروس كوكسكي إلى إثارة استجابة مناعية ضد مولدات مضاد الفيروس من بينها البروتين P2C المتضمن للسلسلة الببتيدية المشابهة لبروتين GAD البشري. تؤدي هذه الخاصية إلى إثارة استجابة مناعية ضد الخلايا β الحاملة لبروتين GAD.	2
1	في الاستجابة المناعية الممنعة للذات تتعرف اللمفاويات T4 على مولد المضاد الذاتي للخلايا β فتعمل على: - تنشيط اللمفاويات T8 النوعية، التي تتحول إلى Tc قاتلة تتدخل في هدم هذه الخلايا β؛ - تنشيط اللمفاويات B التي تتفرق إلى بلزيمات مفرزة لمضادات أجسام نوعية تنشط عامل التكملة الذي يُكوّن مركب الهجوم الغشائي المؤدي إلى تدمير الخلايا β. يؤدي حقن مضادات أجسام مضادة لـ CD3 إلى كبح مفعول اللمفاويات T4 المنشطة للاستجابة الممنعة للذات وإلى كبح مفعول اللمفاويات T8 مما يؤدي إلى عدم تدمير الخلايا β وتوقف المرض.	3