

## الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2014

NR 32



3	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض	الشعبة أو المسلك

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال
	<b>التمرين الأول (4 نقط)</b>	
0.5	- تعريف سلاسل الاصطدام والصخور المتحولة والكرانيت الأتاتيكي: سلاسل الاصطدام. سلاسل جبلية ناتجة عن اصطدام كتلتين فاريتين بعد انغلاق محيط قيم..... الصخور المتحولة: صخور ناتجة عن تحول في الحالة الصلبة لصخور سابقة الوجود تحت تأثير تغير عامل الضغط ودرجة الحرارة..... الكرانيت الأتاتيكي: صخرة صهارية ناتجة عن انصهار جزئي لصخور سابقة الوجود.....	
0.25	<b>تغير بنية المتالية المتحولة:</b>	
0.25	بالنسبة للتشيست: تصبح الصخرة ذات معادن موجهة تسمى هذه الظاهرة بالشيسينية;.....	
0.25	بالنسبة للميكاشيست: إضافة إلى الشيسينية تتجمع المعادن في أسرة دقيقة يعطيها طابعاً مورقاً يجعلها سهلة الانفصال;.....	
0.25	بالنسبة للغنايس: تتجمع المعادن في أسرة فاتحة وأخرى داكنة يعطيها طابعاً مورقاً وغير قابل للانفصال.....	
	<b>كيفية تشكيل الصخور:</b>	
0.25	- في مناطق الاصطدام يؤدي غور وحدات القشرة القارية إلى خضوعها لدرجة حرارة وضغط مرتفعين. ....	
0.5	- مع ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة تتعرض الصخور للتتحول تدريجياً انطلاقاً من التشيست نحو الغنايس حيث تنتقل، على مستوى البنية، من الشيسينية نحو التوريق. يتزامن هذا مع ظهور معادن واحفاء أخرى;.....	
0.5	- أثناء صعود هذه الوحدات الصخرية نتيجة الحركات التكتونية ينخفض الضغط بينما تظل درجة الحرارة مرتفعة.	
0.25	عندما تبلغ درجة الحرارة حوالي $700^{\circ}\text{C}$ في الأعمق يخضع الغنايس لأنصهار جزئي ليعطي سائلًا ذو تركيب كرانيري يبقى مرتبطة بجزء غير منصهر يعطي بعد تصلبه في الأعمق الميكامت،.....	
0.5	مع ارتفاع درجة الحرارة وتغير الضغط تزداد نسبة السائل وعند تصلبه في موقعه يعطي الكرانيت الأتاتيكي.	
	<b>التمرين الثاني (3.25 نقط)</b>	
0.25	- انخفاض تدريجي لتركيز الفوسفوكرياتين مع ارتفاع شدة التمرين العضلي.....	1
0.25	- بقاء تركيز ATP في قيمة ثابتة رغم ارتفاع شدة التمرين.....	
0.25	- استنتاج: أثناء المجهود العضلي يتم تجديد ATP عن طريق استهلاك الفوسفوكرياتين.....	
0.25	- خلال التمرين العضلي تزامن ارتفاع استهلاك ثاني الأوكسجين تقريباً مع انخفاض كمية الفوسفوكرياتين. بعد ذلك استقرت نسبة ثاني الأوكسجين المستهلك في $1.4 \text{ L/min}$ واستقر تركيز الفوسفوكرياتين في العضلة في نسبة 75%.....	2 - أ
0.25	<b>الفرضية:</b> نعلم أن ثاني الأوكسجين يتدخل في تجديد ATP خلال التنفس، وأن ATP يتدخل في تجديد الفوسفوكرياتين.	
0.25	الفرضية: يتطلب تجديد الفوسفوكرياتين استهلاك ثاني الأوكسجين لتوفير ATP اللازم لتجديده.....	B
0.25	- تثبيت ATP على رأس الميو zipper المنفصل عن خبيط الأكتين.....	3 - أ
0.25	- حلمة ATP إلى ADP + Pi. تمكن هذه الحلمة من دوران رأس الميو zipper.....	
0.25	- يرتبط رأس الميو zipper الحامل لـ ADP + Pi بالأكتين.....	
0.25	- تحرير ADP و Pi مع دوران رأس الميو zipper في اتجاه مركز الساركومير مما يؤدي إلى تحرك خبيط الأكتين نحو مركز الساركومير.....	
0.25	- على مستوى الميتوكوندري يتم استهلاك حمض بيروفيك وثاني الأوكسجين واستعمال ADP + Pi من أجل إنتاج ATP.....	B
0.25	يستعمل ATP في تجديد الفوسفوكرياتين انطلاقاً من الكرياتين ويصبح هذا بتجديد ADP الذي يستعمل في ترسيب ATP.....	
0.25	- ينقل الفوسفوكرياتين نحو الليف العضلي حيث يعمل على تجديد ATP اللازم للتناقص العضلي، وذلك انطلاقاً من ADP المحمر من طرف رأس الميو zipper.....	
0.25	- يصبح هذا التجديد بتحرير الكرياتين الذي ينتشر نحو الميتوكوندري ليدخل في تجديد الفوسفوكرياتين.....	

# هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

الصفحة  
2  
3

NR 32

الأمتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العاشرة 2014 - عناصر الإجابة  
مادة : علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال
	التمرين الثالث (5 نقط)	
0.25	التزاوج الأول : • الجيل $F_1$ متجانس إذن الأبوان من سلالتين نقيتين حسب القانون الأول لماندل..... • الحليان المسؤولان عن شكل الفجل متساويا السيادة.....	1
0.25	التفسير الصبغي للتزاوج الأول: الأبوان : شكل طويل شكل كروي $\text{♂} \times \text{♀}$ $L/L \times G/G$ النمط الوراثي : 100% L/ G/ 100% الأمشاج : الجيل $F_1$ :	2
0.25	التفسير الصبغي للتزاوج الثاني: الأبوان : شكل كروي شكل كروي $\text{♂} \times \text{♀}$ $G//L \times GL$ النمط الوراثي : $G//L \times GL$ 1/2 1/2 الأمشاج : و $L/L \times GL/GL$ 1/2 1/2 شبكة التزاوج :	2
0.25	حصلنا على $\frac{1}{4} [G] \text{ و } \frac{1}{4} [L]$ . تتطابق النتائج التجريبية مع النتائج النظرية	
0.75	أعطى التزاوج بين فردين يختلفان من حيث لون البشرة وشكل الفجل جيلاً أولاً متجانساً جميع أفراده بلون وردي وشكل كروي: الأبوان من سلالتين نقيتين حسب القانون الأول لماندل. هناك تساوي السيادة كذلك فيما يخص صفة اللون.....	3 أ
0.5	التفسير الصبغي: الأبوان: $[L;B] \times [G;R]$ $L/L B/B \times G/G R/R$ الامشاج: $L/B/ 100\% \text{ and } G/R/ 100\%$ الجيل $F_1$ : $G//L R//B [GL;BR] 100\%$	3 ب
0.5	التفسير الصبغي: الأبوان: لون وردي وشكل طويل $\times$ لون وردي وشكل بيضوي $L/L R//B$ $G//L R//B \times G//L R//B$ الامشاج: $L/R/ \frac{1}{2} \text{ and } L/B/ \frac{1}{2}$ شبكة التزاوج	4
1	حصلنا على: بلون وردي وشكل بيضوي $[GL, RB] 2/8$ بلون وردي وشكل طويل $[L, RB] 2/8$ بلون أحمر وشكل بيضوي $[GL, R] 1/8$ بلون أبيض وشكل بيضوي $[GL, B] 1/8$ شكل طويل ولون أبيض $[L, B] 1/8$ شكل طويل ولون أحمر $[L, R] 1/8$ إذن النتائج النظرية تتوافق مع النتائج التجريبية	
0.25		

النقطة	عنصر الإجابة	السؤال								
	التمرين الرابع (4 نقط)									
0.25	تعليل سليم من قبيل: - المرض متحي: الأبوان $III_2$ و $III_3$ سليمان وأعطيا أبناء مصابين؛ - المرض غير مرتبط بالصبغي Y: ظهور المرض عند الإناث، وغير مرتبط بالصبغي X: البنت $IV_2$ مصابة وأبواها $III_2$ سليم، فلو كان المرض مرتبط بالجنس لكان أبوها مصاباً لكنها تأخذ الصبغي الجنسي X من الأب..... - السيد $II_4$ ناقل للمرض لكنه أبيه مصاباً نمطه الوراثي هو $T//t$ ..... - $III_3$ و $III_2$ : هذان الفردان مختلفاً الاقتران لكونهما أنجبا أطفالاً مصابين نمطهما الوراثي هو $T//t$ ..... - $III_4$ : سليمة وأبواها ناقل للمرض، يمكن أن يكون نمطها الوراثي هو $T//T$ أو $T//t$ .....	1								
0.25	السيدة $II_5$ غير ناقلة للمرض نمطها الوراثي هو $T//T$ احتمال إنجابها لفرد ناقل للمرض هو $1/2$ واحتمال إنجابها لفرد مصاب هو 0 التعليق بشبكة التزاوج: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td><math>t \frac{1}{2}</math></td><td><math>T \frac{1}{2}</math></td></tr><tr><td><math>T//t \frac{1}{2}</math></td><td><math>T//T \frac{1}{2}</math></td></tr><tr><td></td><td>T</td></tr></table>	$t \frac{1}{2}$	$T \frac{1}{2}$	$T//t \frac{1}{2}$	$T//T \frac{1}{2}$		T	2 أ		
$t \frac{1}{2}$	$T \frac{1}{2}$									
$T//t \frac{1}{2}$	$T//T \frac{1}{2}$									
	T									
0.25	الله زواج الأقارب $III_2$ مع $III_3$ : سيصبح احتمال إنجابهما لفرد ناقل للمرض هو $1/2$ واحتمال أنجباب لفرد مصاب هو $1/4$ . التعليق بشبكة التزاوج: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td><math>t \frac{1}{2}</math></td><td><math>T \frac{1}{2}</math></td></tr><tr><td><math>T//t \frac{1}{4}</math></td><td><math>T//T \frac{1}{4}</math></td></tr><tr><td><math>t//t \frac{1}{4}</math></td><td><math>T//t \frac{1}{4}</math></td></tr><tr><td></td><td><math>t \frac{1}{2}</math></td></tr></table>	$t \frac{1}{2}$	$T \frac{1}{2}$	$T//t \frac{1}{4}$	$T//T \frac{1}{4}$	$t//t \frac{1}{4}$	$T//t \frac{1}{4}$		$t \frac{1}{2}$	2 ب
$t \frac{1}{2}$	$T \frac{1}{2}$									
$T//t \frac{1}{4}$	$T//T \frac{1}{4}$									
$t//t \frac{1}{4}$	$T//t \frac{1}{4}$									
	$t \frac{1}{2}$									
0.25	تردد الحليل $t$ : $q^2 = \frac{5}{100000} = 0,0005 ; q = \sqrt{0,0005} = 0.007$ تردد الحليل $T$ : $p = 1 - q = 1 - 0.007 = 0.993$ تردد مختلفي الاقتران: $2pq = 2 \times 0.007 \times 0.993 \approx 0.014$	3 أ								
0.25	التمرين الخامس (3.75 نقط) لم يحدث التلاك في التجارب 2 و 3 اللتان تعرض فيها الحيوان للتغون بفيروس الزكام. بينما حدث التلاك في التجربة 1 التي لم يسبق للحيوان أن تعرّض للتغون بهذا الفيروس..... تتم هذه الاستجابة بتدخل المفاويات B (أو البلازميات). يتعلق الأمر باستجابة ذات مسلك خاطي..... الشرط الضروري لحدوثها هو وجود البلازميات (يمكن قبول وجود المفاويات محسنة).....	3 ب								
0.25	الوصف: - بعد 5 أيام من العدوى ظهرت كل من البلازميات ( حوالي 8 مليون) ومضادات الأجسام ( حوالي 0.1 UA ) في طحال الفأر؛ - في اليوم العاشر بعد العدوى بلغ عدد البلازميات وتركيز مضادات الأجسام حددهما الأقصى ( زهاء 90 مليوناً بالنسبة للبلازميات و UA 10 بالنسبة لمضادات الأجسام)؛..... - في اليوم 25 انخفض عدد البلازميات بشكل كبير ( 5 مليون) في حين ظل تركيز مضادات الأجسام مرتفع ومستقراً..... استنتاج: يتبيّن من خلال الارتفاع المتزامن لكل من البلازميات ومضادات الأجسام أن هذه الخلايا هي المسؤولة عن إنتاج مضادات الأجسام.....	2								
0.25	- في بداية العدوى كان عدد المفاويات حوالي 80 مليوناً وعدد البلازميات منعدم: لم يتم في هذه الحالة تفريغ المفاويات النوعية إلى بلازميات..... - في اليوم الخامس انخفض عدد المفاويات B وظهرت البلازميات: بداية تفريغ المفاويات النوعية إلى بلازميات..... - في اليوم العاشر ارتفع عدد المفاويات B نتيجة تكاثرها (طور التضخم) وتفرّق عدد كبير منها إلى بلازميات مما يفسر الارتفاع الملحوظ لهذه الخلايا المناعية..... - في اليوم 25 انخفض ملحوظ في عدد البلازميات نتيجة موتها بعد إفراز مضادات الأجسام وارتفاع عدد المفاويات B نتيجة استمرار تكاثرها (طور التضخم) حيث سيتحول جزء منها إلى مفاويات B ذاكرة.....	3								
0.25	- يتعرف فيروس الزكام على الخلية الهدف عن طريق تثبيت المحدد المستضادي HA على مستقبل نوعي..... - تدخل مضادات الأجسام ضد HA عن طريق الارتباط بالمحددات المستضادية ومنع تثبيت الفيروس على الخلية الهدف....	4								
0.25	دخول الجرثوم ← التعرف النوعي على مولدات المضاد من طرف المفاويات T و B ← تنشيط المفاويات B من طرف T4 وتفريقيها إلى بلازميات ← إفراز مضادات الأجسام النوعية ← إبطال مفعول الجرثوم.	5								