



الأمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2018

- عناصر الإجابة -

NR 32

+٢٠١٨٤٤١١٢٤٥٤
+٢٠١٦٥٤١٣٥٤٤١٥٤٥٠
٨٢٠١٤٤٧٦٥٣٩٨٠
٨٢٠١٣٢٨٥٣٩٨٠



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات
والتوجيه

3

مدة الإنجاز

علوم الحياة والأرض

المادة

7

المعامل

شعبة العلوم التجريبية : مسلك علوم الحياة والأرض

الشعبة أو المسلك

رقم السؤال	عنصر الإجابة	النقطة
المكون الأول (5 نقط)		
I	(١ ، ب) ، (٢ ، أ) ، (٣ ، د) ، (٤ ، د) ، (٥ ، د)	0.5 4 ×
II	<p>التفاعلات الإجمالية: 1- التخمر الكحولي : $C_6H_{12}O_6 + 2 ADP + 2 Pi \rightarrow 2 C_2H_5OH + 2 CO_2 + 2 ATP$ (إيثanol) (كليكوز)</p> <p>2- تجديد ATP انطلاقا من الفسفوكرياتين : $ATP + \text{كرياتين فسفوكرياتين} \rightarrow ATP + \text{كرياتين} + ADP$</p>	0.5 0.5
III	<p>1- انحلال الكليكوز: مجموع التفاعلات التي تحدث على مستوى الجبلة الشفافة و تسمح بالهدم الجزئي للكليكوز ليعطي جزيئي حمض البيروفيك مع إنتاج جزيئي ATP.</p> <p>2- السلسلة التنفسية: مجموعة من البروتينات المتواجدة على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري والتي تحفز سلسلة من تفاعلات الأكسدة احترازا وتسمح بتدفق الإلكترونات من المركبات المختزلة إلى المقبول النهائي O_2.</p>	0.5 0.5
IV	(أ ، خطأ) ، (ب ، خطأ) ، (ج ، صحيح) ، (د ، صحيح)	0.25 4 ×
المكون الثاني (15 نقطة)		
التمرين الأول (6 نقط)		
1	<p>مقارنة :</p> <p>- ظهر الكلية عاد عند الشخص السليم و يتميز بتشكل أكياس عند الشخص المصاب.</p> <p>- المركب PC1-PC2 عاد عند الشخص السليم وغير عاد عند الشخص المصاب.</p> <p>- تدفق أيونات Ca^{2+} عاد عند الشخص السليم و ضعيف عند الشخص المصاب، أما نشاط mTOR فهو ضعيف عند الشخص السليم و مهم عند الشخص المصاب.</p> <p>- التكاثر الخلوي عاد عند الشخص السليم و مهم عند الشخص المصاب.</p>	0.25 4 ×
2	<p>متالية ARNm :</p> <p>- عند الشخص السليم:</p> <p>- عند الشخص المريض:</p> <p>متالية الأحماض الأمينية:</p> <p>- عند الشخص السليم:</p> <p>- عند الشخص المريض:</p> <p>تفسير الأصل الوراثي لمرض التكيس الكلوي:</p> <p>طفرة على مستوى المورثة PKD1 تمثل في ضياع ثلاثة نيكليوتيدات GAC في الموقع 29076 ← تركيب بروتين PC1 غير عادي ← مركب PC1-PC2 غير عادي ← اختلال التكاثر الخلوي لخلايا الأنابيب البولية ← ظهور مرض التكيس الكلوي.....</p>	0.25 2 × 0.25 2 × 0.5

		أ. الأنماط الوراثية								
الأفراد	الأنماط الوراثية	التعليم	الأنماط الوراثية	العلية						
0.5 3 ×	III ₂	عصابة وأنجبت أبناء سليمين والحليل الممرض سائد وغير مرتبط بالجنس	(P // p)	I ₂						
	III ₁	عصاب وأنجب بنات سليمات والحليل الممرض سائد وغير مرتبط بالجنس	(P // p)	II ₁						
	III ₂	سليمة والحليل الممرض سائد وغير مرتبط بالجنس	(p // p)	II ₂						
ب. احتمال إنجاب طفل مصاب من طرف الزوجين III ₁ و III ₂ :										
$ \begin{array}{ccc} [P] & \text{II}_1 & \times \\ (\text{P} // \text{p}) & & \\ \frac{1}{2} \underline{\text{P}} & \frac{1}{2} \underline{p} & \\ \end{array} \downarrow \begin{array}{ccc} [\text{p}] & \text{II}_2 & \text{المظاهر الخارجية} \\ (\text{p} // \text{p}) & & \text{الأنماط الوراثية} \\ 1 \underline{p} & & \text{الأمشاج} \\ \end{array} $ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>γ II₁</td><td>$\frac{1}{2} \underline{\text{P}}$</td><td>$\frac{1}{2} \underline{p}$</td></tr> <tr> <td>$1 \underline{p}$</td><td>$[P] \frac{1}{2} (\text{P} // \text{p})$</td><td>$\frac{1}{2} (\text{p} // \text{p})$ [p]</td></tr> </table>					γ II₁	$\frac{1}{2} \underline{\text{P}}$	$\frac{1}{2} \underline{p}$	$1 \underline{p}$	$[P] \frac{1}{2} (\text{P} // \text{p})$	$\frac{1}{2} (\text{p} // \text{p})$ [p]
γ II₁	$\frac{1}{2} \underline{\text{P}}$	$\frac{1}{2} \underline{p}$								
$1 \underline{p}$	$[P] \frac{1}{2} (\text{P} // \text{p})$	$\frac{1}{2} (\text{p} // \text{p})$ [p]								
احتمال إنجاب طفل مصاب من طرف الزوجين III ₁ و III ₂ هو $\frac{1}{2}$.										
<p>أ. حساب تردد الحليلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الحليل العادي - الحليل الممرض <p>ب - تردد الأفراد مختلفي الاقتران</p> <p>ملحوظة: قبول قيم قريبة من هذه النتائج.</p>										
<p>التعرين الثاني (3 ن)</p> <p>الاستنتاجات من نتائج التزاوج الأول :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الآباء من سلالتين نقيتين حسب القانون الأول لماندل؛ - بالنسبة لشكل الأجنحة : الحليل المسؤول عن الأجنحة الطويلة سائد على الحليل المسؤول عن الأجنحة الأثرية؛ - بالنسبة لللون العيون: الحليل المسؤول عن اللون الأحمر للعيون سائد على الحليل المسؤول عن اللون البني للعيون. 										
0.25 3 ×					1					

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

الصفحة

3


4

NR 32



الامتحان الوطني الموحد للثانويات - الدورة العادية 2018 - معاشر الإيجابية
مادة: علوم الحياة والأرض - هيئة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض

- أ- ارتباط / استقلالية المورثتين:
- المورثتان المدروسان مرتبتان.....
- تعليم: الجيل F_2 ناتج عن تزاوج اختباري، يتكون من أربع مظاهر خارجية بحيث أن نسبة المظاهر الخارجية الأبوية أكبر بكثير من نسبة المظاهر الجديدة التركيب ($27.35\% > 72.64\%$)

ب - التفسير الصبغى لنتائج التزاوج الثاني:



أ- الخرائط العاملية الممكنة:



ب - التزاوج المقترن: تزاوج بين إناث مختلفات الاقتران بالنسبة للمورثتين لها مظهر خارجي [L ; N] وذكور ثانوي التحفي [n ; ℓ]

التعرين الثالث (3 نقط)

مقارنة:

- + أوجه التشابه : إنتاج مضادات الأجسام ضد بكتيريا الكزاز عند كل من الشخص الملحق والشخص غير الملحق.....
- + أوجه الاختلاف : - تظهر الاستجابة المناعية بعد 7 أيام من العدوى عند الشخص غير الملحق فيما تظهر الاستجابة المناعية بشكل فوري بعد العدوى عند الشخص الملحق.....
- ينتج الشخص الملحق كمية مهمة من مضادات الأجسام (8000 UA) في حين ينتج الشخص غير الملحق كمية ضعيفة (8UA).
- تدوم مضادات الأجسام فترة طويلة في جسم الشخص الملحق مقارنة مع الشخص غير الملحق.....

1

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

الصفحة

4

NR 32

الامتحان الوطني الموحد للبكلوريا - الدورة العادية 2018 - مناسير الإجابة
مادة: علوم الحياة والأرض - هيئة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض

0.25 × 2	<p>استنتاج : خاصيتنا الذاكرة والنوعية التعليق : - خاصية الذاكرة: عند المجموعة A، نلاحظ أن عدد البازميات المفرزة لمضادات الأجسام ضد GRM جد مرتفع عند الحقن الثاني بنفس مولد المضاد مقارنة مع الحقن الأول..... - خاصية النوعية: عند المجموعة B، نلاحظ أن الحقن الأول ب GRM لم يسمح بارتفاع عدد البازميات المفرزة لمضادات الأجسام ضد GRL، عند الحقن ب GRL، لكون مولد المضاد في الحقن الأول (GRM) يختلف عن مولد المضاد في الحقن الثاني (GRL).....</p>	2
0.5	<p>A - تفسير الاستجابة المناعية عند المجموعة A: الاتصال الأول بمولد المضاد GRM ← انتقاء المفروقات B النوعية ← تكاثر وتفريق إلى بلزميات مفرزة لمضادات أجسام ضد GRM ولمفروقات B ذاكرة. الاتصال الثاني بنفس مولد المضاد ← تنشيط سريع لعدد كبير من المفروقات الذاكرة النوعية ← الإنتاج الفوري لعدد كبير من البازميات النوعية ضد هذا المولد المضاد. ← استجابة فورية وقوية</p> <p>B - تفسير الاستجابة المناعية عند المجموعة B: الاتصال الأول بمولد المضاد GRM ← انتقاء المفروقات B النوعية ← تكاثر وتفريق إلى بلزميات مفرزة لمضادات أجسام ضد GRM ولمفروقات B ذاكرة. خلال الاتصال الثاني بمولد مضاد مختلف GRL لا يتم تنشيط المفروقات الذاكرة النوعية ل GRM بل يتم انتقاء لمرة أخرى من المفروقات B نوعية لـ GRL تخضع لنفس مراحل الاستجابة الأولية ← استجابة مناعية ضعيفة وبطيئة ضد GRL.</p>	3
التمرين الرابع (3 نقط)		
0.25	<p>التغيرات العيدانية : - عند الانتقال من المنطقة Zb إلى المنطقة Zd ظهور كل من الكورديبريت والأندلوسيت.</p>	1
0.25	<p>- عند الانتقال من المنطقة Ze إلى المنطقة Zf: اختفاء الموسكوفيت وظهور الفلسبات البوتاسي.</p>	
0.5	<p>تفسير التغيرات العيدانية: - عند الانتقال من Zb إلى Zd ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة لتصبح ضمن مجال استقرار الأندلوسيت والكورديبريت مما أدى إلى ظهور هذين المعدنيين.....</p>	2
0.5	<p>- عند الانتقال من Zf إلى Ze ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة لتصبح فيها الموسكوفيت غير مستقرة حيث تختفي ويفصل الفلسبات البوتاسي.....</p>	
0.25	<p>أ. ظروف الضغط ودرجة الحرارة: - درجة الحرارة الدنيا 420°C (ظروف تشكل الصخرة R_1) - درجة الحرارة القصوى 680°C (ظروف تشكل الصخرة R_4) - الضغط الأدنى $0,3 \text{ GPa}$ (ظروف تشكل الصخرة R_1) - الضغط الأقصى $0,45 \text{ GPa}$ (ظروف تشكل الصخرة R_4)</p>	3
0.25	<p>ملحوظة: تقبل القيم القريبة من القيم المشار إليها بهامش: درجة الحرارة $(-/-10^{\circ}\text{C})$ والضغط $(+/-0,05\text{Gpa})$</p>	
0.5	<p>ب. استنتاج: التحول الدينامي الحراري.....</p>	
0.5	<p>- تعليق إسقاط القيم الدنيا والقيم القصوى لدرجة الحرارة والضغط التي تشكلت فيها صخور المنطقة المدرسة (درجة حرارة من 420°C إلى 680°C وضغط من $0,3\text{GPa}$ إلى $0,45\text{GPa}$) يبين أنها تنتمي لمجال التحول الدينامي الحراري.....</p>	