


مقارنة المردودية الطاقية لكل من ظاهري التنفس والتلخمر

النشاط 5


يعتبر كل من التنفس والتلخمر مسلكين أساسيين يمكن من تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية، وتركيب جزيئات ATP اللازمة لمزاولة مختلف الأنشطة الخلوية. للتعرف على المردودية الطاقية لكل ظاهري وتحديد أكثرهم فعالية نقترح دراسة المعطيات التالية:

المعطيات

الوثيقة 3 : نتائج القياسات المسرعية للطاقة الكامنة في جزيئه الكليكوز وفي بعض نواتج التنفس والتلخمر



الوثيقة 1 : مراحل كل من التلخمر البني والتلخمر الكحولي




الوثيقة 2 : الحصيلة الطاقية للتنفس الخلوي

الوثيقة 4 : المردودية الطاقية
إذا اعتبرنا أن E هي الطاقة الكامنة في مول من الكليكوز، و E' هي الطاقة الكامنة في عدد من مول ناتج عن التلخمر أو التنفس، فيمكن حساب المردودية الطاقية (r) بتطبيق المعادلة التالية:

$$r = (E' / E) * 100$$

- نغير عن r بنسية مئوية
- تؤدي حلمة مول واحد من الكليكوز إلى تحرير 2840 KJ من الطاقة.
- تؤدي حلمة مول واحد من ATP إلى تحرير 30,5 KJ من الطاقة.

الحصيلة الطاقية للتنفس الخلوي



استئناف المعطيات

- انطلاقاً من معطيات الوثيقة 1، صُف مراحل كل من ظاهري التلخمر البني والتلخمر الكحولي، ثم حدد الحصيلة الطاقية للتلخمر.
- إذا علمت أن كل $1 \text{ NADH}_2 + \text{H}^+$ تعطي 1 ATP و كل 2 FADH_2 تعطي 1 ATP، أحسب الحصيلة الطاقية للتنفس الخلوي بالاعتماد على الوثيقة 2.
- أحسب المردودية الطاقية لكل من ظاهري التنفس والتلخمر بتطبيق العلاقة الممثلة في الوثيقة 4.
- انطلاقاً مما توصلت إليه وباعتمادك على معطيات الوثيقة 3، قارن المردودية الطاقية لكل من التنفس والتلخمر ثم فسر الاختلاف الملاحظ.