


الفصل الأول: نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي

الوثيقة 1: دور التوالد الجنسي في ثبات عدد الصبغيات عند نفس النوع.

★ خلال الانقسام غير المباشر، تتشطر الصبغيات وتنتقل من خلية إلى أخرى، مما يوحى بأنها تلعب دوراً في انتقال البرنامج الوراثي عبر الخلايا. مكنت الأبحاث من تحديد عدد الصبغيات عند الكائنات الحية (أنظر الشكل أ).

بعض الأنواع الأحادية الصبغية الصبغية		بعض الأنواع الثنائية الصبغية الصبغية		الشكل أ				
07	فطر نوروسبورا	نباتات	حيوانات	ذبابة الخل	ذبابة الخل			
07	فطر صورداريا	16 البصل	08 الخميرة	26 الضفدع	الضفدع			
04	فطر البنسلينيوم	20 الأسيتابولاريا	38 القط	40 الفأر	الفأر			
01	بكتيريا	24 الأرض	46 الفاصلوا	46 الإنسان	الإنسان			
بعض الأنواع الأحادية الصبغية الصبغية		بعض الأنواع الثنائية الصبغية الصبغية		الشكل أ				
فطر نوروسبورا		نباتات		حيوانات				
فطر صورداريا		16 البصل		ذبابة الخل				
فطر البنسلينيوم		20 الأسيتابولاريا		26 الضفدع				
بكتيريا		24 الأرض		38 القط				
		46 الفاصلوا		40 الفأر				
		48 النبغ		46 الإنسان				
		48 البطاطس		64 الحصان				
		78 الدجاجة						

الشكل ب



- ★ لإنجاز خريطة صبغية نعتمد التقنيات التالية:
- ↳ نوقف الانقسام خلال الطور الاستوائي حيث تكون الصبغيات واضحة، وذلك بواسطة مادة السورنجين.
- ↳ نفجر الخلية بوضعها في وسط ناقص التوتر فتتحرر الصبغيات.
- ↳ نثبت الصبغيات بممواد خاصة مثل الكحول ثم نصورها، فنحصل على زينة صبغية.
- ↳ نرتب هذه الصبغيات بالاعتماد على المعايير التالية:
 - ✓ قدها (من الأكبر إلى الأصغر).
 - ✓ موقع الجزيء المركزي (وسط، طرف)
 - ✓ الأشرطة الملونة الفاتحة والداكنة
 - ✓ في حالة الخلايا الثنائية الصبغية الصبغية نرتب الصبغيات بالأزواج، حيث يضم كل زوج صبغيين متماثلين.

يعطي الشكل ب خرائط صبغية لخلايا الإنسان:

① = خلية جسدية عند الرجل.

② = خلية جسدية عند المرأة.


③ = خلية جنسية ذكرية.

④ = خلية جنسية عند الرجل وعند المرأة.

انطلاقاً من هذه الوثائق، ماذا يمكنك استخلاصه من حيث دور التوالد الجنسي في ثبات عدد الصبغيات عند الكائنات الحية؟


الوثيقة 2: ملاحظات مجهرية لخلايا خلال الانقسام الاخترالي .La méiose

تعطي الصور أسفله ملاحظات مجهرية لخلية نبات أثناء الانقسام الاخترالي. صف مظهر هذه الخلايا ثم أعط عنواناً مناسباً لكل صورة بعد ترتيبها ترتيباً زمنياً.



الوثيقة 3: تطور كمية ADN أثناء الانقسام الاخترالي.


لتتأكد التغييرات التي تتعرض لها الخلايا الأم للأمشاج خلال الانقسام الاخترالي، تم تتبع تغير كمية الـ ADN على مستوى إحدى هذه الخلايا، ويمثل المبيان أسفله، النتائج المحصل عليها.
ماذا تستخلص من تحليل هذه الوثيقة؟



الوثيقة 4 : رسوم تخطيطية تفسيرية لأطوار الانقسام الاخزالي.


حل هذه الرسوم محدداً مختلف أطوار الانقسام الاخزالي.

= II




⑤


= I




①




⑥




②




⑦



③



⑧



④

الوثيقة 5 : دور ظاهرة العبور الصبغي Crossing over


يعطي الشكل أ من الوثيقة صورة بالمجهر الإلكتروني لصبغيات أثناء المرحلة التمهيدية I، والشكل ب رسم تفسيري لظاهرة تحدث خلال هذه المرحلة.

تعرف هذه الظاهرة وبين دورها في التأثير على الصفات الفردية.



الشكل ب

مراحل العبور الصبغي



تشكل صبغيات ذات تركيب جديد

تبادل قطع بين الصبغيين المتماثلين


صبغيان متماثلان خلال المرحلة التمهيدية I

صبغيان متماثلان خلال المرحلة G₁

الوثيقة 6: التخليط البصيغي ودوره في تنوع الأمشاج.

بين كيف يؤثر التخليط الصبغي في تنوع الصفات الفردية؟

الخلية الأم للأمشاج
 $2n = 4$



أنماط جديدة لتركيب أحادية الصبغة الصبغية ($n = 2$)

أنماط جديدة لتركيب أحادية الصبغة الصبغية ($n = 2$)


الوثيقة 7: التخليط الضمسيبي ودوره في تنوع الأمشاج .Le brassage intrachromosomique

بين كيف يؤثر التخليط الضمسيبي في تنوع الصفات الفردية؟


الخلية الأم للأمشاج

$$2n = 4$$

الحالة الثانية



الحالة الأولى



انفصال الصبغيات المتماثلة

انفصال صبغيات كل صبغي

أنماط جديدة التركيب أحادية الصبغية (2) ($n = 2$)

أنماط جديدة التركيب أحادية الصبغية (2) ($n = 2$)

الوثيقة 8: دور الإخصاب في تخليط الحليات (تخليط بيسبيجي)

يتمثل الجدول أدفأله احتمالات البيضات الممكن الحصول عليها بالنسبة ل الخلية أم للأمشاج ذات صبغية صبغية $2n=4$. انطلاقاً من هذه المعطيات أبرز دور الإخصاب في تخليط الحليات.

الأمشاج النكرية	الأمشاج الأنثوية