


# هذا الملف تم تحميله من موقع [Talamid.ma](http://Talamid.ma) : اللهم إنا نسألك حسن الخلاات ونجاهة العذاب

يتميز كل كائن حي بمجموعة من الصفات الوراثية، كل صفة تكون مسؤولة عنها مورثة معينة وكل مورثة توجد على شكل حليلين إما متشابهين أو مختلفين فما هي الصلة بين الوراثة والجينات؟



زعزع ماندل سلالتين نقيتين من الجلبانة تختلفان في صفة واحدة هي: شكل البذرة. السلاللة الأولى تُنْتَجُ بذورا ملساء (Lisses) و السلاللة الثانية تُنْتَجُ بذورا متجمدة (Etamines). ولضمان الإخصاب المتبادل قام ماندل بقطع الأسدية (Ridées) قبل نضجها في الأزهار. ينتج عن التزاوج الأول أفراد الجيل الأول F1 (انظر الشكل جانبه).

- 1- ما هي الصفة و المظاهر الخارجية المدرستة ؟
  - 2- ما هي المورثة و الخليلات المدرستة ؟
  - 3- ماذا تلاحظ بخصوص المظاهر الخارجى لـ F1
  - 4- علمًا أن الأفراد من سلالة نقية يكونون متباينين في النمط الوراثي لـ F1
  - 5- يستنتج النمط الوراثي للأمراض التي ينتجهـ F1
  - 6- ماذا تستنتج بخصوص الخليل المسؤول عن الـ F1 بعد ذلك قام ماندل بزرع بذور الجيل F1 و تركها يتكون من : 5474 بذرة ملساء . و 1850 بذرة ملساء .
  - 7- أحسب النسبة المئوية لـ F2 وقارنها بالـ F1
  - 8- اعط التفسير الصيغى للتزاوج الأول و التزاوج الثاني

نزاوج ذبابة خل ذات جسم رمادي بذبابة خل ذات جسم أسود. فنحصل على جيل F1 مكون من ذباب ذي جسم رمادي. استعمل N أو G أو L تمثيل الخيل المسؤول عن اللون الأسود و G أو L تمثيل الخيل المسؤول عن اللون الرمادي.

- 1- ماذا تستنتج من خليل نتائج الزواج.  
 بعد ذلك نقوم بزواج بين أفراد F1 فنحصل على جيل F2 مكون من 1050 ذبابة ذات جسم أسود و 3450 ذات جسم رمادي.

2- حول النتائج الحصول عليها في F2 إلى نسب مئوية.

3- إعطاء التفسير الصبغي لانتقال صفة لون الجسم عند ذبابة الخل.

4- ما هو النمط الوراثي لذبابة خل ذات جسم أسود تم انتقاها بالصدفة من F2 ؟

5- ما هو النمط الوراثي لذبابة خل ذات جسم رمادي تم انتقاها بالصدفة من F2 ؟

6- اقترح طريقة للتأكد من النمط الوراثي لهذه الذبابة الرمادية. فisser جوابك.

نزاوج فأربين صفراوين فنحصل في الجيل F1 على فئران صفراء بنسبة 2/3 وفئران رمادية بنسبة 1/3. وثيقة 3

- 1- حدد الصفة السائدة و الصفة المتنحية؟
  - 2- ما هو النمط الوراثي للأباء؟
  - 3- أعط التفسير الصيغي لهذه النتائج.

نوثقة 4 نزاج بين نبتتين من شب الليل، إحداها أزهارها بيضاء والأخرى أزهارها حمراء. نحصل في F1 على نباتات كلها بأزهار وردية.  
1- ماذا تستنتج من النزاج الأول؟

التمرين 2

## التمرين 1

تعتبر نبأة الخل آداة تجريبية أساسية لدراسة انتقال الصفات الوراثية. الكشف عن كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية تزوجت عدة نباتات عند هذه النبأة، تتبع فيها انتقال صفاتين وراثيتين: شكل الزغب وشكل الأجنحة:


- المورنة cu المسئولة عن شكل الأجنحة لها حلبلان: الخليل cu سائد مسؤول عن المظهر الخارجي "أجنحة عادية"، والخليل cu متحي مسؤول عن المظهر الخارجي "أجنحة معفوفة".
- المورنة sb المسئولة عن شكل الزغب لها حلبلان: الخليل sb سائد مسؤول عن المظهر الخارجي "زغب فقير"، والخليل sb متحي مسؤول عن المظهر الخارجي "زغب عادي".

التزوج الأول: بين اثنى بأجنحة عادية وذكر بأجنحة عادية. أعطى هذا التزوج جيلاً مكوناً من:  
- 310 فرداً بأجنحة عادية؛  
- 101 فرداً بأجنحة معفة.

التزوج الثاني: بين اثنى بزغ قصير وذكر بزغ قصير. أعطى هذا التزوج جيلاً مكوناً من:  
- 242 فرداً بزغ قصير؛  
- 120 فرداً بزغ عادي.

يتميز نبات الفجل بأشكال متعددة وبشراء ذات ألوان مختلفة. للκثف عن كيفية انتقال هذه الصفات الوراثية تم إنجاز التجارب الآتية:

التزاوج الأول: بين نبتة ذات شكل كروي ونبتة ذات شكل طويل. أعطى هذا التزاوج جيلاً أولاً F<sub>1</sub> جميع أفراده لهم شكل بيضوي.




النراوح الثاني: بين أفراد الجيل  $F_1$ , أعطى هذا النراوح النتائج المماثلة في المثلثة 1

1. ماذا تستنتج من نتائج التزاوج الأول؟ (0,5 ن)
2. أعط التفسير الصيفي لنتائج التزاوج الأول والثانية

مستعيناً بشبكة التزاوج. (2ن)  
(أ) من للحليل المسؤول عن الشكل الكروي، بـ (ج) أم، وـ للحليل

المسؤول عن الشكل طویل ب [أ] أو [أ].

النراوح الثالث: بين سلالتين تختلفان في الشكل واللون: سلالة ذات شكل طويل وبيضاء، وسلالة ذات شكل كروي وحمراء. أطع هذا النراوح حيلا.  $E = \text{جوع} + \text{أفراد} + \text{شكل} + \text{رضم}$



في الحالات السابقة لاحظنا أن التزاوجات تعطي نفس النتائج سواء تعلق الأمر بصفة يحملها الذكر و صفة مضادة تحملها الأنثى أو العكس. لكن الأمر يختلف عندما تكون الموراثات مرتبطة بالجنس أي محمولة على الصيغة الجنسية X أو Y.

إن المؤثرات المحمولة على الصبغي  $\bar{Y}$  على مستوى قطعته التفريقية تكون مثلاً عند الذكور فقط بتحليل واحد. أما المؤثرات المحمولة على الصبغي  $X$  على مستوى قطعته التفريقية فتكون مثلاً عند الذكور بتحليل واحد بينما عند الإناث بتحليلين.

المورثات المحمولة على القطعة المشابهة لـ X و تكون مثلثة بحالتيين عند الجنسين. وبالتالي فانتقالها مطابق لانتقال المورثات المحمولة على الصبغيات اللاجنسية. فيما سيلحق سنقول أن المورثات محمولة على الصبغي X عندما تكون محمولة على قطعه التفريقية و نفس الشيء بالنسبة لـ Y.

## الوثيقة 2 ماهي الصبغية لذبابة المخل؟

الخريطة الصبغية لذبابة الخل بسيطة. فهي كائنات  $2n$  و عدد صبغياتها  $8$  ( $2n=8$ ).

### الصيغة الصبغية عند أنثى ذبابة الخل:

### الصيغة الصبغية عند ذكر ذبابة الخل:

آباء

ذبابة الخل أنثى ♀

ذبابة الخل ذكر ♂

100%

50%

50%

50% إناث ♀

50% ذكور ♂

تكون أنثى ذبابة الخل ..... لكونها تعطي نوعا واحدا من الأمشاج:

أما الذكر فيكون ..... لكونه يعطي نوعين من الأمشاج: ..... عند الثدييات و عدد كبير من الحشرات الذكر هو الذي يحدد الجنس بينما عند عدد من الحيوانات الأخرى ( خصوصا الفراشات و بعض الطيور والأسماك) فإن الأنثى هي التي تكون متغيرة الأمشاج وبالتالي هي التي تحدد الجنس.

الأمشاج	الصيغيات الجنسية	بعض الكائنات
50% Y	50% X	الذكر متغير الأمشاج: XY الأنثى متباينة الأمشاج: XX
100% X		1- عند كل الثدييات وعدد كبير من الحشرات
100% Z	ZZ	الذكر متباين الأمشاج: ZZ الأنثى متغيرة الأمشاج: ZW
50% W	50% Z	2- عند الفراشات وبعض الطيور والأسماء
50% Z	50% O	تحمل الأنثى صبغياً جنسياً واحداً: Z
100% Z	ZZ	3- عند الدجاج

ملحوظة: يرمز في الحالتين 2 و 3 إلى الصبغيات الجنسية بـ Z و W عوض X و Y للإشارة إلى أن الأنثى متغيرة الأمشاج.

المشقة 3

الوثيقة 3 توجد عند ذبابة الخل صفة طافرة: عيون بيضاء. و صفة متواحشة (عادية): عيون حمراء. ننجز تزاوجين بين ذبابات الخل من سلالتين نقيتين تختلفان من حيث صفة لون العيون.

- التزاوج الأول: يعطى التزاوج بين ذكر ذي عيون بيضاء وأنثى ذات عيون حمراء جيلا F1 كل أفراده يعانون حمراء.

- التزاوج الثاني: يعطي التزاوج بين ذكر ذي عيون حمراء وأنثى ذات عيون بيضاء جيلا F1 يتكون من: 50% ذباب إناث بعيون حمراء و 50% ذباب ذكور بعيون بيضاء.

استعمل الرمز  $W^+$  بالنسبة للحليل المسؤول عن العيون البضاء و  $W^-$  بالنسبة للحليل المسؤول عن العيون الحمراء.

## ١- ماذا تستنتج من خليل و مقارنة نتائج التزاوجين ؟

2- حدد موقع المورثة المسئولة عن لون العيون.

3- أعط التفسير الصفي لانتقال صفة لون العيون عند زيادة الخل.

An illustration of a mayfly, showing its long, slender body, two long wings, and two long, segmented tails (telsons).

للتتابع انتقال بعض الصفات الوراثية عند حشرة Chrysope (انظر الوثيقة جانبها) ننجز التزاوجات الآتية:

التزاوج الأول: تم عزل إناث وذكور حشرة Chrysope من سلالة نقية. أعطى التزاوج بين أنثى ذات جسم أخضر وذكر ذي جسم أصفر جيلاً أولاً  $F_1$  مكوناً من أفراد جميعهم بجسم أخضر. عند إنجاز تزاوج عكسي نحصل على 50% من الذكور بجسم أصفر و 50% من الإناث بجسم أخضر.

1. ماذا تستنتج من نتيجة التزاوج الأول؟ (0.5 ن)

التزاوج الثاني: بين أنثى من  $F_1$  ذات جسم أخضر وذكر جسمه أصفر. أعطى هذا التزاوج جيلاً

- 27 - ذکریا جسم اصغر. *نیشنل جوئلری*، ۱۹۱۲ء، ص ۱۷۲۔

33- أنشى ذات جسم أخضر؛

## 14- ذکرا ذا جسم أصفر؛

2. مستعينا بشبكة التزاوج أعلم التفسير الصبغي لنتائج التزاوجين الثاني والثالث. (2.5 ن)  
(أ) مـ للحلـ المسـول عنـ اللهـ Gـ، حالةـ السـادـةـ وـ مـ فيـ حالةـ التـصرـ)

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

الملف رقم 3: واسة النقل زوبين من الميلات (البهونة الثانية)

عند دراسة انتقال صفتين وراثيتين، نتحدث عن المهجونة الثنائية، والأمر لا يقتصر فقط على دراسة انتقال زوج واحد من الـhilalat، بل انتقال زوجين من الـhilalat، كل واحد من هذين الزوجين يمثل مورثة معينة. فما هي القوانيين الإحصائية المتحكمه في انتقال صفتين وراثيتين في آن واحد؟

الوثيقة 1



الزواج الأول : بين ذيابة خل طافرة أجنحة مختزلة (C أو c) و لونها أسود (N أو n)، و أخرى متوجحة أجنحة طولية (L أو l) و لونها رمادي (G أو g). فحصل على F1 مكون من ذباب خل ذي أجنحة طولية و جسم رمادي.

الزواج الثاني: نراوح الجيل F1 فيما بينه فحصل على جيل F2 يتكون من :

- 152 ذيابة ذات أجنحة مختزلة و جسم أسود.
- 450 ذيابة ذات أجنحة مختزلة و جسم رمادي.
- 458 ذيابة ذات أجنحة طولية و جسم أسود.
- 1458 ذيابة ذات أجنحة طولية و جسم رمادي.

1- ماذا تستنتج من التزاوج الأول ؟

2- حول النتائج المحصل عليها في F2 إلى نسب مانوية. ثم قارنها بالنسب 1/16, 3/16, 1/16, 9/16.

3- كيف تفسر ظهور مظاهر جديدة التركيب في F2 علماً أن المورثتين المدروستين محمولتين على صبغيين مختلفين (مورثتين مستقلتين).

4- اعط التفسير الصبغي لانتقال الصفتين المدروستين.

5- نقوم بنتراوح لفرد هجين من F1 مع فرد ثانٍ التهجي.

أ- ماذا يسمى هذا التزاوج ؟

ب- اعط نتيجة هذا التزاوج.

ج- ما النتيجة المرتفقة لو كانت المورثتان المدروستان محمولتان على نفس الصبغي (مورثتان مرتبطتان) و إذا اعتبرنا أن نسبة حدوث ظاهرة العبور منعدمة (ارتطاط مطلق للمورثات)؟

الوثيقة 2

الزواج الأول: تم بين سلالة ذات أزهار بنفسجية (V) أو (v) و حبوب لقاح طولية (L) أو (l) بسلالة ذات أزهار حمراء (R) أو (r) و حبوب لقاح كروية (G) أو (g). فتم الحصول في F1 على نباتات ذات أزهار بنفسجية و حبوب لقاح طولية.

1- ماذا تستخلص من هذا التزاوج ؟

الزواج الثاني: نراوح أحد حناء F1 مع سلالة ذات أزهار حمراء و حبوب لقاح كروية فحصل في F2 على :

284 نبتة ذات زهور بنفسجية و حبوب لقاح طولية.

21 ذات زهور بنفسجية و حبوب لقاح كروية.

21 ذات زهور حمراء و حبوب لقاح طولية.

255 ذات زهور حمراء و حبوب لقاح كروية.

2- بماذا ينبع التزاوج الثاني؟ علل إجابتك.

3- حدد نسب المظاهر الخارجية. ماذا تستنتج ؟

4- كيف تفسر وجود أفراد ذات تركيبات حليلية جديدة؟

5- اعط التفسير الصبغي للتزاوج الثاني.


6- ما النتيجة المرتفقة لو كانت المورثتان المدروستان مرتبطتان ارتباطا مطلقا (غياب العبور)؟

الوثيقة 3

انطلاقاً من دراسة انتقال عدة مورثات مرتبطة، لاحظ Morgan أن نسبة التركيبات الجديدة تكون ثابتة تقريباً و أن هذه النسبة تختلف من زوج مورثات لآخر. استنتج Morgan من الملاحظة الأولى أن كل مورثة تحتل على الصبغي موقعاً معيناً و ثابتاً. و لتفسير الملاحظة الثانية قدم الفكرة التالية : بما أن نسبة التركيبات الجديدة تعبّر عن تردد (نسبة) حدوث العبور، و أن هذا التردد يكون كبيراً كلما كانت المورثتان متبعديتين، و يكون ضعيفاً كلما كانت المورثتان متقاربتيّن، و منه يمكن استعمال نسبة حدوث العبور للتغيير عن المسافة بين مورثتين.

$$\text{النسبة المئوية للعبور} = \frac{\text{عدد الأفراد ذوي التركيبات الجديدة}}{\text{العدد الإجمالي للأفراد}} \times 100$$


وقد استعمل Sturtevant (أحد طلبة Morgan) وحدة لقياس المسافة بين المورثات سماها وحدة cMg :  $cMg = 1\% \text{ من نسبة التركيبات الجديدة} / \text{نسبة حدوث العبور}$ .



نمثل المسافة بين مورثتين على شكل خريطة عاملية كما يوضح الشكل التالي :

سؤال : أحسب المسافة بين المورثتين في التمارين 1 و 2 ثم أجزر الخريطة العاملية.

التمرين 1



قصد دراسة كيفية انتقال الصفات الوراثية عند ثالثيات الصبغة الصبغية نقترح المعطيات الآتية:

- تبين الوثيقة 1 خريطيتين صبغيتين لذبابة الخل.

1- بعد مقارنة الخريطيتين استخلص الصبغة الصبغية لكل من الذكر والأنثى.(1.n)

- أجزر التزاوجات التجريبية الآتية عند سلالتين نقين من ذبابات الخل:

الزواج الأول: بين ذكور ذوي عيون بيضاء (W) وأجنحة متقطعة (C) و إناث متوجفات ذات عيون حمراء (W<sup>+</sup>) وأجنحة عاديّة (C<sup>+</sup>). أعطى جيلا F1 مكوناً من ذبابات متوجفات [C, W<sup>+</sup>] [C<sup>+</sup>, W<sup>+</sup>].

الزواج الثاني: بين إناث ذات عيون بيضاء وأجنحة متقطعة [C, W<sup>+</sup>] و ذكور سلالة متوجفة [C<sup>+</sup>, W<sup>+</sup>]. أعطى جيلا F1 مكوناً من إناث متوجفات وذكور ذوي عيون بيضاء وأجنحة متقطعة [W, C].

الزواج الثالث: بين ذبابات خل من الجيل F1 للزواج الثاني أعطى خلها F2 مكوناً من :

- 810 ذبابات ذات عيون حمراء وأجنحة عاديّة.

- 807 ذبابات ذات عيون بيضاء وأجنحة متقطعة.

- 131 ذبابة ذات عيون حمراء وأجنحة متقطعة.

- 128 ذبابة ذات عيون بيضاء وأجنحة متقطعة.

2- قارن نتائج التزاوجين الأول والثاني. ماذا تستنتج؟ (2.n)

3- أطع تفاصيل بعثة التزاوج الثالث. (2.n)

II- لمعرفة كمية النقل صنقى لون رطول الزغب من جيل لأخر عند الكلاب، نتّرح دراسة التزاوجين الآتيين :

- أعطى التزاوج الأول بين ذكر ذي مظهر ملون و زغب قصير [c+, s+] و أنثى ذات مظهر أهلي و زغب طويل [c, s].

- مكوناً من جراء ذات مظهر ملون و زغب قصير [c+, s+].

- أعطى التزاوج الثاني بين ذكر الجيل F1 فيما بينهم جيلا F2 مكوناً من :

+ جروا بمظهر ملون و زغب قصير

+ جروا بمظهر ملون و زغب طويل

+ جروا بمظهر أهلي و زغب قصير

+ جروا بمظهر أهلي و زغب طويل

2- باستغلال نتائج التزاوجين الأول والثاني ومستعيناً بشبكة التزاوج، فمسر كمية النقل المفتوحة للمورثتين المدروستين (2.5%).

3- بين الأهمية الوراثية للظاهرة المسؤولة عن ظهور جراء بمظهر أهلي و زغب قصير، وجراء بمظهر ملون و زغب طويل. (0.5%).