

التمرين 1: bac_pc_2015_Nor

4	• استثمار نتائج التزاوج الأول : - الهجونة الأحادية: دراسة انتقال صفة واحدة (لون الفرو)..... - الآباء من سلالة نقية والخلف F_1 غير متجانس ← عدم تحقق القانون الأول لماندل ← الوراثة مرتبطة بالجنس والمورثة المدروسة محمولة على الصبغي X..... - ظهور مظهر خارجي وسيط عند الخلف الأنثوي ← تساوي السيادة.....	0.25 ن 0.5 ن 0.25 ن									
	• استثمار نتائج التزاوج الثاني : - الجيل الأول F'_1 متجانس والآباء من سلالة نقية ← تحقق القانون الأول لماندل ← وراثة غير مرتبطة بالجنس (التزاوج العكسي يعطي نفس النتيجة)..... - الجيل F'_1 يشبه أحد الأبوين ← سيادة تامة للحيلى المسؤول عن الزغب القصير (L) على الحيلى المسؤول عن الزغب الطويل (l)..... - المورثتان المدروستان مستقلتان.....	0.25 ن 0.25 ن 0.25 ن									
5	التفسير الصبغي للتزاوج الثالث : ♀ x ♂ المظهر الخارجي: [BN,l] × [B,l] النمط الوراثي: $X_B X_N \ell / \ell$ × $X_B Y \ell / \ell$ الأمشاج: $X_B \ell$ 50% $X_N \ell$ 50% $X_B \ell$ 50% $Y \ell$ 50% إنجاز شبكة التزاوج : <table border="1"> <tr> <td></td><td>$X_B \ell$ 50%</td><td>$Y \ell$ 50%</td></tr> <tr> <td>$X_B \ell$ 50%</td><td>$X_B X_B \ell / \ell$ ♀ [B,l] 25%</td><td>$X_B Y \ell / \ell$ ♂ [B,l] 25%</td></tr> <tr> <td>$X_N \ell$ 50%</td><td>$X_B X_N \ell / \ell$ ♀ [BN,l] 25%</td><td>$X_N Y \ell / \ell$ ♂ [N,l] 25%</td></tr> </table> النتائج النظرية : - $[B,l] \text{ ♂ } 25\%$; $[N,l] \text{ ♂ } 25\%$ - - $[BN,l] \text{ ♀ } 25\%$; $[B,l] \text{ ♀ } 25\%$ -		$X_B \ell$ 50%	$Y \ell$ 50%	$X_B \ell$ 50%	$X_B X_B \ell / \ell$ ♀ [B,l] 25%	$X_B Y \ell / \ell$ ♂ [B,l] 25%	$X_N \ell$ 50%	$X_B X_N \ell / \ell$ ♀ [BN,l] 25%	$X_N Y \ell / \ell$ ♂ [N,l] 25%	0.5 ن 0.25 ن
	$X_B \ell$ 50%	$Y \ell$ 50%									
$X_B \ell$ 50%	$X_B X_B \ell / \ell$ ♀ [B,l] 25%	$X_B Y \ell / \ell$ ♂ [B,l] 25%									
$X_N \ell$ 50%	$X_B X_N \ell / \ell$ ♀ [BN,l] 25%	$X_N Y \ell / \ell$ ♂ [N,l] 25%									

التمرين 2: bac_pc_2014_Rat

4	- الجيل F_1 متجانس إذن تحقق القانون الأول لماندل - الحيلى المسؤول عن "الساق الطويلة" سائد والحيلى المسؤول عن "الساق القصيرة" متنحي. - الحيلان المسؤولان عن "لون الأزهار" متساويا السيادة. - التزاوج الثاني : نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب أصغر من نسبة المظاهر الخارجية الأبوية إذن المورثتان مرتبطتان.	0.25 0.25 0.25 0.25
5	التزاوج الأول: - المظهر الخارجي للآباء: $[l, B] \times [L, R]$ - النمط الوراثي للآباء: $\frac{\ell}{\ell} \frac{B}{B} \times \frac{L}{L} \frac{R}{R}$ - النمط الوراثي للأمشاج: $\frac{\ell}{\ell} \frac{B}{B} 100\% \times \frac{L}{L} \frac{R}{R} 100\%$ - النمط الوراثي لـ F_1: $\frac{\ell}{\ell} \frac{B}{B} 100\%$	0.25 0.25

هذا المسلك تم تحديثه من موقع : www.alahia.net

التزاوج الثاني:

- المظهر الخارجي للآباء :

- النمط الوراثي للآباء:

- النمط الوراثي للأمشاج : $L \underline{R}$

شبكة التزاوج:

	$\underline{l \ B}$ 40.66%	$\underline{l \ R}$ 9.16%	$\underline{L \ B}$ 8.83%	$\underline{L \ R}$ 41.33%
$\underline{l \ B}$ 100%	$\underline{l \ B}$ $\underline{l \ B}$ [l, B]40.66%	$\underline{l \ R}$ $\underline{l \ B}$ [l, BR]9.16%	$\underline{L \ B}$ $\underline{l \ B}$ [L, B] 8.83%	$\underline{L \ R}$ $\underline{l \ B}$ [L, BR] 41.33%

المسافة الفاصلة بين المورثتين لون الأزهار وطول الساق:

..... 18 CMg أي $(110 + 106)/1200 = 18\%$

الخرائط العاملة:

الإمكانية الأولى:

Diagram illustrating the first possible map (الإمكانية الأولى). A horizontal line represents the chromosome. A tick mark on the left is labeled 'لون الأزهار' (Flower color). A tick mark in the middle is labeled 'طول الساق' (Stem length). A tick mark on the right is labeled 'لون الأزهار' (Flower color). The distance between the first and second tick marks is labeled '8 CMg'. The distance between the second and third tick marks is labeled '18 CMg'. Below the line, the labels 'لون الأزهار', 'طول الساق', and 'لون الأزهار' are aligned with their respective tick marks.

الإمكانية الثانية:

Diagram illustrating the second possible map (الإمكانية الثانية). A horizontal line represents the chromosome. A tick mark on the left is labeled 'لون الأزهار' (Flower color). A tick mark in the middle is labeled 'طول الساق' (Stem length). A tick mark on the right is labeled 'لون الأزهار' (Flower color). The distance between the first and second tick marks is labeled '18 CMg'. The distance between the second and third tick marks is labeled '8 CMg'. Below the line, the labels 'لون الأزهار', 'طول الساق', and 'لون الأزهار' are aligned with their respective tick marks.

التمرين 3: bac_pc_2014_Nor

0.25	II - التزاوج الأول:
0.25	- الجيل F_1 متجانس إذن الأبوان من سلالتين نقيتين حسب القانون الأول لماندل
0.25	- التحليل المسؤول عن وجود الفرو سائد على التحليل المسؤول عن غياب الفرو والتحليل المسؤول عن الأرجل العادية سائد على التحليل المسؤول عن الأرجل المشوهة.....
0.25	+ التزاوج الثاني: نسبة المظاهر الخارجية الأبوية أكبر من نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب إذن المورثتان المدروستان مرتبطتان

4

+ التزاوج الأول:

المظاهر الخارجية (الآباء) :

النمط الوراثي :

[d, n]

x

[D, N]

d n

D N

d n

D N

100% d n

100% D N

الأمشاج :

D N

d n

الجيل F₁:

100% [D, N]

+ التزاوج الثاني:

الآباء :

المظاهر الخارجية:

النمط الوراثي:

فرد ثنائي التحي

x

F₁

[d, n]

[D, N]

d n

D N

d n

d n

↓

↓

d n

D n

d N

D N

d n

100%

11%

11%

39%

39%

الأمشاج

شبكة التزاوج .

الأمشاج	<u>D</u> n 11%	<u>d</u> <u>N</u> 11%	<u>D</u> <u>N</u> 39%	<u>d</u> <u>n</u> 39%
<u>d</u> <u>n</u> 100%	<u>D</u> n d n [D, n] 11%	<u>d</u> <u>N</u> d n [d, N] 11%	<u>D</u> <u>N</u> d n [D, N] 39%	<u>d</u> <u>n</u> d n [d, n] 39%

النتائج النظرية تطابق النتائج التجريبية

Talamid ma : قه بليلة الحق

2

- التزاوج الأول :


- يختلف الأبوان بصفقتين . يتعلق الأمر بهجونة ثنائية.
- تجانس أفراد الجيل F1 ، إذن الأبوان من سلالة نقية (تحقق القانون الأول لماندل) .
- سيادة الحليل C+ المسؤول عن المظهر الملون على الحليل C المسؤول عن المظهر الأمهق .
- سيادة الحليل S+ المسؤول عن الزغب القصير على الحليل S المسؤول عن الزغب الطويل

1

- التزاوج الثاني : تزاوج هجاء F1 أعطي جيلا F2 تتوزع المظاهر الخارجية لأفراده وفق النسب 9/16, 3/16, 3/16, 1/16 ، إذن المورثتان مستقلتان.....


0,25

- التفسير الصبغي للتزاوج الأول :



0,5

- التفسير الصبغي للتزاوج الثاني :



0,75

شبكة تزاوج صحيحة:

نحصل على مظاهر خارجية جديدة التركيب بنسبة 6/16 ([C S+] 3/16 و [C+ S] 3/16) ومظاهر خارجية أبوية بنسبة 10/16 ([C S] 1/16 و [C+ S+] 9/16) تطابق هذه النتائج النظرية النتائج التجريبية المحصلة ما يؤكد استقلالية المورثتين.....

3

- تتجلى الظاهرة في التخليط البيصبغي للحليلات و تكمن أهميتها في تنوع الأفراد بالحصول على مظاهر خارجية جديدة التركيب.....

0,5

التمرين 5: bac_pc_2012_Rat

3

- II - التزاوج اختباري تم بين نبتة هجينة ذات المظهر الخارجي السائد ونبتة ثنائية التحي.....
- نسب المظاهر الخارجية المحصلة مقارنة ما يدل أن المورثتين مستقلتان.....
- التفسير الصبغي :

0.25

0.25

0.5

1

المظاهر الخارجية (الآباء) : [H,D] x [h,d]

الأنماط الوراثية : H//h D//d x h//h d//d

الأمشاج : 25% H/ D/ ; 25 % H/ d/ ; 25% h/ D/ ; 25% h/ d/ 100% h/ d/

شبكة التزاوج:

الأمشاج	H/ D/ 25%	H/ d/ 25%	h/ D/ 25%	h/ d/ 25%
h/ d/ 100%	H//h D//d [H,D] 25%	H//h d//d [H,d]25%	h//h D//d [h,D]25%	h//h d//d [h,d]25%

4

- يسمح التزاوج الاختباري بتحديد عدد أنواع الأمشاج المنتجة من قبل النبتة (الفرد) المختبرة ذات المظهر الخارجي السائد وبالتالي تحديد نمطها الوراثي

0.75

1

التزاوج الأول:

- يتعلق الأمر بهجونة ثنائية؛
- الجيل F_1 متجانس بالنسبة للصفات: تحقق القانون الأول لماندل؛
- سيادة الحليل R المسؤول عن "عيون حمراء" على الحليل p المسؤول عن "عيون أرجوانية"؛
- سيادة الحليل L المسؤول عن "أجنحة طويلة" على الحليل u المسؤول عن "أجنحة أثرية"؛
- التزاوج الثاني: الحصول على نسبة عالية من المظاهر الخارجية الأبوية (87%) مقارنة مع نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب (13%)، يدل على أن المورثتين مرتبطتان.

2

- التفسير الصبغي للتزاوج الأول:

ذ. محمد اشباني

المظاهر الخارجية (الأباء): $[p, u]$ x $[R, L]$
 النمط الوراثي: $p u // p u$ x $R L // R L$
 الأمشاج: $p u /$ x $R L /$
 الجيل F_1 : $R L // p u$
 100% $[R, L]$

- التفسير الصبغي للتزاوج الثاني:

الأباء: ♂ $[p, u]$ x ♀ $[R, L]$
 النمط الوراثي: $p u // p u$ x $R L // p u$
 الأمشاج: $p u /$ x $R L /$, $p u /$, $R u /$, $p L /$
 شبكة التزاوج:

الأمشاج ♀ \ ♂	$R L /$ 43.5%	$p u /$ 43.5%	$R u /$ 6.5%	$p L /$ 6.5%
الأمشاج ♂	$R L // p u$ [R, L] 43.5%	$p u // p u$ [p, u] 43.5%	$R u // p u$ [R, u] 6.5%	$p L // p u$ [p, L] 6.5%

مظاهر خارجية أبوية

مظاهر خارجية جديدة التركيب

التمرين 7: bac_pc_2011_Rat

1


- مقارنة وتحديد صحيح للصيغة الصبغية لكل من الذكر والأنثى.

2

- في التزاوج الأول: الحصول على جيل متجانس في الجيل الأول (تحقق القانون الأول لماندل) وعلى جيل غير متجانس حسب الجنس في التزاوج الثاني (الإناث متوحشات $[W^+, C^+]$ ، الذكور متحوشات $[W, C]$).
- الاستنتاج: يتعلق الأمر بـ:
 - هجونة ثنائية؛
 - وراثة مرتبطة بالجنس: المورثتان محمولتان على الصبغي X؛
 - سيادة الحليل W^+ على الحليل W ؛
 - سيادة الحليل G^+ على الحليل G .

ذ. محمد اشباني

التفسير الصبغي للتزاوج الثالث:
+ حصول نسبة عالية من المظاهر الخارجية الأبوية مقارنة مع نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب، يدل على أن المورثتين مرتبطتان.
+ التفسير الصبغي:



شبكة التزاوج:

الأمشاج ♀ \ ♂	$X_{W^+C^+}$ 43%	X_{W^+C} 7%	X_{wc^+} 7%	X_{wc} 43%
X_{wc} 50%	$X_{W^+C^+} X_{wc}$ [W ⁺ , C ⁺] 21,5%	$X_{W^+C} X_{wc}$ [W ⁺ , C] 3,5%	$X_{wc^+} X_{wc}$ [W, C ⁺] 3,5%	$X_{wc} X_{wc}$ [W, C] 21,5%
Y 50%	$X_{W^+C^+} Y$ [W ⁺ , C ⁺] 21,5%	$X_{W^+C} Y$ [W ⁺ , C] 3,5%	$X_{wc^+} Y$ [W, C ⁺] 3,5%	$X_{wc} Y$ [W, C] 21,5%

- نحصل على:

- 43% ذبابات ذات عيون حمراء وأجنحة عادية؛
 - 43% ذبابات ذات عيون بيضاء وأجنحة متقطعة؛
 - 7% ذبابات ذات عيون حمراء وأجنحة متقطعة؛
 - 7% ذبابات ذات عيون بيضاء وأجنحة عادية.
- + تطابق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية.

التمرين 8: bac_pc_2011_Nor

- التزاوج الأول : هجونة ثنائية؛ اختلاف الأبوين بصفتين (لون الزغب وتساقط الزغب أو عدم تساقطه).

- التحليل المسؤول عن الزغب وحيد اللون M سائد والتحليل المسؤول عن الزغب المبقع اللون m متنحي.

- التحليل المسؤول عن الزغب غير المتساقط N سائد والتحليل المسؤول عن الزغب المتساقط n متنحي.

- التزاوج الثاني : تزاوج اختباري بين هجين F1 وفار ثنائي التنحي.....

- نسبة الأفراد ذوي المظاهر الخارجية [M و N] و [m و n] الأبوية تفوق نسبة الأفراد ذوي المظاهر الخارجية جديدة التركيب [M و n] و [N و m] ، المورثتان مرتبطتان

* النمط الوراثي للأباء : $MN//MN$ x $mn//mn$

* النمط الوراثي لأفراد الجيل F1 $MN//mn$

- شبكة التزاوج :

الأنماط الوراثية والمظاهر الخارجية:

F_1	$MN//mn$	$[M,N]$	x	$mn//mn$	$[m,n]$
$Mn/$	$mN/$	$MN/$	$mn/$	$mn/$	
4,30%	5,37%	43%	47,31%	100%	الأمشاج

0,5	2	- أعطى التزاوج الأول جيلا F1 متجانسا يتكون من ذبذبات ذات جسم رمادي وأهداب عادية، نستنتج أن الأبوين من سلالتين نقيتين وأن التحليل المسؤول عن المظهر الخارجي جسم رمادي والتحليل المسؤول عن المظهر الخارجي أهداب عادية سائدان، وأن التحليل المسؤول عن المظهر الخارجي جسم أسود والتحليل المسؤول عن المظهر الخارجي أهداب معقوفة متنحيان.
0,25		- التزاوج الثاني عبارة عن تزاوج اختبائي، أعطى هذا التزاوج مظاهر خارجية أبوية بنسبة كبيرة (94,5%) ومظاهر خارجية جديدة التركيب بنسبة ضعيفة (5,5%)، نستنتج أن المورثتين المسؤولتين عن الصفتين لون الجسم وشكل الأهداب مرتبطتان. - التفسير الصبغي للتزاوج الأول: الأبوان: جسم رمادي وأهداب عادية $[c+,n+]$ x جسم أسود وأهداب معقوفة $[c,n]$ النمط الوراثي: $cn//cn$ x $c+n+//c+n+$ الأمشاج: $cn/$ x $c+n+/$ الجيل F1: $[c+,n+]$ $c+n+//cn$ 100%

- التفسير الصبغي للتزاوج الثاني:

أنثى من الجيل F1 $[c+,n+]$ x ذكر ثنائي التتحي $[c,n]$

النمط الوراثي: $cn//cn$ x $c+n+//cn$

الأمشاج: $cn/$ 100% $c+n+/$, $c+n/$, $c+n+/$, $c+n/$

شبكة التزاوج:

$cn/$	$cn+/$	$c+n/$	$c+n+/$	
$cn//cn$	$cn+//cn$	$c+n//cn$	$c+n+//cn$	$cn/$ 100%
$[c,n]$	$[c,n+]$	$[c+,n]$	$[c+,n+]$	

0,75

تمثيل صحيح لظاهرة العبور وظاهرة التخليط الضمصي للمورثتين المدروستين وذلك بدأ بخلية أم للأمشاج مع إبراز مواقع الحيللات على الصبغيات ونتيجة هذا التخليط (4 أنماط من الأمشاج).

3

1

التمرين 10: bac_pc_2010_Nor

0,25	1	التمرين الثاني (5 ن) - تحديد السيادة: - التفسير الصبغي لنتيجة التزاوج الأول: النمط الوراثي للأبوين: $N//N$ $\ell//\ell$ x $n//n$ $L//L$ الأمشاج: $N/\ell/$ 100% $n/L/$ 100% الجيل F1: $[NL]$ $N//n$ $L//\ell$ 100% أمشاج هجاء الجيل F1: $N/L/$ 25% $N/\ell/$ 25% $n/L/$ 25% $n/\ell/$ 25% - إنجاز شبكة تزاوج الجيل F2: المظاهر الخارجية المنتظرة في الجيل F2: $[N,L]$ بنسبة 9/16 و $[N,\ell]$ بنسبة 3/16 و $[n,L]$ بنسبة 3/16 و $[n,\ell]$ بنسبة 1/16.
0,5	2	- لا يمكن التعرف على أفراد السلالة النقية لكون المظهر الخارجي $[N,L]$ له أربع أنماط وراثية مختلفة: $N//N$ $L//L$ و $N//n$ $L//L$ و $N//N$ $L//\ell$ و $N//n$ $L//\ell$ - التزاوج المطلوب لعزل أفراد السلالة النقية هو: $[N,L]$ مع فرد ثنائي التتحي $[n,\ell]$ التعليل: في حالة السلالة النقية نحصل على جيل متجانس $[N,L]$ كما هو مبين في التفسير الصبغي الآتي: $[n,\ell]$ ثنائي التتحي x $[N,L]$ الأمشاج: $100\% n/\ell/$ $100\% N/L/$ الجيل المحصل عليه: $100\% N//n$ $L//\ell$ $[N,L]$

0.75 ن 0.5 ن 0.5 ن 1 ن	II- 3 <u>التزاوج الأول:</u> - تجانس أفراد الجيل المحصل عليه يدل على أن الآباء A و D من سلالتين نقيتين بالنسبة للصفاتين. - التحليل المسؤول عن صفة الساق الطويل سائد والتحليل المسؤول عن صفة الساق القصير متنحي. - التحليل المسؤول عن صفة لون الأزهار الحمراء سائد والتحليل المسؤول عن صفة الأزهار البيضاء متنحي. <u>التزاوج الثاني:</u> عدم تجانس الجيل المحصل عليه فيما يخص طول الساق يدل على أن النبتة B مختلفة الاقتران بالنسبة لهذه الصفة. تجانس الجيل المحصل عليه بالنسبة لصفة لون الأزهار يدل على أن النبتة B متشابهة الاقتران بالنسبة للون (الأحمر). <u>التزاوج الثالث:</u> يدل الحصول على 4 مظاهر خارجية بنسب 25% لكل مظهر على أن النبتة C مختلفة الاقتران بالنسبة للصفاتين وعلى أن المورثتين المدروستين مستقلتان. (نتائج تزاوج اختباري.....) 4- أ- الأنماط الوراثية : النبتة A: $N/N \ R/R$ النبتة B: $N/n \ R/R$ النبتة C: $N/n \ R/r$ النبتة D: $n/n \ r/r$ <u>التزاوج الثاني:</u> - النمط الوراثي للآباء: $N/n \ R/R \times n/n \ r/r$	3 4 1 1
--	--	-------------------------------------


التمرين 12: bac_svt_2015_Rat

(التمرين الثاني 4)


0.25 0.25 0.25 0.5 0.25	1 <u>التزاوج الأول :</u> - الأبوين من سلالتين نقيتين : الجيل F_1 متجانس حسب القانون الأول لماندل..... - التحليل "فرو رمادي" سائد G و التحليل "فرو أبيض" متنح b : أفراد الجيل F_1 لهم المظهر الخارجي فرو رمادي..... - التحليل "زغب قصير" سائد C و التحليل "زغب طويل" متنح c : أفراد الجيل F_1 لهم المظهر الخارجي زغب قصير..... <u>التزاوج الثاني :</u> - نسبة المظاهر الخارجية الأبوية (87,95 %) أكبر من نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب (12,15 %) إذن فالمورثتين المسؤولتين عن الصفتين المدروستين مرتبطتين..... <u>التزاوج الأول:</u> الأبوان : المظهر الخارجي : النمط الوراثي : الأمشاج : الجيل F_1 :	1
--	---	----------

0.25

فرو أبيض
زغب طويل
[b, e]




فرد من الجيل



الأبوان :

المظهر الخارجي :



$\frac{G}{+} \frac{C}{+}$	$\frac{b}{+} \frac{e}{+}$	$\frac{G}{+} \frac{e}{+}$	$\frac{b}{+} \frac{C}{+}$	
$\frac{G}{+} \frac{C}{+}$	$\frac{b}{+} \frac{e}{+}$	$\frac{G}{+} \frac{e}{+}$	$\frac{b}{+} \frac{C}{+}$	
[G, C] 44,68%	[b, e] 43,26%	[G, e] 6,38%	[b, C] 5,67%	

0.5

التمرين 13: bac_svt_2015_Nor

0.25

0.25


أ . استنتاج : تساوي السيادة بين الحليل المسؤول عن الذيل الطويل L و الحليل المسؤول عن غياب الذيل A
التعليل: الجيل F1 متجانس بمظهر خارجي وسيط مخالف لمظهري الأبوين.
ب . التأويل الصبغي للتزاوجين
- التزاوج الأول :

بدون ذيل

X

بذيل طويل

الأبوان :



المظهر الخارجي :

النمط الوراثي:

الأمشاج:

100%

100%

0.5

100% [LA]

الجيل الأول F1:

- التزاوج الثاني :

F1 ذكر

X

F1 أنثى

الأبوان :

[LA]

[LA]

المظهر الخارجي :

النمط الوراثي:

0.5

50% 50%

50% 50%

الأمشاج:

شبكة التزاوج:

$\frac{A}{+}$ 50%	$\frac{L}{+}$ 50%	
$\frac{L}{+} \frac{A}{+}$ [LA] 25%	$\frac{L}{+} \frac{L}{+}$ [L] 25%	$\frac{L}{+}$ 50%
$\frac{A}{+} \frac{A}{+}$ [A] 25%	$\frac{L}{+} \frac{A}{+}$ [LA] 25%	$\frac{A}{+}$ 50%

د. محمد اشباني

0.5

نحصل في الجيل F2 على النسب التالية : [L] 25% ، [LA] 50% ، [A] 25%
هذه النتائج تتطابق مع النتائج التجريبية : [L] 23,40 % ، [LA] 51,06 % ، [A] 25,53 %

تفسير نتيجة التزاوج الثالث مستعيا بسنكة التزاوج :
الكلاب بدون زغب مختلفي الاقتران إذن التحليل المسؤول عن غياب الزغب سائد N ، و التحليل المسؤول عن وجود الزغب متنح n.

يقبل الجواب : أدى تزاوج الكلاب بدون زغب بينها إلى ظهور أفراد بزغب عاد إذن فالتحليل زغب عادي متنح n
و التحليل المسؤول عن غياب الزغب سائد N.

الأبوان : أنثى بدون زغب × ذكر بدون زغب

[N]

N
N
n

n 1/2
N 1/2

[N]

N
N
n

n 1/2
N 1/2

المظهر الخارجي :

النمط الوراثي :

الأمشاج :

شبكة التزاوج :

n 1/2	N 1/2	
N 1/4	(نمط وراثي مميت) 1/4	N 1/2
n 1/4	[N] 1/4	n 1/2

النتائج النظرية : 3/4 [N] ، 1/4 [n] تخالف النتائج التجريبية : 2/3 [N] ، 1/3 [n]
يمكن تفسير ذلك بكون الأفراد متشابهي الاقتران بالنسبة للتحليل السائد (N/N) غير قابلين للحياة لوجود مورثة مميتة.

النتيجة المنتظرة من التزاوج الرابع :

بدون زغب
وبذيل طويل

[N,L]

N L
N L
n L

N 1/2
n 1/2

بدون زغب
وبذيل قصير

[N,LA]

N L
N L
n A

N 1/4
N 1/4
n 1/4
n 1/4

الأبوان :

المظهر الخارجي :

النمط الوراثي :

الأمشاج :

شبكة
التزاوج :

n A 1/4	n L 1/4	N A 1/4	N L 1/4	
N L 1/8	N L 1/8	N L 1/8	N L 1/8	N L 1/2
[N,LA] 1/8	[N,L] 1/8	(نمط وراثي مميت) 1/8	(نمط وراثي مميت) 1/8	
n A 1/8	n L 1/8	N A 1/8	N L 1/8	n L 1/2
[n,LA] 1/8	[n,L] 1/8	[N,LA] 1/8	[N,L] 1/8	

باعتبار الأنماط الوراثية المميتة فإن النتائج المنتظرة من هذا التزاوج هي : 2/6 [N ; LA] ; 2/6 [N ; L] ; 1/6 [n ; LA] ; 1/6 [n ; L]

التمرين 14 : bac_svt_2014_Rat

أعطي التزاوج الأول بين أنثى ذات جسم أخضر وذكر ذو جسم أصفر جيلا متجانسا بلون أخضر. إذن التحليل المسؤول عن اللون الأخضر سائد والتحليل المسؤول عن اللون الأصفر متنحي.
أعطى التزاوج العكسي جيلا غير متجانس (ذكور بجسم أصفر وإناث بجسم أخضر). عدم تحقق القانون الأول لماندل. يتعلق الأمر بمورثة مرتبطة بالصبغي الجنسي X.

تفسير التزاوج الثاني

الأنثى من الجيل F1 مختلفة الاقتران والمورثة مرتبطة بالجنس: نمطها الوراثي هو $X_G X_g$
الذكر بلون أصفر نمطه الوراثي هو: $X_g Y$

الأباء: $X_g Y \times X_G X_g$

الأمشاج: $\frac{1}{2} X_g \quad \frac{1}{2} Y \quad \times \quad \frac{1}{2} X_G \quad \frac{1}{2} X_g$

د. محمد اشيباني

$\frac{1}{2} X_G$	$\frac{1}{2} X_g$	♀	♂
$\frac{1}{4} X_G X_g [G]$ ♀	$\frac{1}{4} X_g X_g [g]$ ♀	$\frac{1}{2} X_g$	
$\frac{1}{4} X_G Y [G]$ ♂	$\frac{1}{4} X_g Y [g]$ ♂	$\frac{1}{2} Y$	

0.75 تتوافق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية.....

تفسير التزاوج الثالث

الآباء: $X_G Y \text{ ♂} \times X_G X_g \text{ ♀}$

الأمشاج: $\frac{1}{2} X_G \quad \frac{1}{2} Y \quad \frac{1}{2} X_G \quad \frac{1}{2} X_g$

شبكة التزاوج:

$\frac{1}{2} X_G$	$\frac{1}{2} X_g$	♀	♂
$\frac{1}{4} X_G X_G [G]$ ♀	$\frac{1}{4} X_G X_g [G]$ ♀	$\frac{1}{2} X_G$	
$\frac{1}{4} X_G Y [G]$ ♂	$\frac{1}{4} X_g Y [g]$ ♂	$\frac{1}{2} Y$	

0.75 لدينا 50% إناث جسمهن أخضر و 25% ذكور جسمهم أخضر و 25% ذكور جسمهم أصفر. تتوافق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية.....

التمرين 15: bac_svt_2014_Nor

0.25 1 التزاوج الأول :
0.25 • الجيل F_1 متجانس إذن الأبوان من سلالتين نقيتين حسب القانون الأول لماندل.....
• الحليان المسؤولان عن شكل الفجل متساويا السيادة.....

2 التفسير الصبغي للتزاوج الأول:
الأبوان : شكل كروي $\times$ شكل طويل
المظهر الخارجي : $[L] \text{ ♂} \times [G] \text{ ♀}$
النمط الوراثي : $L/L \quad G/G$
الأمشاج : $100\% L/ \quad G/ 100\%$
الجيل F_1 : $[GL] \quad G // L 100\%$
التفسير الصبغي للتزاوج الثاني:
الأبوان : شكل كروي $\times$ شكل كروي
المظهر الخارجي : $[GL] \text{ ♂} \times [GL] \text{ ♀}$
النمط الوراثي : $G//L \quad G//L$
الأمشاج : $G/ 1/2 \quad G/ 1/2$
شبكة التزاوج :
 $L/ \quad \frac{1}{2} \quad L/ \quad \frac{1}{2}$

$G/ \quad \frac{1}{2}$	$L/ \quad \frac{1}{2}$
$G//G [G] \quad \frac{1}{4}$	$G//L [GL] \quad \frac{1}{4}$
$G//L [GL] \quad \frac{1}{4}$	$L//L [L] \quad \frac{1}{4}$

0.75 حصلنا على $\frac{1}{4} [G]$ و $\frac{1}{2} [GL]$ و $\frac{1}{4} [L]$. تتطابق النتائج التجريبية مع النتائج النظرية

3 أ أعطى التزاوج بين فردين يختلفان من حيث لون البشرة وشكل الفجل جيلا أولا متجانسا جميع أفراد بلون وردي وشكل كروي. الأبوان من سلالتين نقيتين حسب القانون الأول لماندل. هناك تساوي السيادة كذلك فيما يخص صفة اللون.....
ب التفسير الصبغي:
الأبوان : $[L ; B] \times [G ; R]$
النمط الوراثي : $L//L \quad B//B \quad G//G \quad R//R$
الأمشاج : $L/B/ 100\% \quad G/R/ 100\%$
الجيل F_1 : $G//L \quad R//B$
 $[GL ; BR] 100\%$

4 التفسير الصبغي:
الأبوان : لون وردي وشكل طويل $\times$ لون وردي وشكل بيضوي
النمط الوراثي : $L//L \quad R//B \quad G//L \quad R//B$
الأمشاج : $L/R/ \quad \frac{1}{2} \quad L/B/ \quad \frac{1}{2} \quad G/R/ \quad \frac{1}{4} \quad G/B/ \quad \frac{1}{4} \quad L/R/ \quad \frac{1}{4} \quad L/B/ \quad \frac{1}{4}$
0.25 د. محمد اشباني

L/ B/ ¼	L/ R/ ¼	G/ B/ ¼	G/ R/ ¼	
L//L B//B [L, B] 1/8	L//L R//B [L,RB] 1/8	G//L B//B [GL, B] 1/8	G//L R//B [GL,RB] 1/8	L/ B/ ½
L//L R//B [L,RB] 1/8	L//L R//R [L,R] 1/8	G//L R//B [GL,RB] 1/8	G//L R//R [GL,R] 1/8	L/ R/ ½

1

حصلنا على:

[GL,RB] 2/8 بلون وردي وشكل بيضوي؛

[L,RB] 2/8 بلون وردي وشكل طويل؛

[GL,R] 1/8 بلون أحمر وشكل بيضوي؛

[GL, B] 1/8 بلون أبيض وشكل بيضوي؛

[L, B] 1/8 بشكل طويل ولون أبيض؛

[L,R] 1/8 بشكل طويل ولون أحمر.

إذن النتائج النظرية تتوافق مع النتائج التجريبية

0.25

التمرين 16 : bac_svt_2013_Rat

1

التزاوج الأول :

0.25 • الجيل F_1 متجانس إذن القانون الأول لماندل قد تحقق

0.25 • التحليل المسؤول عن العرف المورد سائد على التحليل المسؤول عن العرف العادي

- التزاوج الثاني :

0.25 • التحليل المسؤول عن أرجل قصيرة سائد ومميت في حالة تشابه الاقتران

2

التفسير الصبغي للتزاوج الأول:

الابوان :

المظهر الخارجي : ♂ [r] × [R] ♀

النمط الوراثي : r/r R/R

الأمشاج : r/ R/

0.25 الجيل F_1 : 100% r // R

0.25 التفسير الصبغي للتزاوج الثاني:

الابوان :

المظهر الخارجي : ♂ [L] × [L] ♀

النمط الوراثي : L//l L//l

الأمشاج : L/ 1/2 L/ 1/2

0.25 و l/ ½ l/ ½

شبكة التزاوج :

	L/ ½	l/ ½
L/ ½	L//L	L//l 1/3
l/ ½	l//L 1/3	l//l 1/3

تتطابق النتائج التجريبية مع النتائج النظرية

0.5

3

التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثالث:

0.25 - النمط الوراثي للابوين : $\frac{R}{r} \frac{L}{l}$. التعليل: الحصول في الجيل F_2 على أفراد بعرف عادي، والأفراد ذوو الأرجل القصيرة مختلفو الاقتران

المظهر الخارجي : [RL] × [RL]

النمط الوراثي : $\frac{R}{r} \frac{L}{l}$

الأمشاج : $\frac{1}{2} R \frac{1}{2} L$

$\frac{1}{2} r \frac{1}{2} l$

0.25

0.25

1

بالنسبة للتزاوج الأول:

0.25

- F_1 متجانس ← تحقق القانون الأول لماندل
- التحليل المسؤول عن أجنحة طويلة سائد على التحليل المسؤول عن أجنحة أثرية والتحليل المسؤول عن عيون حمراء سائد على التحليل المسؤول عن عيون أرجوانية

0.25

- بالنسبة للتزاوج الثاني:

تزاوج إختباري ، لدينا نسبة المظاهر الخارجية الأبوية تفوق بكثير المظاهر الخارجية جديدة التركيب
 $TP=89,25\% > TR=10,73$ إذن المورثتان مرتبطتان ارتباطا نسبيا (استثناء القانون 3 لماندل).....
التفسير الصبغي:

0.5

التزاوج الأول:

$$[R,L] \times [r,\ell]$$

النمط الوراثي:



الأم شاج:




0.25


التزاوج الثاني:

$$[R,L] \times [r,\ell]$$

النمط الوراثي:



الأم شاج:




0.5

$\frac{R}{L}$ 47.16%	$\frac{R}{\ell}$ 5,42%	$\frac{r}{L}$ 5,31%	$\frac{r}{\ell}$ 42.09%	$\frac{\text{♀}}{\text{♂}}$
$\frac{R}{L}$ 47.16 [R,L]	$\frac{R}{\ell}$ 5,42% [R,ℓ]	$\frac{r}{L}$ 5,31% [r,L]	$\frac{r}{\ell}$ 42.09% [r,ℓ]	$\frac{r}{\ell}$ 100%

0.5

2

يفسر ظهور المظاهر الخارجية جديدة التركيب في F_2' بحدوث ظاهرة العبور الصبغي عند الأنثى أثناء تشكل الأمشاج .
 رسم تفسيري لظاهرة العبور



0.75

د. محمد اشباني

0.25	الجيل F1 متجانس والأبوان من سلالتين نقيتين: تحقق القانون الأول لماندل.....	1
0.25	حصلنا على مظهر خارجي وسيط: يتعلق الأمر بتساوي السيادة.....	
0.25	التفسير الصبغي التزاوج الأول: الأباء: النمط الوراثي: الأمشاج: أفراد F1: التزاوج الثاني: الأباء:	2
0.25	$\begin{array}{cc} [R] & \times & [B] \\ R/R & & B/B \\ R/ & & B/ \end{array}$	
0.25	[RB] 100% B//R	
0.25	$\begin{array}{cc} F1 & \times & F1 \\ B/R & & B/R \\ B/ \frac{1}{2} & R/ \frac{1}{2} & B/ \frac{1}{2} & R/ \frac{1}{2} \end{array}$	
0.5	$\begin{array}{cccc} \frac{1}{4} R/R & \frac{1}{4} B/R & \frac{1}{4} B/R & \frac{1}{4} B/B \\ [R] \frac{1}{4} & [BR] & [BR] & [B] \frac{1}{4} \end{array}$	الجيل F2

0.25	التزاوج الأول: - أفراد F ₁ متجانسون، إذن تحقق القانون الأول لماندل.....	1
0.25	- سيادة الحليل المسؤول عن الزغب الأسود على الحليل المسؤول عن الزغب المرقط. سيادة الحليل المسؤول عن عدم قابلية الزغب للتساقط على الحليل المسؤول عن قابلية الزغب للتساقط..	
0.25	التزاوج الثاني: - يعطي أربعة مظاهر خارجية مختلفة بنسب متفاوتة حيث نسبة المظاهر الأبوية تفوق نسبة المظاهر الجديدة التركيب (TP = 90.16% >> TR = 9,83%).....	
0.25	- إذن المورثنى المدروسثن مرتبطثن.....	
0.25	التفسير الصبغي: التزاوج الأول: النمط الوراثي: الأم شاج:	
0.25	$\begin{array}{cc} [N,H] & \times & [n,h] \\ \begin{array}{c} N & H \\ \hline N & H \end{array} & & \begin{array}{c} n & h \\ \hline n & h \end{array} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \begin{array}{c} N & H \\ \hline N & H \end{array} & & \begin{array}{c} n & h \\ \hline n & h \end{array} \end{array}$	
0.25	$\begin{array}{cc} 100\% & 100\% \\ \swarrow & \searrow \\ F1 & \begin{array}{c} N & H \\ \hline n & h \end{array} 100\% [NH] \end{array}$	
0.5	$\begin{array}{cc} [N,H] & \times & [n,h] \\ \begin{array}{c} N & H \\ \hline n & h \end{array} & & \begin{array}{c} n & h \\ \hline n & h \end{array} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \begin{array}{cccc} N & H & N & h & n & H & n & h \\ 48\% & 5,46\% & 4,37\% & 42\% & 100\% \end{array} \end{array}$	الأم شاج:

$\frac{N}{48\%}$	$\frac{N}{5,46\%}$	$\frac{n}{4,37\%}$	$\frac{n}{42\%}$	$\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$
$\frac{N}{48\%}$	$\frac{N}{5,46\%}$	$\frac{n}{4,37\%}$	$\frac{n}{42\%}$	$\frac{n}{100\%}$
$[N,H]$	$[N,h]$	$[n,H]$	$[n,h]$	

0.5 إذن النتائج التجريبية تطابق النتائج النظرية

التمرين 20: bac_svt_2011_Rat

- 0.25 هجونة ثنائية.....
- 0.25 - الجيل الأول متجانس اذن الابوين من سلالتين نقيتين حسب القانون الأول لماندل ذ. محمد اشباني
- 0.25 - سيادة الحليل المسؤول عن الزهور غير المنتظمة على الحليل المسؤول عن الزهور المنتظمة.
- تساوي السيادة بين الحليل المسؤول عن اللون الاحمر الحليل المسؤول عن اللون الأبيض(ظهور مظهر خارجي بسيط)

1

-التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الاول:

0.5 الأبوان : $[R,I] \times [B,g]$
 الأنماط الوراثية: $R//R \ I//I \times B//B \ g//g$
 الجيل الأول: $100\% \ R//B \ I//g \ [RB,I]$

- التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني:

0.5 الأبوان : $[RB,I] \times [RB,I]$
 الأنماط الوراثية: $R//B \ I//g \times R//B \ I//g$
 أمشاج أفراد الجيل F1: $\frac{1}{4} R/ I/ , \frac{1}{4} R/ g/ , \frac{1}{4} B/ I/ , \frac{1}{4} B/ g/$

2

$\frac{1}{4} B/ g/$	$\frac{1}{4} B/ I/$	$\frac{1}{4} R/ g/$	$\frac{1}{4} R/ I/$	
$R//B \ I//g$ $\frac{1}{16}$	$R//B \ I//I$ $\frac{1}{16}$	$R//R \ I//g$ $\frac{1}{16}$	$R//R \ I//I$ $\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} R/ I/$
$R//B \ g//g$ $\frac{1}{16}$	$R//B \ I//g$ $\frac{1}{16}$	$R//R \ g//g$ $\frac{1}{16}$	$R//R \ I//g$ $\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} R/ g/$
$B//B \ I//g$ $\frac{1}{16}$	$B//B \ I//I$ $\frac{1}{16}$	$R//B \ I//g$ $\frac{1}{16}$	$R//B \ I//I$ $\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} B/ I/$
$B//B \ g//g$ $\frac{1}{16}$	$B//B \ I//g$ $\frac{1}{16}$	$R//B \ g//g$ $\frac{1}{16}$	$R//B \ I//g$ $\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4} B/ g/$

1 $[B,I]=3/16, [R,I]=3/16, [BR,I]=6/16, [BR,g]=2/16, [R,g]=1/16, [B,g]=1/16$

0.25 الظاهرة المسؤولة عن التنوع الوراثي في الجيل الثاني هي التخليط البيصبغي الذي يحدث أثناء تشكل امشاج هجاء الجيل الأول خلال الطور الانفصالي الأول.....

التمرين 21: bac_svt_2011_Nor

- 0.75 - التزاوج الأول:
- يتعلق الأمر بهجونة ثنائية؛
 - الجيل الأول متجانس حسب القانون الأول لماندل، إذن الأبوان من سلالتين نقيتين؛
 - الحليل المسؤول عن الجسم الرمادي سائد (b+) سائد على الحليل المسؤول عن الجسم الأسود متنحي (b)، والحليل المسؤول عن الأجنحة العادية (c+) سائد على الحليل المسؤول عن الأجنحة المنحنية (c).
- المزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

1

Talamid.ma : موقع														
0.5	- التزاوج الثاني: • يتعلق الأمر بتزاوج اختباري بين فرد هجين من الجيل F1 وفرد ثنائي التنحي؛ • نسبة المظاهر الخارجية الأبوية (72,4%) أكبر من نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب (27,6%): فالمرورثتان المدروستان مرتبطتان.....													
0.5	- التفسير الصبغي للتزاوج الثاني: • المظاهر الخارجية: • الأنماط الوراثية : $b+ c+//b c$ $b c//b c$ • الأمشاج : $b+ c+ , b c / , b+ c , b c+ /$ $b c /$													
0.75	شبكة التزاوج : <table><tr><td>$b c+ /$ 13,6%</td><td>$b+ c$ 12,9%</td><td>$b c /$ 37%</td><td>$b+ c+ /$ 36,4%</td><td>F1 ثنائي التنحي</td></tr><tr><td>$b c+ // b c$ [b,c+] 12,9%</td><td>$b+ c // b c$ [b+,c] 12,9%</td><td>$b c // b c$ [b,c] 37%</td><td>$b+ c+ // b c$ [b+,c+] 36,4%</td><td>$b c /$ 100%</td></tr></table>				$b c+ /$ 13,6%	$b+ c$ 12,9%	$b c /$ 37%	$b+ c+ /$ 36,4%	F1 ثنائي التنحي	$b c+ // b c$ [b,c+] 12,9%	$b+ c // b c$ [b+,c] 12,9%	$b c // b c$ [b,c] 37%	$b+ c+ // b c$ [b+,c+] 36,4%	$b c /$ 100%
$b c+ /$ 13,6%	$b+ c$ 12,9%	$b c /$ 37%	$b+ c+ /$ 36,4%	F1 ثنائي التنحي										
$b c+ // b c$ [b,c+] 12,9%	$b+ c // b c$ [b+,c] 12,9%	$b c // b c$ [b,c] 37%	$b+ c+ // b c$ [b+,c+] 36,4%	$b c /$ 100%										
0.25	- الظاهرة المسؤولة عن التنوع الوراثي للمظاهر الخارجية هي ظاهرة العبور.....													
0.25	- تخطيط الحليلات (التخطيط الضمصيغي) أثناء تشكل أمشاج أفراد الجيل F1.....													

التمرين 22: bac_svt_2010_Rat

1

- التزاوج الأول:

- + مجونة ثنائية
- + جيل أول متجانس يؤكد أن الآباء من سلالة نقية (القانون الأول لماندل)
- + الحليل L سائد و l متنحي . تساوي السيادة بين R و B

- التزاوج الثاني:

- + تزاوج راجع
- + حساب النسب : 96% مظاهر خارجية أبوية - 4% مظاهر خارجية جديدة التركيب
- + المظاهر الخارجية الأبوية تفوق بكثير المظاهر الخارجية جديدة التركيب : المورثن مرتبطين
- + ظهور مظاهر خارجية جديدة التركيب تفسر بحدوث ظاهرة العبور

- شبكة التزاوج الأول:

- + الأنماط الوراثية للآباء :
- + الأمشاج الأبوية :

$$\frac{RL}{RL} \times \frac{B\ell}{B\ell}$$

RL x Bℓ	
الأمشاج الذكرية	$\frac{RL}{100\%}$
الأمشاج الأنثوية	$\frac{B\ell}{100\%}$
	100% [BR, L]

- شبكة التزاوج الثاني:

- + الأنماط الوراثية للآباء :
- + الأمشاج :

$$\frac{B\ell}{B\ell} \times \frac{RL}{B\ell}$$

Bℓ x RL ; Bℓ ; Rℓ ; B L				
الأمشاج الذكرية	$\frac{RL}{48,95\%}$	$\frac{B\ell}{47,20\%}$	$\frac{R\ell}{2,09\%}$	$\frac{B L}{1,74\%}$
الأمشاج الأنثوية	$\frac{RL}{48,95\%}$	$\frac{B\ell}{47,20\%}$	$\frac{R\ell}{2,09\%}$	$\frac{B L}{1,74\%}$
	$\frac{RL}{48,95\%}$	$\frac{B\ell}{47,20\%}$	$\frac{R\ell}{2,09\%}$	$\frac{B L}{1,74\%}$

تؤكد شبكة التزاوج النظرية النتائج التجريبية المحصلة

2	- إنجاز تزاوج بين نباتات ذات بتلات بنفسجية و مجمدة و نباتات ذات بتلات زرقاء و مجمدة أو تزاوج بين نباتات ذات بتلات بنفسجية و مجمدة فيما بينها..... - التعليل باستعمال شبكة التزاوج (أكبر عدد سيحصل عليه المزارع هو [BR, ℓ] (50%)	
---	---	--

0,25 ن	1	- أوجه التشابه: وجود ثلاثة أزواج من الصبغيات المتماثلة اللاجنسية، كل صبغي مكون من صبيغين..... - أوجه الاختلاف: عند الأنثى: وجود صبيغين جنسيين متماثلين XX. عند الذكر: وجود صبيغين جنسيين غير متماثلين X و Y..... - الصيغ الصبغية: عند الذكر: $n = 3A + X$ أو $n = 3A + Y$ عند الأنثى: $n = 3A + X$									
0,5 ن	2	بالنسبة للتزاوجين الأول والثاني: - هجونة أحادية : انتقال زوج من الحليلات - تساوي السيادة : ظهور مظهر خارجي وسيط (عيون ذات شكل وسيط)..... - مورثة مرتبطة بالجنس (بالصبغي X) - التعليل: التزاوجان العكسيان أعطيا نتائج مختلفة ، صفة الأمهات تورث للخلف من الذكور ، عدم تحقق القانون 1 لماندل (قبول تبريرين)..... - الأنماط الوراثية لأفراد F_1 : التزاوج الأول: $X_B Y \text{ ♂ } \times X_N Y \text{ ♂ }$ التزاوج الثاني: $X_N Y \text{ ♂ } \times X_B Y \text{ ♂ }$									
0,25 ن	3	التفسير الصبغي: $F_1 \text{ أنثى } \times F_1 \text{ ذكر}$ $[N] \times [BN]$ الأنماط الوراثية: $X_N Y \times X_B X_N$ الأمشاج: $X_N \text{ و } Y \times X_B \text{ و } X_N$ <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 5px;">الأمشاج الأنثوية الأمشاج الذكورية</td><td style="padding: 5px;">$1/2 X_N$</td><td style="padding: 5px;">$1/2 X_B$</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">$1/2 X_N$</td><td style="padding: 5px;">$X_N X_N$ 1/4</td><td style="padding: 5px;">$X_N X_B$ 1/4</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">$1/2 Y$</td><td style="padding: 5px;">$X_N Y$ 1/4</td><td style="padding: 5px;">$X_B Y$ 1/4</td></tr> </table> النتائج النظرية تطابق النتائج التجريبية.....	الأمشاج الأنثوية الأمشاج الذكورية	$1/2 X_N$	$1/2 X_B$	$1/2 X_N$	$X_N X_N$ 1/4	$X_N X_B$ 1/4	$1/2 Y$	$X_N Y$ 1/4	$X_B Y$ 1/4
الأمشاج الأنثوية الأمشاج الذكورية	$1/2 X_N$	$1/2 X_B$									
$1/2 X_N$	$X_N X_N$ 1/4	$X_N X_B$ 1/4									
$1/2 Y$	$X_N Y$ 1/4	$X_B Y$ 1/4									
0,5 ن	4	- انخفاض تدريجي لتردد الحليل الطافر مقابل ارتفاع تدريجي لتردد الحليل المتوحش..... - ارتفاع تردد الحليل vg^+ ← ارتفاع تردد المظهر الخارجي $[vg^+]$ - انخفاض تردد الحليل vg ← انخفاض تردد المظهر الخارجي $[vg]$									
0,25 ن	5	- انتقاء تفضيلي إيجابي للوسط (كمية الغذاء) للأفراد $[vg^+]$ - احتمال أكبر للأفراد $[vg^+]$ على التوالد..... - احتمال أكبر للحليل المتوحش على الانتقال للأجيال الموالية مقارنة مع الحليل الطافر..... - تغيير البنية الوراثية للسكان مع تعاقب الأجيال.....									

0,5	1	• تفسير نتائج التزاوجين الأول والثاني: يتعلق الأمر بهجونة ثنائية: انتقال صفتي لون الجسم ولون العيون. الجيل F_1 مكون من أفراد ذوي مظهر متوحش بجسم مخطط و عيون بُنية. إذن القانون الأول لـ Mendel قد تحقق (قانون تجانس هجناء الجيل الأول): الحليل المسؤول عن الجسم المخطط سائد (نرمز له بـ bl^+) على الحليل المسؤول عن اللون الأسود (نرمز له بـ bl)، والحليل المسؤول عن لون العيون البنية سائد (نرمز له بـ cd^+) على الحليل المسؤول عن لون العيون الحمراء (نرمز له بـ cd)..... أعطى التزاوج الثاني (التزاوج الاختباري) جيلا F_2 بمظاهر خارجية أبوية وجديدة التركيب بنسب مختلفة: نسب المظاهر الخارجية جديدة التركيب ضعيفة بالمقارنة مع نسب المظاهر الخارجية الأبوية، مما يدل على عدم تحقق القانون الثالث لـ Mendel (قانون استقلالية أزواج الحليلات). إذن المورثتان مرتبطتان. يعود ظهور الأنماط الجديدة التركيب إلى حدوث ظاهرة العبور عند الإناث أثناء تشكل الأمشاج.....
-----	---	---

• التزاوج الأول:

الأنماط الوراثية للأباء: $bl\ cd // bl\ cd$ × $bl^+ cd^+ // bl^+ cd^+$
المظاهر الخارجية: $[bl, cd]$ × $[bl^+, cd^+]$
الأمشاج: $bl\ cd / ; 100 \%$ × $bl^+ cd^+ / ; 100 \%$

أفراد F_1 :

النمط الوراثي
المظهر الخارجي

$bl^+ cd^+ // bl\ cd$
 $[bl^+, cd^+]$

0,5

التزاوج الاختباري:

الأنماط الوراثية: $bl^+ cd^+ // bl\ cd$ × $bl\ cd // bl\ cd$
المظاهر الخارجية: $[bl^+, cd^+]$ × $[bl, cd]$

الأمشاج:

$bl^+ cd^+ / ; bl^+ cd / ; bl\ cd^+ / ; bl\ cd /$ × $bl\ cd / (100 \%)$

شبكة التزاوج:

F_1	$bl^+ cd^+ /$ 45.5%	$bl^+ cd /$ 4.5%	$bl\ cd^+ /$ 4.5%	$bl\ cd /$ 45.5%
P_1	$bl\ cd /$ 100 %	$bl^+ cd^+ // bl\ cd$ 45,5 %	$bl^+ cd // bl\ cd$ 4,5 %	$bl\ cd^+ // bl\ cd$ 4,5 %

0,5

تفسير السلسلة التجريبية الثانية:

- نتائج التزاوجين الأول والثاني:

يتعلق الأمر بهجونة ثنائية: انتقال صفتي لون الجسم ولون العيون.

- تجانس هجناء الجيل F_1 ، إذن القانون الأول لـ Mendel قد تحقق: التحليل المسؤول عن الأجنحة بعروق مستعرضة سائد (نرمز له بـ n^+) على التحليل المسؤول عن الأجنحة بدون عروق مستعرضة (نرمز له بـ n)، والتحليل المسؤول عن لون العيون البنية سائد (نرمز له بـ cd^+) على التحليل المسؤول عن لون العيون الحمراء (نرمز له بـ cd)

0,5

- أعطى التزاوج الثاني (التزاوج الاختباري) جيلا F_2 بمظاهر خارجية أبوية وجديدة التركيب بنسب متساوية (نسب المظاهر الخارجية جديدة التركيب مماثلة لنسب المظاهر الخارجية الأبوية)، مما يدل على تحقق القانون الثالث لماندل (قانون استقلالية أزواج الحليلات). إذن المورثتان مستقلتان

0,5

يظهر أن المظاهر الخارجية عند أفراد الجيل F_2 غير متجانسة بين الجنسين فيما يخص صفة شكل الأجنحة: جميع الذكور بأجنحة بدون عروق مستعرضة وجميع الإناث بأجنحة ذات عروق مستعرضة، مما يدل على أن هذه الصفة مرتبطة بالجنس (محمولة على الصبغي X)

0,5

شبكة التزاوج الأول:

الأنماط الوراثية للأباء: $cd^+ // cd^+ ; X_{n^+} X_{n^+} \text{♀}$ × $cd // cd ; X_n Y \text{♂}$
المظاهر الخارجية: $[cd^+, n^+]$ × $[cd, n]$

الأمشاج:

$cd^+ / X_{n^+} 100 \%$ × $cd / X_n 50 \%$ × $cd / Y 50 \%$

أفراد F_1

♂	$cd / X_n (50\%)$	$cd / Y (50\%)$
♀	$cd^+ / X_{n^+} (100\%)$	$cd^+ // cd ; X_{n^+} X_n$ $[cd^+, n^+] \text{♀}$
		$cd^+ // cd ; X_{n^+} Y$ $[cd^+, n^+] \text{♂}$

نحصل على 100% من الأفراد $[cd^+, n^+]$

0,5



♀ \ ♂	cd^+ / X_{n+} 25%	cd / X_{n+} 25%	cd^+ / Y 25%	cd / Y 25%
cd / X_n 100 %	$cd^+//cd ; X_{n+} X_n$ ♀ $[cd^+, n^+]$ 25%	$cd//cd ; X_{n+} X_n$ ♀ $[cd, n^+]$ 25%	$cd^+//cd ; X_n Y$ ♂ $[cd^+, n]$ 25%	$cd//cd ; X_n Y$ ♂ $[cd, n]$ 25%

1

د. محمد اشباني

وجود توافق بين معطيات الوثيقتين 1 و 2 والتفسير الصبغي للنتائج المحصلة:

2

- المورثتان المسؤولتان عن لون الجسم ولون العيون مرتبطتان ومتوضعتان على صبغي لا جنسي (الصبغي 2)؛
- نسبة التركيبات الجديدة (9%) مطابقة للمسافة الملاحظة في الوثيقة 1 (9cMg)؛
- المظاهر الجديدة التركيب ناتجة عن تخطيط ضمصبغي الذي تجسده ظاهرة العبور الممثلة في الوثيقة 2؛
- المورثة المسؤولة عن شكل الأجنحة مستقلة عن المورثتين السابقتين ومتموضعة على الصبغي الجنسي X.

1

التمرين 25: bac_svt_2009_Nor

التزاوج الأول:

3

- يتعلق الأمر بهجونة ثنائية: صفة قد ثمار الطماطم وصفة نضج الثمار.
- تم تزاوج نباتات متشابهة الاقتران بالنسبة للمورثتين مع نباتات مختلفة الاقتران بالنسبة للمورثتين. أعطى هذا التزاوج أربعة مظاهر خارجية بنسب متساوية.

0.75

تتطابق هذه النتائج مع القانون الثالث لماندل : المورثتان المدروستان مستقلتان.

النمط الوراثي للأبوين: (P₁) $g//g \ R//R$ × (P₂) $G//g \ R//I$

يعطي P₁ نمطا واحدا من الأمشاج : $g/ \ R/$

0.75

يعطي P₂ أربعة أنماط من الأمشاج: $G/ \ R/$ و $G/ \ I/$ و $g/ \ R/$ و $g/ \ I/$

شبكة التزاوج

أمشاج P2 \ أمشاج P1	$G/ \ R/$ 25%	$G/ \ I/$ 25%	$g/ \ R/$ 25%	$g/ \ I/$ 25%
$g/ \ R/$ 100%	$G//g \ R//R \ [GR]$ 25%	$G//g \ R//I \ [GRI]$ 25%	$g//g \ R//R \ [gR]$ 25%	$g//g \ R//I \ [gRI]$ 25%

0.75

تتطابق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية.

التزاوج الثاني:

الأنماط الوراثية للنباتات التي تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج بطيء: $g//g \ R//I$ × $g//g \ R//I$

0.5

تعطي هذه النباتات نوعين من الأمشاج: $g/ \ I/$ و $g/ \ R/$

شبكة التزاوج

♀ \ ♂	$g/ \ R/$ 50%	$g/ \ I/$ 50%
$g/ \ R/$ 50%	$g//g \ R//R$	$g//g \ R//I$
$g/ \ I/$ 50%	$g//g \ R//I$	$g//g \ I//I$

0.75	ذ. محمد اشباني	25% - نباتات طماطم تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج سريع [gR] 50% - نباتات طماطم تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج بطيء [gRI] 25% - نباتات طماطم تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج مكبوح [gI] تتطابق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية المحصل عليها في التزاوج الثاني. - للحصول على 100% من نباتات طماطم تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج بطيء نخضع لنباتات طماطم تنتج ثمارا كبيرة القد وتتميز بنضج بطيء سريع (g/g R/R) مع نباتات طماطم كبيرة القد وذات نضج مكبوح (g/g I/I).
------	----------------	--

التمرين 26: bac_svt_2008_Rat

0,5	1	يتعلق الأمر بهجونة ثنائية، ويظهر من خلال تجانس أفراد الجيل F1 أن: - الحليل المسؤول عن الإزهار مرة واحدة سائد على الحليل المسؤول عن الإزهار عدة مرات في السنة، وأن الحليلين المسؤولين عن لون الأزهار متساويا السيادة..... - مورثتان مستقلتان: يدل تساوي نسب المظاهر الخارجية بين أفراد الجيل الناتج عن التزاوج الراجع بين أفراد F1 وأفراد P2 ، على أننا في حالة مورثتين مستقلتين..... النمط الوراثي للأبوين بالنسبة لـ P1 هو I/I,R//R وبالنسبة لـ P2 هو m//m,B//B ، والنمط الوراثي بالنسبة لأفراد الجيل F1 هو I//m,R//B.....
-----	---	---

2	- أفراد الجيل F1 مختلفو الاقتران ينتج كل واحد منهم أربعة أصناف من الأمشاج متساوية النسب: 25% $\underline{I} \underline{R}$ و 25% $\underline{B} \underline{m}$ و 25% $\underline{R} \underline{m}$ و 25% $\underline{B} \underline{I}$ - أفراد P2 متشابهي الاقتران سينتجون نواعا واحدا من الأمشاج (100%): $\underline{B} \underline{m}$ شبكة التزاوج:										
0.25											
0.25											
	<table><tr><td>γ</td><td>$\underline{B} \underline{I}$</td><td>$\underline{R} \underline{m}$</td><td>$\underline{B} \underline{m}$</td><td>$\underline{R} \underline{I}$</td></tr><tr><td>$\underline{B} \underline{m}$</td><td>B//B I//m [B,I] 25%</td><td>R//B m//m [RB,m] 25%</td><td>B//B m//m [B,m] 25%</td><td>R//B I//m [RB,I] 25%</td></tr></table>	γ	$\underline{B} \underline{I}$	$\underline{R} \underline{m}$	$\underline{B} \underline{m}$	$\underline{R} \underline{I}$	$\underline{B} \underline{m}$	B//B I//m [B,I] 25%	R//B m//m [RB,m] 25%	B//B m//m [B,m] 25%	R//B I//m [RB,I] 25%
γ	$\underline{B} \underline{I}$	$\underline{R} \underline{m}$	$\underline{B} \underline{m}$	$\underline{R} \underline{I}$							
$\underline{B} \underline{m}$	B//B I//m [B,I] 25%	R//B m//m [RB,m] 25%	B//B m//m [B,m] 25%	R//B I//m [RB,I] 25%							
1	تؤكد شبكة التزاوج النتائج التجريبية المحصلة.										

0,75	3	إنجاز إخصاب ذاتي عند نباتات تزهو عدة مرات في السنة وتعطي أزهار وريدية: $R//B \ m//m \times R//B \ m//m$ <table border="1"> <tr> <td>γ</td><td>$\underline{m} \underline{R} \ 50\%$</td><td>$\underline{m} \underline{B} \ 50\%$</td></tr> <tr> <td>$\underline{m} \underline{R} \ 50\%$</td><td>R//R m//m [R,m] 25%</td><td>R//B m//m [RB,m] 25%</td></tr> <tr> <td>$\underline{m} \underline{B} \ 50\%$</td><td>R//B m//m [RB,m] 25%</td><td>B//B m//m [B,m] 25%</td></tr> </table>	γ	$\underline{m} \underline{R} \ 50\%$	$\underline{m} \underline{B} \ 50\%$	$\underline{m} \underline{R} \ 50\%$	R//R m//m [R,m] 25%	R//B m//m [RB,m] 25%	$\underline{m} \underline{B} \ 50\%$	R//B m//m [RB,m] 25%	B//B m//m [B,m] 25%
γ	$\underline{m} \underline{R} \ 50\%$	$\underline{m} \underline{B} \ 50\%$									
$\underline{m} \underline{R} \ 50\%$	R//R m//m [R,m] 25%	R//B m//m [RB,m] 25%									
$\underline{m} \underline{B} \ 50\%$	R//B m//m [RB,m] 25%	B//B m//m [B,m] 25%									
		يتم الحصول عند كل جيل على 50% من نباتات ذات المظهر الخارجي [RB,m] ← الحصول على نسبة مهمة من هذا المظهر الخارجي.									

التمرين 27: bac_scex_2007_Rat

0,75	II	- الصفة "لون رمادي" سائدة بالنسبة للصفة "لون أسود" والصفة "أجنحة طويلة" سائدة بالنسبة للصفة "أجنحة أثرية" + تعطيل صحيح..... - المورثتان مرتبطتان + تعطيل صحيح.....
0,75	-7	
	-8	- جسم أسود وأجنحة أثرية : $\frac{n \ 1}{n \ 1}$ - جسم رمادي وأجنحة طويلة: $\frac{N \ L}{n \ 1}$
1		

9- في التزاوج الأول، تكون 4 أنواع من الأمشاج عند الأنثى المختلفة الاقتران نتيجة حدوث ظاهرة العبور، مما أدى إلى ظهور 4 مظاهر خارجية مختلفة. أما في التزاوج الثاني فإن ظاهرة العبور لم تحدث عند الذكر المختلف الاقتران، لذا لم ينتج سوى نوعين من الأمشاج وبالتالي أعطى هذا التزاوج مظهرين خارجيين فقط

10- أ- رسوم تخطيطية صحيحة تبين ظاهرة العبور التي تسمح بتكون أمشاج جديدة التركيب... إلخ
ب- المسافة بين المورثتين هي: $8.5\% + 8.8\% = 17.3\% = 17.3 \text{ CMg}$

التمرين 28: bac_scex_2007_Nor

III
- 11

- يتعلق الأمر بهجونة ثنائية.
- جميع أفراد F_1 متجانسة ← تحقق القانون الأول لـ Mendel ← الآباء من سلالة نقية.
- التحليل المسؤول عن غياب صفة jointless سائد عن التحليل المسؤول عن صفة jointless.
- التحليل المسؤول عن صفة مقاومة الطفيلي سائد عن التحليل المسؤول عن صفة الحساسية للطفيلي...
- المورثتان المدروستان مرتبطتان.
التعليل : نسبة المظاهر الأبوية المحصل عليها في التزاوج الراجع تفوق بكثير نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب،.....


ب -

الآباء : $F_1 \frac{R \ N}{r \ n} \times \frac{r \ n}{r \ n}$
الأمشاج $\frac{R \ N}{r \ n}$ ، $\frac{r \ n}{r \ n}$ ، $\frac{R \ n}{r \ N}$ و $\frac{r \ N}{r \ n}$

	$\frac{R \ N}{r \ n}$	$\frac{r \ n}{r \ n}$	$\frac{R \ n}{r \ N}$	$\frac{r \ N}{r \ n}$
$\frac{r \ n}{r \ n}$	$\frac{R \ N}{r \ n}$ [R N]	$\frac{r \ n}{r \ n}$ [r n]	$\frac{R \ n}{r \ N}$ [R n]	$\frac{r \ N}{r \ n}$ [r N]
	39 %	39 %	11 %	11 %
	المظاهر الخارجية الأبوية		المظاهر الخارجية جديدة التركيب	

13 -

تحدث ظاهرة العبور الصبغي أثناء تشكل الأمشاج عند أفراد الجيل F_1 . يترتب عنها تكون أربعة أنواع من الأمشاج...



إنجاز التزاوج بين أفراد مقاومة للطفيلي ومنتجة لثمار سهلة القطف:

$$\frac{R}{r} \times \frac{n}{n} = \frac{R}{r}$$

الآباء :

شبكة التزاوج :

	$\frac{R}{r}$	$\frac{n}{n}$
$\frac{R}{r}$	$\frac{R}{r}$ $\frac{n}{n}$ [R n]	$\frac{R}{r}$ $\frac{n}{n}$ [R n]
$\frac{r}{r}$	$\frac{R}{r}$ $\frac{n}{n}$ [R n]	$\frac{r}{r}$ $\frac{n}{n}$ [r n]

1 ن

يُعطى التزاوج 75 % من نباتات مقاومة للطفيلي ومنتجة لثمار سهلة القطف (إنتاجية جيدة)، و 25 % فقط من نباتات حساسة للطفيلي ومنتجة لثمار سهلة القطف.

التمرين 29: bac_scex_2006_Nor

III-8- التزاوج الأول (الققص الأول):

+ تجانس المظهر الخارجي (اللون الأسود) لجميع الفئران المحصل عليها بالنسبة لصفة اللون ، إذن الأبوان من سلالة نقية.

+ التحليل المسؤول عن اللون الأسود سائد والتحليل المسؤول عن اللون الأسمر متنحي.

0.5 ن

- التزاوج الثاني (الققص الثاني):

+ تدل النتائج المحصل عليها على أن الأمر يتعلق بتزاوج راجع .

+ الفأر متشابه الاقتران، و الفأرة مختلفة الاقتران.....

0.5 ن

9- الأنماط الوراثية:

- آباء التزاوج الأول : الذكر n/n والأنثى N/N.....

0.5 ن

- آباء التزاوج الثاني : الذكر n/n والأنثى N/n.....

0.5 ن

10- تجانس جميع الفئران المحصل عليها بالنسبة لطول الزغب يدل على أن الآباء من سلالة نقية بخصوص هذه الصفة

0.25 ن

- التحليل المسؤول عن زغب قصير سائد. التحليل المسؤول عن زغب طويل متنحي...

0.25 ن

11- المورثتان مرتبطتان، لأن الأمر يتعلق بنتائج الهجونة الثنائية لتزاوج راجع بين ذكر متشابه الاقتران بالنسبة لصفتي لون و طول الزغب و بين أنثى مختلفة الاقتران بالنسبة لنفس الصفتين، وأن نسبة المظاهر الأبوية أكبر بكثير من نسبة المظاهر جديدة التركيب.....

0.5 ن

0.5 ن

12- الأنماط الوراثية :
- الذكر : nl//nl . الأنثى : NL//nl
- شبكة التزاوج:

	NL/	nl/	Nl/	nL/
nl/	NL//nl	nl//nl	Nl//nl	nL//nl

1 ن

التمرين 30 : bac_sm_2015_Rat

أ - الشكل أ: ذبابة خل أنثى
الشكل ب: ذبابة خل ذكر.
ب - الصيغة الصبغية ل:
- ذكر ذبابة الخل: $2n = 6A + XY = 8$ أو $2n = 3AA + XY = 8$
- أنثى ذبابة الخل: $2n = 6A + XX = 8$ أو $2n = 3AA + XX = 8$

1 ن

• يتعلق الأمر بهجونة ثنائية.
بالنسبة لصفة قد الجسم:
• تجانس أفراد F_1 .
• الحليل جسم عادي سائد ، الحليل جسم قصير متنحي.
بالنسبة لصفة لون العيون:
• عدم تجانس أفراد F_1 (اختلاف المظهر الخارجي بين الذكور والإناث) بالرغم من نقاوة سلالة الأبوين (استثناء القانون الأول لماندل): المورثة مرتبطة بالجنس.
• انتقال صفة لون العيون من الإناث إلى الذكور: الحليل المسؤول محمول على الصبغي الجنسي X.
• من خلال المظهر الخارجي لإناث F_1 ، الحليل عيون حمراء سائد والحليل عيون بيضاء متنحي.

1

2

WWW.KHAYMA.COM/FATSVT

• الحليل المسؤول عن قد الجسم محمول أيضا على الصبغي الجنسي X: المورثتان المدروستان مرتبطتان (7 x 0.25)

1.75 ن

تفسير نتائج التزاوج الأول:
- المظهر الخارجي:
- النمط الوراثي:
الأمشاج
شبكة التزاوج:


	♂ [nR]	50%	50%
♀ [Nr]	X	X	Y
	Nr/	nR/	y
الأمشاج	♂	50%	50%
♀	Nr/	50% ♀ [NR]	50% ♂ [Nr]
	100%		

3

1.25 ن

- تطابق النتائج النظرية والنتائج التجريبية . (0.25 ن)

- نسبة التركيبات الجديدة هي : $1.2\% + 1.9\% = 3.1\%$
- بما أن 1% من التركيبات الجديدة يمثل 1cMg : المسافة الفاصلة بين المورثتين المدروستين تساوي 3.1 cMg



الخريطة العاملة:
(قبول كل تمثيل صحيح)

4

ن 1

التمرين 31: bac_sm_2015_Nor

- يتعلق الأمر بحالة هجونة ثنائية. (0.25 ن)
- تحقق القانون الأول لماندل؛ الأبوان من سلالتين نقيتين. (0.25 ن)
- بالنسبة لمورثة شكل التويج هناك حالة سيادة تامة :
• التحليل المسؤول عن التويج المفتوح سائد..
- التحليل المسؤول عن التويج المغلق متنحي. (0.25 ن)
- بالنسبة لمورثة لون التويج هناك تساوي السيادة بين التحليل المسؤول عن التويج الأحمر والتحليل المسؤول عن التويج الأبيض. (0.25 ن)

1

ن 1


- (0.25 ن)
- (0.25 ن)
- (0.5 ن)

الأنماط الوراثية		الأبوان
F//F	R//R	
f//f	B//B	أفراد F ₁
F//f	R//B	

2

ن 1

التفسير الصبغي للتزاوج الثاني:



شبكة التزاوج: (1.75 ن)

الأمشاج ♂ الأمشاج ♀	$\underline{F} \underline{R}$ 1/4	$\underline{f} \underline{B}$ 1/4	$\underline{F} \underline{B}$ 1/4	$\underline{f} \underline{R}$ 1/4
$\underline{F} \underline{R}$ 1/4	F//F R//R 1/16 [F,R]	F//f R//B 1/16 [F,RB]	F//F R//B 1/16 [F,RB]	F//f R//R 1/16 [F,R]
$\underline{f} \underline{B}$ 1/4	F//f R//B 1/16 [F,RB]	f//f B//B 1/16 [f, B]	F//f B//B 1/16 [F, B]	f//f R//B 1/16 [f,RB]
$\underline{F} \underline{B}$ 1/4	F//F R//B 1/16 [F,RB]	F//f B//B 1/16 [F, B]	F//F B//B 1/16 [F, B]	F//f R//B 1/16 [F,RB]
$\underline{f} \underline{R}$ 1/4	F//f R//R 1/16 [F,R]	f//f R//B 1/16 [f,RB]	F//f R//B 1/16 [F,RB]	f//f R//R 1/16 [f,R]

3

هذه النتائج النظرية تطابق النتائج المحصلة. (0.25 ن)

ن 3

- 3 - هجونة أحادية (0.25 ن)
- تجانس الجيل F_1 : الأبوان من سلالة نقية. (0.25 ن)

0.5 ن

- 4 - التزاوج الثاني:

- الحصول على مظهرين خارجيين بنسبة $2/3$ فئران صفراء و $1/3$ فئران سوداء: المورثة مميّنة في حالة تشابه الاقتران
- الأباء هجناء.
- الحليل المسؤول عن اللون الأصفر سائد. (0.75 ن)

المظهر الخارجي: [J] x [J]
النمط الوراثي: J // n x J // n

الأمشاج: J/ x n /
شبكة التزاوج

أمشاج	J/ 1/2	n / 1/2
J/ 1/2	J//J	J//n
n / 1/2	J//n	n//n

(0.5 ن)

باعتبار موت الأفراد متشابهي الاقتران بالنسبة للحليل J، تصبح النتائج النظرية $2/3$ [J] و $1/3$ [n] في هذه الحالة تتوافق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية. (0.25 ن)
التزاوج الثالث: ظهور مظهرين مختلفين بنسب متساوية: التزاوج اختباري، الفئران الصفراء هجينة. (0.25 ن)

المظهر الخارجي: [n] x [J]
النمط الوراثي: n // n x J // n

الأمشاج: n/ x J/
(0.25 ن)

(0.25 ن) n // n J // n
[n] 50% [J] 50%

تتوافق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية. (0.25 ن)

3.25 ن

- التزاوج الأول:
- انتقال صفتين وراثيتين (عدد السنفات (G, g) ومظهر الأوراق (F, f): هجونة ثنائية. (0.25 ن)
 - جيل F_1 متجانس؛ تحقق القانون الأول لماندل؛ الأباء من سلالة نقية؛ (0.25 ن)
 - سيادة الحليل المسؤول عن سنفاة مفردة (G) على الحليل المسؤول عن سنفاة متعددة (g) وسيادة الحليل المسؤول عن أوراق عادية (F) على الحليل المسؤول عن أوراق مطوية (f)؛ (0.25 ن)

التزاوج الثاني:

- نباتات F_1 هجينة ؛ (0.25 ن)
- توزيع نسب المظاهر الخارجية المحصل عليها: $1/16$ ؛ $3/16$ ؛ $3/16$ ؛ $9/16$ ؛ يدل على أن المورثتين مستقلتان. (0.25 ن)

1.25 ن

0.1.25	0.0.25	4	الأنماط الوراثية للابوين P1 و P2 وأفراد F₁ : - الأبوان: P1 : G//G F//F : P2 : g//g f//f (0.5 ن) - أفراد F₁ : G//g F//f (0.25 ن)
0.75 ن		5	التفسير الصبغي للتزاوج الثاني: F₁ × F₁ + المظهر الخارجي : [GF] × [GF] + النمط الوراثي: G//g F//f × G//g F//f + الأمشاج: كل فرد ينتج 1/4 g/f, 1/4 g/F, 1/4 G/f, 1/4 G/F (0.5 ن) + شبكة التزاوج صحيحة: النتيجة ← 9/16 [GF], 3/16 [Gf], 3/16 [gF], 1/16 [gf] (0.75 ن) تطابق النسب النظرية مع النسب التجريبية يؤكد استقلال المورثتين (0.25 ن)
1.5 ن			
التمرين 34: bac_sm_2012_Nor			
		1	تحليل واستنتاجات: - بالنسبة للتزاوج الأول: • يهتم هذا التزاوج بنقل صفتين مختلفتين إذن يتعلق الأمر بهجونة ثنائية • تجانس ذبابات الجيل الأول F₁ يدل على تحقق القانون الأول لماندل، الأبوان من سلالتين نقيتين • الحليل المسؤول عن لون الجسم الرمادي G سائد على الحليل المسؤول عن لون الجسم الأصفر g، والحليل المسؤول عن الأجنحة العادية N سائد على الحليل المسؤول عن الأجنحة المقصوفة n - بالنسبة للتزاوج الثاني: • يتعلق الأمر بتزاوج اختباري • نسب المظاهر الخارجية الجديدة التركيب (25,17%) ضعيفة بالمقارنة مع نسب المظاهر الخارجية الأبوية (74,82%)، يدل هذا على عدم تحقق القانون الثالث لـ Mendel (قانون استقلالية أزواج الحليلات) فالمورثتان إذن مرتبطتان
0.25 ن	0.25 ن	0.5 ن	
0.25 ن	0.75 ن	2	تفسير نتائج التزاوجين الأول والثاني: • التزاوج الأول: المظاهر الخارجية الأنماط الوراثية الأمشاج أفراد F₁ التزاوج الثاني: المظاهر الخارجية الأنماط الوراثية الأمشاج: 100% 37.50% 12.50% 12.67% 37.32%
1 ن	1.25 ن		

الأمشاج	$\frac{N}{+} \frac{G}{+}$ 37.32%	$\frac{N}{+} \frac{g}{-}$ 12.67%	$\frac{n}{-} \frac{G}{+}$ 12.50%	$\frac{n}{-} \frac{g}{-}$ 37.50%
$\frac{n}{+} \frac{g}{+}$ 100%	$\frac{N}{+} \frac{G}{+}$ [N ; G] $\frac{n}{+} \frac{g}{+}$	$\frac{N}{+} \frac{g}{-}$ [N ; g] $\frac{n}{+} \frac{g}{+}$	$\frac{n}{-} \frac{G}{+}$ [n ; G] $\frac{n}{-} \frac{g}{+}$	$\frac{n}{-} \frac{g}{-}$ [n ; g] $\frac{n}{-} \frac{g}{+}$
	37.32%	12.67%	12.50%	37.50%
	مظهر أبوي	مظاهر جديدة التركيب		مظهر أبوي


ن 1.25

المسافة الفاصلة بين المورثتين المرتبطتين لون الجسم وشكل الأجنحة، تقدر بنسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب وتساوي 25,17 cM .

3

ن 0.5


ن 0.5



د. محمد أشباني

تفسير ظهور المظاهر الجديدة التركيب بحدوث ظاهرة العبور:

4



ن 1.5

التمرين 35: bac_sm_2013_Nor

التزاوج الأول:

1

0.25

0.5

1

- الجيل F_1 متجانس : تحقق القانون الأول لماندل إذن فإن الأبوين من سلالتين نقيتين
- سيادة الحليل المسؤول عن "عيون حمراء" على الحليل المسؤول عن "عيون بيضاء" ، وسيادة الحليل المسؤول عن "أجنحة بعروق متفرعة" على الحليل المسؤول عن "أجنحة بعروق متوازية".....
- التزاوج الثاني:
- تزاوج اختباري أعطى مظاهر خارجية أبوية بنسبة 93.8% وهي أكبر من نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب 6.2%. إذن فالمورثتين المدروستين مرتبطتين 0.5×2

التزاوج الثالث:

2

0.5

0.5

- يتعلق الأمر بتزاوج اختباري، انتقل المظهران الخارجيان للأم إلى ذكور F_2' ، بينما ورثت إناث هذا الجيل المظهران الخارجيان للأب، إذن تختلف الصفات الوراثية حسب جنس أفراد الجيل F_2' .
- المورثتان المدروستان محمولتان على الصبغي الجنسي X.....

التزاوج الرابع:

3-أ

0.25

0.25

0.25

0.5

- الجيل F_1 متجانس : تحقق القانون الأول لماندل، إذن الأبوان من سلالتين نقيتين.....
- سيادة الحليل المسؤول عن "جسم أصفر" على الحليل المسؤول عن "جسم أسود".
- سيادة الحليل المسؤول عن "عيون حمراء" على الحليل المسؤول عن "عيون بيضاء".....
- التزاوج الخامس:
- تزاوج اختباري، أعطى مظاهر خارجية أبوية بنسبة تساوي نسبة المظاهر الخارجية جديدة التركيب
- المورثتان المدروستان مستقلتان.....

المظاهر الخارجية للأبوين: [b,n] ♂ x [R,J] ♀

ب-

الأنماط الوراثية: $X_b Y n/n$ x $X_R X_b J/n$

الأمشاج: $X_b n/$, $Y n/$ $X_R J/$, $X_R n/$, $X_b J/$, $X_b n/$

1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4

- شبكة التزاوج:

♂ \ ♀	1/4 $X_R J/$	$X_R n/$ 1/4	$X_b J/$ 1/4	$X_b n/$ 1/4
$X_b n/$ 1/2	$X_R X_b J/n$ [R,J] ♀ 1/8	$X_R X_b n/n$ [R,n] ♀ 1/8	$X_b X_b J/n$ [b,J] ♀ 1/8	$X_b X_b n/n$ [b,n] ♀ 1/8
$Y n/$ 1/2	$X_R Y J/n$ [R,J] ♂ 1/8	$X_R Y n/n$ [R,n] ♂ 1/8	$X_b Y J/n$ [b,J] ♂ 1/8	$X_b Y n/n$ [b,n] ♂ 1/8

- النتائج: [R,J] 1/4 و [b,J] 1/4 و [R,n] 1/4 و [b,n] 1/4

- تطابق بين النتائج النظرية والنتائج التجريبية.....

التمرين 36: bac_sm_2011_Rat

1

التزاوج الأول: F1 متجانس بالنسبة للصفتين وبالتالي فالأبوان من سلالتين نقيتين.

حصلنا على جيل بأجنحة عادية و عيون مفصصة:

- الحليل المسؤول عن عيون عادية سائد (L) على الحليل المسؤول عن العيون المفصصة (l)؛


- الحليل المسؤول عن أجنحة عادية سائد (vg+) على الحليل المسؤول عن أجنحة أثرية (vg).....

التزاوج الثاني: تزاوج اختباري لأنه بين أنثى ثنائية الهجونة وذكر ثنائي التنحي.

نسبة المظاهر الأبوية % 97 أكبر من نسبة المظاهر الجديدة وبالتالي فالمورثتان المسؤولتان عن كل من شكل

الأجنحة وشكل العيون مرتبطتان.....

التفسير الصبغي للتزاوج الأول:




ذ. محمد اشباني

التفسير الصبغي للتزاوج الثاني:

الآباء: $[l , vg] ♂$ × $[L , vg+] ♀$ F1

الأنماط الوراثية:



هذا الملف تم تحميله من موقع: Talamid.ma

ن 0.5

$\frac{L}{+} \frac{vg+}{+}$	$\frac{L}{+} \frac{vg+}{+}$ 48,5%	$\frac{L}{+} \frac{vg}{+}$ 1,5%	$\frac{l}{+} \frac{vg+}{+}$ 1,5%	$\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 48,5%
$\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 100%	$\frac{L}{+} \frac{vg+}{+}$ [L,vg+] $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 48,5%	$\frac{L}{+} \frac{vg}{+}$ [L,vg] $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 1,5%	$\frac{l}{+} \frac{vg+}{+}$ [l,vg+] $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 1,5%	$\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ [l,vg] $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 48,5%

ن 0.5

ن 0.5

ن 0.5

$[l, vg] \text{♀} \times [L, vg+] \text{F1} \text{♂}$

التفسير الصبغي للتزاوج الثالث:

الأباء:

الأنماط الوراثية

100% $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 50% $\frac{L}{+} \frac{vg+}{+}$ 50% $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$

	$\frac{L}{+} \frac{vg+}{+}$ 50%	$\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 50%
$\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 100%	$\frac{L}{+} \frac{vg+}{+}$ [L,vg+] $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 50%	$\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ [l,vg] $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 50%

ن 0.25

حصلنا على نفس المظاهر الخارجية مع العكس في نسبها: في هذا التزاوج نسب المظاهر الجديدة التركيب تفوق نسب المظاهر الأبوية

الأباء:

$[l, vg] \text{♂} \times [L, vg+] \text{F1} \text{♀}$

الأنماط الوراثية:

ن 0.25

ن 0.25

$\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ $\frac{l}{+} \frac{vg+}{+}$ $\frac{L}{+} \frac{vg+}{+}$ $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ $\frac{L}{+} \frac{vg}{+}$

الأمشاج:

شبكة التزاوج:

	$\frac{l}{+} \frac{vg+}{+}$ 48,5%	$\frac{L}{+} \frac{vg+}{+}$ 1,5%	$\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 1,5%	$\frac{L}{+} \frac{vg}{+}$ 48,5%
$\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 100%	$\frac{l}{+} \frac{vg+}{+}$ [l,vg+] $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 48,5%	$\frac{L}{+} \frac{vg+}{+}$ [L,vg+] $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 1,5%	$\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ [l,vg] $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 1,5%	$\frac{L}{+} \frac{vg}{+}$ [L,vg] $\frac{l}{+} \frac{vg}{+}$ 48,5%

ن 0.75

2

3

التمرين 37: bac_sm_2011_Nor

1

- تفسير نتائج التزاوج الأول:

أعطى تزاوج ذبابتين بمظهر خارجي سائد $[cu^+]$ جيلا غير متجانس مما يدل على أن الأبوين مختلفا الاقتران: $cu^+//cu$.

نسب المظاهر الخارجية المحصل عليها هي $[cu^+]$ بنسبة 3/4 و $[cu]$ بنسبة 1/4 .
شبكة التزاوج:

♀ \ ♂	$cu^+ / (1/4)$	$cu / (1/4)$
$cu^+ / (1/4)$	$cu^+//cu^+ [cu^+] (1/4)$	$cu^+//cu [cu^+] (1/4)$
$cu / (1/4)$	$cu^+//cu [cu^+] (1/4)$	$cu//cu [cu] (1/4)$

- تفسير نتائج التزاوج الثاني:

أعطى تزاوج ذبابتين بمظهر خارجي سائد $[sb^+]$ جيلا غير متجانس مما يدل على أن الأبوين مختلفا الاقتران: $sb^+//sb$.

المظاهر المحصل عليها هي $[sb^+]$ بنسبة 2/3 و $[sb]$ بنسبة 1/3 إذن الحليل sb^+ مميت في حالة تشابه الإقتران.

1 ن

شبكة التزاوج:	<table border="1"> <tr> <td>♂ \ ♀</td> <td>sb⁺/ (1/4)</td> <td>sb/ (1/4)</td> </tr> <tr> <td>sb⁺/ (1/4)</td> <td>sb⁺//sb⁺ [sb⁺]</td> <td>sb⁺//sb [sb⁺] (1/3)</td> </tr> <tr> <td>sb/ (1/4)</td> <td>sb⁺//sb [sb⁺] (1/3)</td> <td>sb//sb [sb] (1/3)</td> </tr> </table>		♂ \ ♀	sb ⁺ / (1/4)	sb/ (1/4)	sb ⁺ / (1/4)	sb⁺//sb⁺ [sb⁺]	sb ⁺ //sb [sb ⁺] (1/3)	sb/ (1/4)	sb ⁺ //sb [sb ⁺] (1/3)	sb//sb [sb] (1/3)						
♂ \ ♀	sb ⁺ / (1/4)	sb/ (1/4)															
sb ⁺ / (1/4)	sb⁺//sb⁺ [sb⁺]	sb ⁺ //sb [sb ⁺] (1/3)															
sb/ (1/4)	sb ⁺ //sb [sb ⁺] (1/3)	sb//sb [sb] (1/3)															
1 ن																	
2	تفسير نتائج التزاوج الثالث: أعطى هذا التزاوج مظهرين أبويين [sb⁺, cu⁺] و [sb, cu] بنسبة 91.8% ومظهرين جديدي التركيب [sb⁺, cu] و [sb, cu⁺] بنسبة 8.2% إذن فهو تزاوج اختباري ويتعلق الأمر بمورثتين مرتبطتين. المظهر الخارجي للأبوين: [sb⁺, cu⁺] X [sb, cu] النمط الوراثي للأباء: الأمشاج: شبكة التزاوج: <table border="1"> <tr> <td>sb⁺ cu⁺ 45,9%</td> <td>sb⁺ cu 4,1%</td> <td>sb cu⁺ 4,1%</td> <td>sb cu 45,9%</td> <td>♂ \ ♀</td> </tr> <tr> <td>sb⁺ cu⁺ [sb⁺, cu⁺]</td> <td>sb⁺ cu [sb⁺, cu]</td> <td>sb cu⁺ [sb, cu⁺]</td> <td>sb cu [sb, cu]</td> <td>sb cu</td> </tr> <tr> <td>sb⁺ cu⁺ 45,9%</td> <td>sb⁺ cu 4,1%</td> <td>sb cu⁺ 4,1%</td> <td>sb cu 45,9%</td> <td></td> </tr> </table>		sb ⁺ cu ⁺ 45,9%	sb ⁺ cu 4,1%	sb cu ⁺ 4,1%	sb cu 45,9%	♂ \ ♀	sb ⁺ cu ⁺ [sb ⁺ , cu ⁺]	sb ⁺ cu [sb ⁺ , cu]	sb cu ⁺ [sb, cu ⁺]	sb cu [sb, cu]	sb cu	sb ⁺ cu ⁺ 45,9%	sb ⁺ cu 4,1%	sb cu ⁺ 4,1%	sb cu 45,9%	
sb ⁺ cu ⁺ 45,9%	sb ⁺ cu 4,1%	sb cu ⁺ 4,1%	sb cu 45,9%	♂ \ ♀													
sb ⁺ cu ⁺ [sb ⁺ , cu ⁺]	sb ⁺ cu [sb ⁺ , cu]	sb cu ⁺ [sb, cu ⁺]	sb cu [sb, cu]	sb cu													
sb ⁺ cu ⁺ 45,9%	sb ⁺ cu 4,1%	sb cu ⁺ 4,1%	sb cu 45,9%														
0.5 ن																	
3	sb⁺ - حليل مميت في حالة تشابه الإقتران، إذن كل فرد بمظهر [sb⁺] له نمط sb//sb+ cu - حليل متنح، إذن النمط الوراثي لكل فرد [cu] هو cu//cu المورثتان مرتبطتان، وبالتالي فالنمط الوراثي لكل فرد [sb⁺, cu] هو النتيجة المتوقعة هي: 2/3 [sb⁺, cu] و 1/3 [sb, cu]. التعليل بشبكة التزاوج: <table border="1"> <tr> <td>sb cu 1/2</td> <td>sb⁺ cu 1/2</td> <td>♂ \ ♀</td> </tr> <tr> <td>sb⁺ cu [sb⁺, cu]</td> <td>sb⁺ cu [sb⁺, cu]</td> <td>sb⁺ cu 1/2</td> </tr> <tr> <td>sb cu [sb, cu]</td> <td>sb cu [sb, cu]</td> <td>sb cu 1/2</td> </tr> <tr> <td>sb cu [sb, cu]</td> <td>sb⁺ cu [sb⁺, cu]</td> <td>sb cu 1/2</td> </tr> </table>		sb cu 1/2	sb ⁺ cu 1/2	♂ \ ♀	sb ⁺ cu [sb ⁺ , cu]	sb⁺ cu [sb⁺, cu]	sb ⁺ cu 1/2	sb cu [sb, cu]	sb cu [sb, cu]	sb cu 1/2	sb cu [sb, cu]	sb ⁺ cu [sb ⁺ , cu]	sb cu 1/2			
sb cu 1/2	sb ⁺ cu 1/2	♂ \ ♀															
sb ⁺ cu [sb ⁺ , cu]	sb⁺ cu [sb⁺, cu]	sb ⁺ cu 1/2															
sb cu [sb, cu]	sb cu [sb, cu]	sb cu 1/2															
sb cu [sb, cu]	sb ⁺ cu [sb ⁺ , cu]	sb cu 1/2															
0.75 ن																	
4	إنجاز الخريطة العاملية:																
1 ن																	
التمرين 38: bac_sm_2010_Rat																	
1	✓ اختلاف النباتات المتزاوجة بصفتين (زوجين من الحليلات): يتعلق الأمر بهجونة ثنائية..... ✓ تجانس أفراد الجيل F₁ يدل على أن الأبوين متشابهو الاقتران بالنسبة للمورثتين. الأبوان من سلالتين نقيتين. (تحقق القانون الأول لماندل Mendel) .. ✓ تدل المظاهر الخارجية لأفراد الجيل F₁ على أن الحليل المسؤول عن اللون الأصفر J سائد بالنسبة للحليل المسؤول عن اللون الأبيض j، وأن الحليل المسؤول عن سنفات منفلة D سائد بالنسبة للحليل المسؤول عن سنفات غير منفلة d..... ✓ توحى النتائج بتوزيع وفق نسبة 25% لكل مظهر خارجي، نستنتج حالة مورثتين مستقلتين محمولتين على زوجين من الصبغيات المتماثلة.....																
0.25 ن																	
0.25 ن																	
0.25 ن																	
0.25 ن																	

1 ن	✓ التزاوج الأول: المظاهر الخارجية : $[j,d] \times [J,D]$ الأنماط الوراثية : $(j//j,d//d) \times (J//J,D//D)$ الأمشاج : $j/d/ \times J/D/$ النمط الوراثي لأفراد F_1 : $(J//j,D//d)$ المظهر الخارجي لأفراد F_1 : $[J,D]$	
2	التزاوج الثاني ✓ بين أفراد F_1 ونباتات ثنائية التتحي: يتعلق الأمر بتزاوج اختباري..... المظاهر الخارجية: $[j,d] \times [J,D]$ الأنماط الوراثية : $(j//j,d//d) \times (J//j,D//d)$ الأمشاج : $100\% j/d/ \times \frac{1}{4} j/d/ \frac{1}{4} j/D/ \frac{1}{4} J/d/ \frac{1}{4} J/D/$ – عند الإخصاب يتم التقاء الأمشاج بصفة عشوائية	

التمرين 39: bac_sm_2009_Rat

1	– يتعلق الأمر بهجونة ثنائية: انتقال صفتي لون الجسم وشكل الأجنحة؛ – تدل نتائج F_1 على أن الأبوين من سلالتين نقيتين وأن الحليل المسؤول عن لون الجسم الرمادي سائد على الحليل المسؤول عن لون الجسم الأصفر، وأن الحليل المسؤول عن الأجنحة بعروق سائد على الحليل بدون عروق. – يظهر عند الذكور أنماط وراثية جديدة التركيب بنسب ضعيفة بالمقارنة مع الأنماط الوراثية مما يدل على أن المورثتين مرتبطتين. – جميع الإناث بجسم رمادي وأجنحة بعروق: يدل هذا على أن المورثتين محمولتين على الصبغي الجنسي X..... تفسير التزاوج الأول: النمط الوراثي للأبوين: الذكر: $X_{gn}Y$ الأنثى: $X_{GN}X_{GN}$ الأمشاج: $X_{GN} \quad X_{GN} \quad X_{gn} \quad Y$ أفراد F_1 <table border="1"> <tr> <td>$\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$</td><td>$X_{gn} 50\%$</td><td>$Y 50\%$</td></tr> <tr> <td>$X_{GN}$</td><td>$X_{GN} X_{gn}$ [GN] 50%</td><td>$X_{GN} Y$ [GN] 50%</td></tr> </table> نحصل على 100% من أفراد الجيل الأول بمظهر خارجي [GN].....	$\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$	$X_{gn} 50\%$	$Y 50\%$	X_{GN}	$X_{GN} X_{gn}$ [GN] 50%	$X_{GN} Y$ [GN] 50%	
$\frac{\text{♂}}{\text{♀}}$	$X_{gn} 50\%$	$Y 50\%$						
X_{GN}	$X_{GN} X_{gn}$ [GN] 50%	$X_{GN} Y$ [GN] 50%						
2	تفسير نتائج التزاوج الثاني عند الذكور: يعطي أفراد F_1 عند: – الذكور نوعين من الأمشاج: X_{GN} و Y؛ – الإناث 4 أنواع من الأمشاج نتيجة ظاهرة العبور بالنسب التالية: $X_{GN} (43\%)$؛ $X_{GN} (6,5\%)$؛ $X_{gn} (6,5\%)$؛ $X_{gn} (43\%)$..... شبكة التزاوج:							

ذ. محمد اشباني

♀ ♂	X_{GN} 43%	X_{Gn} 6,5%	X_{gN} 6,5%	X_{gn} 43%
Y 50%	$X_{GN} Y$ [GN] 43%	$X_{Gn} Y$ [Gn] 6,5%	$X_{gN} Y$ [gN] 6,5%	$X_{gn} Y$ [gn] 43%

تفسير نتائج التزاوج الأول:

- يتعلق الأمر بهجونة ثنائية: تختلف ذبابات الخل المتزاوجة بصفتين وراثيتين (صفة شكل الزباني وصفة لون الجسم).
- الحليل المسؤول عن زباني عادية سائد على الحليل المسؤول عن ظهور زباني قصيرة.
- الحليل المسؤول عن اللون الرمادي للجسم سائد على الحليل المسؤول عن اللون ébony.

أعطى التزاوج الأول جيلا بأربعة مظاهر خارجية أبوية وجديدة التركيب بنسب متساوية. يتعلق الأمر بتزاوج اختباري بين أفراد هجينة وأفراد ثنائية التنحي تحقق فيه القانون الثالث لماندل (قانون استقلالية أزواج الحليلات)، إذن المورثتان مستقلتان.....
نرمز للحليل المسؤول عن الزباني العادية بـ N وللحليل المسؤول عن الزباني القصيرة بـ n، ونرمز للحليل المسؤول عن اللون الرمادي بـ G وللحليل المسؤول عن اللون ébony بـ g.
الآباء:

$$g//g \ n//n \times G//g \ N//n$$



الأمشاج: g/n $1/4 \ g/n$ $1/4 \ g/N$ $1/4 \ G/n$ $1/4 \ G/N$
شبكة التزاوج:

	$1/4 \ G/N$	$1/4 \ G/n$	$1/4 \ g/N$	$1/4 \ g/n$
g/n	$G//g \ N//n$ [GN] $1/4$	$G//g \ n//n$ [Gn] $1/4$	$g//g \ N//n$ [gN] $1/4$	$g//g \ n//n$ [gn] $1/4$

تتوافق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية.....


تفسير نتائج التزاوج الثاني:

حالة انتقال صفتي شكل الزباني ولون العيون:

يتعلق الأمر بهجونة ثنائية: حالة تزاوج اختباري بين إناث ثنائية التنحي وذكر مختلفا الاقتران.
الحليل المسؤول عن لون العيون الحمراء سائد على الحليل المسؤول عن لون العيون البنية والحليل المسؤول عن الزباني العادية سائد على الحليل المسؤول عن الزباني القصيرة.
أعطى هذا التزاوج مظاهر خارجية أبوية بنسب متساوية مع غياب المظاهر الجديدة التركيب، مما يدل على أن المورثتين مرتبطتان ارتباطا مطلقا.....

نرمز للحليل المسؤول عن لون العيون الحمراء بـ R، والحليل المسؤول عن لون العيون البنية بـ r
الآباء:

$$NR//nr : \text{♂} \times nr//nr : \text{♀}$$



الأمشاج:

شبكة التزاوج:


	♂	$NR/$ 50%	$nr/$ 50%
♀	$nr/$ 100%	$NR//nr$ 50%[NR]	$nr//nr$ 50%[nr]

تتوافق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية.....


تحديد تموضع المورثات على الصبغيات: بالنسبة للمورثتين المسؤولتين عن شكل الزباني ولون الجسم تؤكد النتائج التجريبية والنظرية التي تدل على استقلالية الأزواج أن هاتين المورثتين محمولتين على صبغيين غير متمثلين. بالنسبة للمورثتين المسؤولتين على شكل الزباني ولون العيون تؤكد النتائج التجريبية والنظرية التي تدل على ارتباط هاتين المورثتين، أنهما تتموضعان في نفس الصبغي، وعليه فصفة لون العيون تتموضع على صبغي غير مماثل للصبغي الذي تتموضع فيه المورثة المسؤولة عن لون الجسم.....

التزاوج الأول:

- اختلاف الأبوين بصفيتين وراثيتين : الهجونة الثنائية.
- تجانس أفراد الجيل F_1 : تحقيق القانون الأول لـ Mendel، الأبوان من سلالة نقية.
- التحليل المسؤول عن الحساسية للمرض (R) سائد بالنسبة للتحليل المسؤول عن مقاومة المرض (r).
- التحليل المسؤول عن القامة القصيرة (L) سائد بالنسبة للتحليل المسؤول عن القامة الطويلة (l)....
- المورثتان مرتبطتان، يكتب التزاوج على النحو التالي:



أفراد F_1 $[R\ell] \times [rL]$



التزاوج الثاني:

γ	$\frac{R}{r} \frac{\ell}{L}$	$\frac{r}{R} \frac{L}{\ell}$	$\frac{R}{r} \frac{L}{\ell}$	$\frac{r}{R} \frac{\ell}{L}$
$\frac{R}{r} \frac{\ell}{L}$	$\frac{R}{r} \frac{\ell}{L} [RI]$	$\frac{R}{r} \frac{L}{\ell} [RL]$	$\frac{R}{r} \frac{\ell}{L} [RL]$	$\frac{R}{r} \frac{\ell}{L} [RI]$
$\frac{r}{R} \frac{L}{\ell}$	$\frac{R}{r} \frac{\ell}{L} [RL]$	$\frac{r}{R} \frac{L}{\ell} [rL]$	$\frac{R}{r} \frac{L}{\ell} [RL]$	$\frac{r}{R} \frac{\ell}{L} [rL]$
$\frac{R}{r} \frac{L}{\ell}$	$\frac{R}{r} \frac{L}{\ell} [RL]$	$\frac{R}{r} \frac{L}{\ell} [RL]$	$\frac{R}{r} \frac{L}{\ell} [RL]$	$\frac{R}{r} \frac{L}{\ell} [RL]$
$\frac{r}{R} \frac{\ell}{L}$	$\frac{R}{r} \frac{\ell}{L} [RI]$	$\frac{r}{R} \frac{L}{\ell} [rL]$	$\frac{R}{r} \frac{L}{\ell} [RL]$	$\frac{r}{R} \frac{\ell}{L} [rI]$

نسبة المظهر الخارجي المرغوب فيه هي: $0,05 \times 0,05 = 0,0025$ أي 0,25%

التزاوج الثاني:

الحصول على مظاهر خارجية أبوية في الخلف بنسب متساوية يدل على أن المورثتين مرتبطتان، وأن الذبابة الذكر أنتجت صنفين من الأمشاج بنسب متساوية: 50% $e^+ ss^+$ ، و 50% $e ss$

بينما أنتجت الأنثى ثنائية التنحي صنفًا واحدًا من الأمشاج 100% $e ss$..

1

1

شبكة التزاوج:

1

2

1

3

Diagram illustrating the distances between markers *se*, *ss*, and *e* on a chromosome. The distances are given in map units:

- Distance between *se* and *ss*: 23.5
- Distance between *ss* and *e*: 12
- Distance between *se* and *e*: 35.5

0.75 ن 0.75 ن	التمرين الثالث: (6 نقط) - الصفة "لون رمادي" سائدة بالنسبة للصفة "لون أسود" والصفة "أجنحة طويلة" سائدة بالنسبة للصفة "أجنحة أثرية" + تعليل صحيح - المورثتان مرتبطتان + تعليل صحيح - جسم أسود وأجنحة أثرية : $\frac{n \ell}{n \ell}$ - جسم رمادي وأجنحة طويلة: $\frac{N L}{n \ell}$ 1 ن 3- في التزاوج الأول، تكون 4 أنواع من الأمشاج عند الأنثى المختلفة الاقتران نتيجة حدوث ظاهرة العبور، مما أدى إلى ظهور 4 مظاهر خارجية مختلفة، أما في التزاوج الثاني فإن ظاهرة العبور لم تحدث عند الذكر المختلف الاقتران، لذا لم ينتج سوى نوعين من الأمشاج وبالتالي أعطى هذا التزاوج مظهرين خارجيين فقط 4- أ رسم تخطيطية صحيحة تبين ظاهرة العبور التي تسمح بتكون أمشاج جديدة التركيب... الخ. 1.5 ن ب المسافة بين المورثتين هي: $8.8\% + 8.5\% = 17.3\% = 17.3 \text{ CMg}$ 1 ن	1- 2- 3- 4- أ ب
-----------------------------	--	--

	التمرين الثالث: (6 نقط) - تحقيق القانون الأول ل: MENDEL - الآباء من سلالة نقية. -الصفات: الحجم الصغير للثمار والمقاومة للفطر سائدتان تزاوج راجع المورثتان مستقلتان التعليل: الحصول على أربعة مظاهر خارجية بنسب متساوية (تعليل صحيح) أفراد الجيل F_1 : $\frac{R}{r} \frac{F}{f}$ العينة B : $\frac{R}{R} \frac{F}{F}$ شبكة التزاوج: <table><tr><th>الأمشاج</th><th>$\frac{R}{r} \frac{F}{f}$</th><th>$\frac{R}{r} \frac{f}{f}$</th><th>$\frac{r}{r} \frac{F}{f}$</th><th>$\frac{r}{r} \frac{f}{f}$</th></tr><tr><th>$\frac{R}{r} \frac{F}{f}$</th><td>$\frac{R}{r} \frac{F}{f}$ 25 %</td><td>$\frac{R}{r} \frac{f}{f}$ 25 %</td><td>$\frac{r}{r} \frac{F}{f}$ 25 %</td><td>$\frac{r}{r} \frac{f}{f}$ 25 %</td></tr></table> [R F] [R f] [r F] [r f] إنجاز شبكة التزاوج للحصول على نسبة 75% من المظاهر الخارجية المطلوبة إنجاز تزاوجات فيما بين أفراد هذه السلالة أو بتزاوجها مع أفراد العينة A ، فتعطي جيلا متجانسا في الحالتين إذا كانت السلالة نقية	الأمشاج	$\frac{R}{r} \frac{F}{f}$	$\frac{R}{r} \frac{f}{f}$	$\frac{r}{r} \frac{F}{f}$	$\frac{r}{r} \frac{f}{f}$	$\frac{R}{r} \frac{F}{f}$	$\frac{R}{r} \frac{F}{f}$ 25 %	$\frac{R}{r} \frac{f}{f}$ 25 %	$\frac{r}{r} \frac{F}{f}$ 25 %	$\frac{r}{r} \frac{f}{f}$ 25 %	1- 2- أ ب 3- 4- 5- 6-
الأمشاج	$\frac{R}{r} \frac{F}{f}$	$\frac{R}{r} \frac{f}{f}$	$\frac{r}{r} \frac{F}{f}$	$\frac{r}{r} \frac{f}{f}$								
$\frac{R}{r} \frac{F}{f}$	$\frac{R}{r} \frac{F}{f}$ 25 %	$\frac{R}{r} \frac{f}{f}$ 25 %	$\frac{r}{r} \frac{F}{f}$ 25 %	$\frac{r}{r} \frac{f}{f}$ 25 %								
0.75 ن												
0.5 ن												
0.5 ن												
0.5 ن												
0.5 ن												
0.5 ن												
0.5 ن												
1 ن												
0.75 ن												
1 ن												

د. محمد أشباني