

## تمارين حول علم وراثة الساكنة

### تمرين 1:

في سنة 1955 أنسج KETTLEWELL تجارب الاصطياد والإيسام والتحرير ثم إعادة الاصطياد لفراشات أرفية السندر، وذلك في منطقتين متجاورتين ولكن مختلفتين من حيث نسبة التلوث. يلخص الجدول التالي النتائج المحصلة في مناطق مشجرة غير ملوثة في منطقة دورسي (Dorset) وفي منطقة مشجرة ملوثة قريبة من برمنغهام (Birmingham)

المجموع	شكل داكن	شكل فاتح	
969	473	496	- عدد الأفراد الموسومة والمحررة
92	30	62	
-	6,3%	12,5%	
218	154	64	- عدد الأفراد الموسومة المصطادة
98	82	16	
-	53,2%	25,0%	


- أحسب القيمة الانتقائية النسبية والمطلقة بالنسبة لكل شكل في هاتين المنطقتين.
- علق على النتائج المحصل عليها.

علما أنه الاختلاف يعود في تردد الفراشات حسب اللون إلى القدرة على التخفي من الطيور المفترسة.

(3) اربط العلاقة بين هذا المعطى وتردد الفراشات في كل من منطقة دورسي (Dorset) ومنطقة برمنغهام (Birmingham).

في سنوات 1950 تبنت بريطانيا العظمى قانونا ضد التلوث الذي نتج عنه خفض في طرح  $SO_2$  و  $NO_2$  يعطي المبيان التالي انعكاسات هذا القانون على تردد الفراشات الداكنة:

(4) حل المبيان، اربط العلاقة بين قانون محاربة التلوث وتردد الفراشات الداكنة.



### تمرين 2:

عند سلالة من الماعز، تتحكم في لون الفرو مورثة متوضعة على صبغى لا جنسى ذات حلليلين متساويني السيادة: الحليل N يتحكم في اللون الأسود والليل B يتحكم في اللون الأبيض. داخل ساكنة تتألف من 10000 فرد من هذه السلالة، أعطت الدراسة الإحصائية للمظاهر الخارجية النتائج المبينة في جدول الوثيقة 1:

## الوثيقة 2: جدول 2

ddl	0,90	0,50	0,30	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
01	0,016	0,455	1,074	1,642	2,706	3,841	5,412	6,635
02	0,211	1,386	2,408	3,219	4,605	5,991	7,824	9,210
03	0,584	2,366	3,665	4,642	6,251	7,815	9,837	11,34
04	1,064	3,357	4,878	5,989	7,779	9,488	11,67	13,28
05	1,610	4,351	6,064	7,289	9,236	11,07	13,39	15,08

الوثيقة 1			
سوداء	مبقة بالأبيض والأسود	بيضاء	المظاهر الخارجية
3000	1000	6000	العدد الملاحظ

- 1) حدد الأنماط الوراثية المناسبة لمختلف هذه المظاهر الخارجية.
- 2) احسب التردد الملاحظ لمختلف الأنماط الوراثية.
- 3) احسب التردد  $p$  للحيل  $B$  والتتردد  $q$  للحيل  $N$ .
- 4) باستعمال قانون Hardy Weinberg احسب العدد المنتظر (النظري) لمختلف الأنماط الوراثية، بين الطريقة المتبعة ثم ضع القيم المحصلة.
- 5) باستعمال اختبار التطابقية  $\chi^2$ ، حدد هل هذه الساكنة في حالة توازن.

## تمرين 3:

نعتبر الفصائل الدموية ABO، مع  $p$  هو تردد الحيل  $A$  و  $q$  تردد الحيل  $B$  و  $r$  تردد الحيل  $O$ . للإشارة فالحيل  $O$  متحي أمام كل من الحيلين  $A$  و  $B$ . أما الحيلان  $A$  و  $B$  فمتساويا السيادة.

إذا اعتبرنا ساكنة بشرية في حالة توازن:

- 1) اعط العلاقات المحددة لتردد مختلف الأنماط الوراثية عند الجيل الموالي (اعط شبكة التزاوج).
- 2) حدد تردد مختلف المظاهر الخارجية عند هذا الجيل.

## تمرين 4:

في ساكنة بشرية، يقدر تردد حليل التهاب العضلات ب  $q=0,001$ .

- 1) احسب التردد  $p$  للحيل السليم.
- 2) إذا اعتبرنا هذه الساكنة خاضعة لقانون Hardy Weinberg، احسب الترد بالنسبة لـ:
  - الرجال المصابين بالمرض.
  - النساء المصابات بالمرض
  - النساء الناقلات للمرض.

## تمرين 5:

الناعورية مرض وراثي يصيب الإنسان، يتحكم في ظهوره حليل ( $h$ ) متحي مرتبط بالصبغي الجنسي  $X$ . يتردد هذا المرض في صفوف الذكور بنسبة 1%.

- 1) احسب التردد  $q$  لحيل هذا المرض والتتردد  $p$  للحيل السليم.
- 2) حدد التردد المنتظر للنساء المريضات بهذا المرض.
- 3) حدد التردد المنتظر للنساء الناقلات للمرض.

## تمرين 6:

بينت دراسة عند الإنسان على نظام الفصائل الدموية Rhizos أن 14% من الأفراد هم من الفصيلة  $Rh^-$ . علماء أن الحيل  $Rh^+$  سائد على الحيل  $Rh^-$  وباعتبار أن هذه الساكنة تخضع لقانون W-H.

- 1) حدد تردد الحيل  $Rh^-$ .
- 2) حدد تردد الأفراد  $Rh^+Rh^+$  و  $Rh^+Rh^-$  من بين الأفراد.

# هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

## تمرين 7:

عند عينة من 300 شخص، بين تحليل الأنزيم  $\text{Estérase 1}$  وجود ثلاثة حليلات  $E_3, E_2, E_1$ ، تعطي ستة أنماط وراثية توزع كما هو مبين على جدول الوثيقة 1:

الوثيقة 1:						
$E_2E_3$	$E_1E_3$	$E_1E_2$	$E_3E_3$	$E_2E_2$	$E_1E_1$	النطط الوراثي
العدد						
33	57	99	15	24	72	

الوثيقة 2: جدول 2								
ddl	0,90	0,50	0,30	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
01	0,016	0,455	1,074	1,642	2,706	3,841	5,412	6,635
02	0,211	1,386	2,408	3,219	4,605	5,991	7,824	9,210
03	0,584	2,366	3,665	4,642	6,251	7,815	9,837	11,34
04	1,064	3,357	4,878	5,989	7,779	9,488	11,67	13,28
05	1,610	4,351	6,064	7,289	9,236	11,07	13,39	15,08

## تمرين 8:

حوالي 70% من سكان أمريكا الشمالية البيض قادرين على تذوق مادة phenylthiocarbamide في حين لا يملك الباقون القدرة على تذوق هذه المادة، مع العلم أن الحليل المسؤول عن تذوق هذه المادة سائد ونرمز له بـ  $T$  والحليل المسؤول عن عدم التذوق متحي ونرمز له بـ  $t$ .

- إذا اعتبرنا هذه الساكنة تخضع لتوازن Hardy-Weinberg، حدد ترددات المظاهر الخارجية وترددات الحليلات لهذه الساكنة.
- احسب تردد الأفراد مختلفي الاقتران.

## تمرين 9:

في منطقة Idaho تم عزل 900 من الأغنام من سلالة Rambouillet فلواحظ أنها تتكون من 891 فرد ذو صوف أبيض اللون و 9 أفراد ذوي صوف أسود. علما أن الحليل المسؤول عن اللون الأبيض للصوف سائد ونرمز له بـ  $B$  والحليل المسؤول عن اللون الأسود متحي ونرمز له بـ  $b$  وان الساكنة المدرosaة متوازنة.

- حدد ترددات الحليلات وترددات مختلف الأنماط الوراثية.
- احسب عدد الأفراد مختلفي الاقتران.

## تمرين 10: (علوم رياضية)



أقحوان الحصاد من النباتات المركبة، إذ أن أزهارها (الوثيقة 1) في الحقيقة عبارة عن رئيس مركب يتتألف من عدة زهيرات أنبوبية وأخرى ملسنة.

في ساكنة مؤلفة من 375 زهرة لأقحوان الحصاد، مكنت الدراسة الإحصائية من إنجاز جدول لتوزيع ترددات عدد الزهيرات الملسنة. تمثل الوثيقة 2 هذه النتائج.

عدد الزهيرات	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	المجموع
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------

التردد	1	5	18	42	85	65	35	16	10	10	15	20	23	16	08	04	2	375
--------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	-----

- ماذا يسمى هذا النوع من التغير؟
- مثل بيانيا هذا التوزيع بواسطة مصلع الترددات.
- حدد قيمة (قيم) المنوال عند هذه الساكنة.
- ماذا تستنتج حول توزيع هذه الصفة عند هذه الساكنة؟
- احسب المعدل الحسابي لهذه الصفة الوراثية عند هذه الساكنة.
- انطلاقا من شكل مصلع الترددات، هل يمكن إخضاع هذه الساكنة لانقاء اصطناعي؟ بين ذلك.
- اعط العلاقة التي تمكن من حساب الانحراف النمطي المعياري.