


هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma


يتميز الجسم بين ما هو ذاتي فلا يحاربه وما هو غير ذاتي فيتصدى له بإرادته وإبطال مفعوله، هذا التصدي يبدأ بتدخل حواجز طبيعية تمنع تسرب الجراثيم كما تنشأ ردود فعل أخرى مثل التهاب موقع الإصابة. فما هي مختلف الحواجز الطبيعية التي تمنع دخول الجراثيم للجسم؟ وما هي أعراض الاستجابة الالتهابية؟ وكيف تتدخل لمنع تسرب الجراثيم للجسم؟

الوثيقة 2: أعراض الاستجابة الالتهابية

عندما يختلط الماء والسموم الطبيعية، مثل الحمأة أو التهاب المعدة، مع الماء الملوث.




نداة الاستجابة الالتهابية



دخول المراشيم اثر حرج

الوثيقة 1: حواجز الجسم الطبيعية ضد الجراثيم



الوثيقة 3: مسببات الالتهاب: دور الهيستامين


الافتراض بأن الالتهاب ينبع عن تحرير مواد كيميائية في موقع الإصابة الجرثومية واقتصر اسم الهيستامين *L'histamine* لهذه المادة الالتهابية وقد تم اكتشاف نوع من الكريات البيضاء تسمى الخلايا العاملية = الخلايا البدينية تكون منتشرة في أنسجة الجسم وتتدخل في




الوثيقة ٤: بعض الوسائل الكيميائية المتخللة في الاستجابة الالتهابية

الوساط الالتهابية	المصدر الرئيسي	التأثير البيولوجي
الهيستامين	الخلايا البدنية والمحببات والقدادات	تمدد جدار الأوعية الدموية والزيادة في النقادية
الكتين	الصفائحات الدموية	وتضيق المسالك التنسقية
البروستاكولاتدين	الخلايا البدنية التنسجية	الزيادة في نقادية الأوعية الدموية
C5a . C3a	جهاز عامل التكميلة	الاجتذاب الكيميائي للوحيدات

عامل التكملة هو مركب أنيزمي يتكون من عدة بروتينات بلازمية نشبيطة يرمز لها بـ C1, C2, C3 إلى C9 يتم تركيبها من طرف عدة أنسجة كالكبد، الطحال، الأمعاء ... وتشكل 10% من البروتينات البلازمية. تكون هذه البروتينات بشائر أنيزمية غير نشبيطة. لكن خلال الاستجابة المناعية غير النوعية يتم تنشيطها بواسطة مولد المضاد بطريقة تعاقبية تسلسلية حيث يحفز منتوج كل تفاعل التفاعل المولى له.




صورة بالجهر الإلكتروني تظهر مركب الهجوم الغشائي (CAM) في غشاء بكتيريا *E.coli*




مراحل تنشيط عامل التكملة و تشكيل مركب الهجوم الغشائي

الوثيقة 5 دور عامل التكملة في الاستجابة المناعية غير النوعية



الشكل 4



الشكل 3

لتعليمات


1. انطلاقاً من مكتباتك وباستغلال معطيات الوثيقة، أذكر مختلف الحواجز الطبيعية التي تمكن الجسم من منع تسرب الجراثيم لداخله مبيناً كيفية تدخل كل حاجز.
 2. من خلال معطيات الوثيقة 2 ومكتباتك، حدد مختلف أعراض الاستجابة الالتهابية موضحاً دورها في مقاومة الجراثيم.
 3. من خلال معطيات الوثيقة 3، استنتج دور الميستامين في الاستجابة الالتهابية وانطلاقاً من معطيات الوثيقة 4 بين دور كل الوسائل الكيميائية الأخرى.
 4. باستغلال معطيات الوثيقة 5 عرف عامل التكملة واستخرج من الشكل 1 مختلف وظائفه وبالاعتماد على الأشكال 2، 3، و 4 بين كيفية حدوث كل وظيفية.

خلال الاستجابة الالتهابية تتدخل للقضاء على الجراثيم عدة أصناف من الخلايا المناعية ومن أهم طرق تدخل تلك الخلايا البلعمة. فما هي مختلف أصناف الخلايا المتدخلة في الاستجابة الالتهابية وما دور كل واحدة منها في ظاهرة البلعمة؟ وما هي آلية وظروف حدوث البلعمة؟

الوثيقة 1: الخلايا المناعية المتدخلة في الاستجابة الالتهابية



أصناف الخلايا المناعية المتدخلة في المناعة غير النوعية: الوجبات Monocytes



بلعمية كبيرة



وحيدة



موقع فضاء علوم الحياة والارض


أصناف الخلايا المناعية المتدخلة في المناعة غير النوعية: الوجبات Granulocytes



خلية بيضاء



دمضقة



قعدة




علبة


موقع فضاء علوم الحياة والارض

الوثيقة 2: آلية البلعمة



تؤدي البلعمة غالباً إلى انتقال مولد المضاد (الحالة 1) لكن يمكن حدوث الحالتين (2) و (3) إذا كان هناك عجز أنزيمي أو بكتيرية مقاومة.



الشكل 1: ر.ت لمراحل البلعمة



الشكل 4: تمثل الرسوم التخطيطية التالية مراحل البلعمة في حالتين مختلفتين و ذلك بتدخل عامل التكملة أو غيابه




التعليقات

- انطلاقاً من معطيات الوثيقة 1، صف مختلف الخلايا المناعية المتدخلة في الاستجابة المناعية غير النوعية.
- باستغلال الشكلين 1 و 2 من الوثيقة 2، صف مراحل البلعمة و بالاستعانة بمعطيات الشكل 3، بين نتائجها المختلفة.
- قارن البلعمة في حالة التعرف المباشر والتعرف غير المباشر كما يوضح الشكل 4.
- انطلاقاً من كل ماسبق (النشاط 1 و 2) أجز خطاطة توضح فيها آلية الاستجابة المناعية غير النوعية (العلاقة بين الوسائل الكيميائية والخلوية التي تنشط مع الاستجابة الالتهابية وتتدخل في البلعمة).


هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma :)

النشاط 3. وسائل دفاع النوعية (إنجذاب المناعية). خصائصها
يعتبر التلقيح من أهم طرق الوقاية من الأمراض حيث يؤدي تلقيح الفرد إلى إكسابه مناعة خاصة تستطيع القضاء على الجراثيم الخطيرة عند الإصابة بها في وقت قصير.




الوثيقة 1
الكشف عن خصائص النوعية في المناعة المكتسبة
الحرث مرض ناج عن بكتيريا تسمى Clostridium tetani سامة تسمى سمين الكزار تؤدي إلى تقلصات غير طبيعية للعضلات الهيكلية و من ثم إلى الموت. تخلص الوثيقة جانبيه مجموعة من التجارب أجريت للكشف عن الوسائل التي يستعملها الجسم لمقاومة بكتيريا الكزار.

ملحوظة: الذوفان هو سمين فقد قدرته الممرضة و احتفظ بقدرته على إثارة استجابة مناعية.
كل الفئران لها نفس CMH





الوثيقة 2
الكشف عن خصائص النوعية في الوسائل المتدخلة في الاستجابة المناعية
السل هو مرض تسببه بكتيريا تسمى عصيات Koch و تصيب الرئتين. تخلص الوثيقة جانبيه بعض التجارب التي أجريت للكشف عن كيفية مقاومة الجسم لهذه البكتيريا.

ملحوظة: BCG هو شكل وهن غير مرض لهذه العصبة (BCG= bacille de Calmette et Guérin)
BK : bacille de Koch
كل الفئران لها نفس CMH





الوثيقة 3
الكشف عن خصائص النوعية في الوسائل المتدخلة في الاستجابة المناعية
في إطار دراسة مرض الدفتيريا نقترح معطيات التجارب الممثلة في الوثيقة جانبيه.

كل الفئران لها نفس CMH



في إطار الكشف عن بعض خصائص الاستجابة المناعية. نقترح معطيات تجارب التطعيم الجلدي الحالف بين فئران من سلالتين A و B مع قياس المدة الزمنية لرفض الطعام.





ملحوظة: الفئران A و B ليس لهما نفس CMH. بينما الفئران B1 و B2 لها نفس CMH.

للكشف عن بعض خصائص الاستجابة المناعية. نقترح المعطيات التالية:

تحقن مجموعة من الفئران بكريات حمراء لخروف GRM (يلعب دور مولد مضاد). ثم تتبع عدد البلازميات المنتجة لمضادات الأجسام النوعية ضد GRM. ثم تتبع عدد البلازميات المنتجة لمضادات الأجسام النوعية ضد GRM.

تحقن قنية بنفس مولد المضاد في مرحلتين. و تتبع تركيز مضادات الأجسام النوعية في البلازما.







التعليمات

- صف نتائج التجربة الممثلة في الوثيقة 1. ماذا تستنتج بخصوص طبيعة الاستجابة المناعية المتدخلة؟
- تكشف التجربتين الممثلتين في الوثائق 2 و 3 على أن المناعة النوعية تتدخل عبر مسلكين. أبرز ذلك وبين طبيعة كل مسلك.
- استنتاج من خلال تحليل التجربتين 1 و 2 من الوثيقة 4 الخصائص التي تميز بها الاستجابة المناعية النوعية.
- من خلال معطيات التجربة 3، قارن الاستجابة الأولية والثانوية. كيف تفسر تلك النتائج؟
- من خلال تحليل نتائج التجربة 4، استند العناصر المتدخلة في الذاكرة المناعية


هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

النشاط 4: مكونات جهاز المناعة النوعية المكتسبة
يتكون جهاز المناعة من عدة أنواع من الخلايا والأعضاء المنتشرة في كل أنحاء الجسم مما يمنحه القدرة على التصدي لمختلف "المجومات" أيهما كان موقعها فما هي مكونات جهاز المناعة؟ وما هي الخلايا المناعية المتدخلة في الاستجابة المناعية النوعية؟



كريات بيضاء وحيدة النواة		Polynucléaires			نوع الخلايا
Lymphocytes	Monocytes	Basophiles	Eosinophiles	Neutrophiles	
7 - 8	14 - 20	9 - 10	10 - 12	10 - 12	m ⁻³
4000 - 14000	700 - 100	50 - 10	300 - 50	7000 - 2000	عدد الخلايا في mm ⁻³
حوالى 45% إلى 20%	حوالى 7% إلى 3%	حوالى 0.5% إلى 0%	حوالى 3% إلى 1%	حوالى 70% إلى 45%	العدد الكلي هو حوالي 4000 عند 0 و 10000 عند 2

النخاع العظمي أو عقد الحميل		مكان تواجدها	أصلها
الدم والملف	الدم و الملحف وتحول إلى		
والأعضاء المفاوية المحيطية	بلعميات في الأنسجة	الدم و الملحف و الأنسجة	الدم و الملحف و الأنسجة
المناعية النوعية	تنحول إلى بلعميات تقوم ببلعمة العناصر الداخلية	البيكيريات الخليلية	بلعمة و تدمير



التعليمات

1. استنتج من خلال تجارب الوثيقة 1 الأعضاء المناعية المركزية محددا دور كل عضو.


2. من خلال الوثيقة 2، تعرف على مكونات الأعضاء المفاوية المركزية وباستغلال معلومات الوثيقة 3، بين كيف تتوافق تلك الأعضاء.

3. من خلال الوثيقتين 4 و 5، اتفق مختلف الخلايا المناعية حسب أصلها ومدرتها حول المراحل المتداخلة في الاستجابة المناعية النوعية.

Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma


تعتبر المفاهيم A و B أساس الاستجابة المعنوية ولاكتساب قدرتها على القضاء على العناصر الدخيلة تخضع تلك الخلايا لعدة تغيرات تكبسها في الأخير ما يسمى بالكافية النوعية. فما هي مراحل اكتساب الكافية النوعية بالنسبة لكل خلية؟




الوثيقة 2: البنية الجزيئية لمستقبلات المفaoيات B و

- يتكون المستقبل **T** النوعي من سلسلتين بيبتيديتين، تحتوي كل واحدة منها على:
 - ✓ جزء ثابت (**منطقة C**) مدمج داخل الغشاء السينوبلازمي للخلية **T**.
 - ✓ جزء متغير (**منطقة V**) متوجه نحو الخارج ومسؤول عن التعرف الثاني على بروتين **CMH** والمحدد المستضادي.

- لقد مكنت تقنيات معقدة من تمييز مجموعتين من الكريات المقاوية T، حسب وجود أو عدم وجود جزيئات معينة على غشانها. فنميز بذلك:
 - ✓ الكريات المقاوية T4 : تحمل **CD4** وقدرة على التعرف والارتباط بجزيئة **CMH II** -
 - ✓ الكريات المقاوية T8 : تحمل **CD8** وقدرة على التعرف والارتباط بجزيئة **CMH I** .



الوثيقة 3: انتقاء
الكريات المفاولية
 ذات الكفاية
 المناعية في الغدة
 السعترية




التعليمات


1. انطلاقاً من معطيات الوثيقة 1، بين كيف تكتسب المقاويات B و T الكفاية النوعية.
 2. تميز مستقبلات المقاويات بالنوعية. أبرز ذلك من خلال معطيات الوثيقة 2.
 3. أثناء نضج المقاويات يتم انتقاء المقاويات ذات الكفاية النوعية. بين كيف يحدث ذلك مستعيناً بمعطيات الوثيقة 3.

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma


يبين الدراسات السابقة أن من أهم خصائص الاستجابة المناعية النوعية أنها تعتمد عدة مسالك منها المسار الخلوي حيث يكون المتدخل في المناعة هي الخلايا المهاوية، فما هي شروط تدخل المسار الخلوي في المناعة؟ وما هي آلية تدخله؟




الوثيقة 2: تفسير نتائج التجارب الممثلة في الوثيقة 1



رأينا سابقاً أن مولادات المضاد غير الذاتية، التي يتعذر احتلالها في بورة الالتهاب، تنتقل عن طريق العروق اللمفاوية إلى العقد اللمفاوية المجاورة لموقع الخمج حيث تنطلق الاستجابة المناعية النوعية والتي تتضمن ثلاث أطوار أساسية:



انطلاقاً من خلائقك أشكال الوثيقة ١٧، صف كل طور من أنظمة الاستجابة المعايير النوعية بوسبيط خلوي



التعليقات


- انطلاقاً من تحليك لنتائج التجارب المعمّلة في الوثيقة 1، استخرج شروط هدم الخلايا المعمّلة من طرف المقاويات T وباستغلال معطيات الوثيقة 2، فسر نتائج تجارب الوثيقة 1.
 - بين من خلال معطيات الوثيقة 3 كيف تعرف المقاويات Tc على الخلايا الهدف (طور البحث) وكيف ينشط ذلك التعرف طور عملية التكاثر (طور التضخم)
 - من خلال معطيات الوثيقة 1، صرّح بـ هدم الخلايا المعمّلة من طرف المقاويات القاتلة Tc (طور الالبيدي)

هذا الملف تم تحميله من موقع : [Talamid.ma](#) | اخبار التعليم | منتدى المعلم العربي


إضافةً للمسلك الخلوي لمواجهة العناصر الداخلية، يؤدي دخول مولد مضاد معين إلى الجسم إلى إنتاج مضادات أجسام نوعية من طرف البلازميات تقوم بالقضاء على الأجسام غير الداتية ويسعى هذا بالمسلك الخلوي في الاستجابة المناعية. فما هي ميزات مضادات الالجسام؟ وما هي آلية تدخلها في الاستجابة المناعية؟

الوثقة 1: الكشف عن طبيعة المادة الممنوعة

تجربة 2: تم حقن حيوان غير ملечен ضد الكزار بواسطه الكريونات ٧ بعد عزلها بواسطه التقنية السابقة (في التجربة ١). ثم نحقن بعد ذلك هذا الحيوان بسمين الكزار. يبقى الحيوان حيا.
ويعطى خليل دمه وجود كريونات ٧ مثبتة على سمين الكزار.




شكل 1: مصل قبل الحقن




شكل 2: مصل بعد الحقن بذوفان الكزاز

نجز 7 حفر في علبة بيترى بها جيلاتين (مادة تسمح بانتشار الجزيئات في جميع الإتجاهات). في المفرة 1 نضع مصل قنية سبق أن حقننا بـZL مصلى للثور SAB وفى الحفر الخيطية توضع مولدات مضاد مختلفة.





شكل المركب المنبع



الوثيقة 2: الكشف عن ارتباط المادة الممنوعة بملد المضاد

الوثيقة 3: بنية وأصناف مضادات الاجسام




، سـم تـخطـطـي، تـفـسـيرـي، لـحـزـنـة مـضـادـ الأـحـسـام

						أصناف مضادات الأجسام
Ig D						Ig G
آثار	آثار	[15- 20]	10	[70- 75]	% بالنسبة لمجموع Ig	
- مضادات أجسام غير متنقلة. - مستقبلات B غشائية لـ IgM (BCR).	- تتدخل في مقاومة الطفيلييات. - التثبيت على القعدهات والخلايا البدنية.	- يوجد أساسياً في الأفرزات: الدموع، اللعاب، الحليب... - استجابة مناعية محلية...	- البنية الأحادية لـ IgM تلعب دور مستقبلات غشائية للمفابويات B (BCR). - البنية الخماسية لـ IgM (قدرة عالية على إبطال عامل التكملة مفعول مولد المضاد)...	- مضادات أجسام متنقلة تخترق المشيمة لحماية الرضيع - تثبيت وتنشيط بروتينات	أهم الخصائص	

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma


الوثيقة 4: الأصل الوراثي لتتنوع مضادات الأجسام
إن تركيب الكريوبين المناعي هو تحت رئاسة مورثتين، واحدة بالنسبة للسلسلة الثقيلة وال أخرى بالنسبة للسلسلة الخفيفة. ويتم ذلك خلال مرحلة تضيّع الكريات المقاويمية **B** وقبل أي تماّس مع مواد المضاد. إن هذه المورثات تكون عند الكريات المقاويمية غير الناضجة على شكل أجزاء مشتّطة على طول الصبغى. حيث يتم تجميّعها قبل الاستنساخ حسب برنامج دقيق لكنه خاضع للصدفة.




- ★ تتألف المورثة المسؤولة عن تركيب السلسلة الثقيلة من أربعة أجزاء يشار إليها بالحروف **C,J,D,V** متوضّعة على الصبغى **14**
- ★ تتألف المورثة المسؤولة عن تركيب السلسلة الخفيفة من ثلاثة أجزاء يشار إليها بالحروف **C,J,V** متوضّعة على الصبغى **2**.
- ★ هناك عدة نسخ من الأجزاء **V** و **D** ولـ. وهذه المورثات هي المسؤولة عن تركيب المنطقة المتغيّرة.
- ★ هناك نسخة واحدة من الجزء **C**. وهذه المورثة هي المسؤولة عن تركيب المنطقة الثابتة.

الوثيقة 5: آلية الإستجابة المناعية ذات وسيط خاطي


الشكل 1: رسم تفسيري لانتقاء العلمي للمقاويات B



الشكل 2: مراحل الإستجابة المناعية الخلطية



الشكل 3: أدوار مضادات الأجسام





التعليمات

1. صف نتائج التجربة 1 الممثلة في الوثيقة 1 واقتصر تفسيراً لها.
2. باستغلال معطيات التجربة 2 من الوثيقة 1 وإجابتك على السؤال السابق، ماذا تستنتج بخصوص طبيعة الاستجابة المناعية المتدخلة؟
3. انطلاقاً من الوثيقة 2 وعلماً أنه عند ارتباط مولد المضاد بمضاد الأجسام يظهر في التحضير قوس يسهل رصده، فسر النتائج الملاحظة في نهاية التجربة.
4. باستغلال معطيات الوثيقة 3، صف بنية مضادات الأجسام وقارن بينها.
5. باستغلال معطيات الوثيقة 4، بين لماذا تتميز مضادات الأجسام بالتنوع الوراثي.
6. من خلال معطيات الشكل 1 من الوثيقة 5، صف آلية الانتقاء العلمي للمقاويات B التي يمكنها إنتاج مضادات الأجسام.
7. انطلاقاً من معطيات الشكل 2 من الوثيقة 5، صف مراحل الاستجابة المناعية الخلطية.
8. لمضادات الأجسام عدة أدوار التخلص من مولد مضاد، أزرق الماء تأثيراً من الشكل 3 من الوثيقة 5.



هذا الملف تم تحميله من موقع [Talamid.ma](#) | النسخة: 8.0 | النسخة: 8.0 | النسخة: 8.0

يتميز جهاز المناعة بوجود عدة أنواع من الخلايا المناعية ذات مظاهر ووظائف مختلفة والتي تتدخل بشكل متزامن في التصدي لغير الذاتي مما يعني أن هناك تعاون بينها. فكيف يحدث التعاون الخلوي أثناء الاستجابة المناعية؟



الوثيقة 3

تترعرع لمقاویات T ، مأخذة من شخص سليم، بحضور مواد منبهة تتubby دور مولدات المضاد. تأخذ السائل الطافي للزرع، ثم تضيفه إلى وسطي زرع، الأول به لمقاویات T ، والثاني به لمقاویات B . بين التحليل الكيميائي للسائل الطافي، وجود مادة كيميائية (الانترلوكين 2)، كما بين التحليل الخلوي للمقاویات، أن الكريات المقاویة التي تفرز الانترلوكين 2 هي T_4 .



۱۰۷

1. انطلاقاً من تحليل نتائج التجاربتين الممثلتين في الوثيقتين 1 و 2، ماذا تستنتج بخصوص شكل التعاون الملاحظ بين الخلايا المناعية؟
 2. اعتماداً على معطيات الوثيقة 3، بين كيفية حدوث التعاون بين الخلايا المناعية.
 3. باستغلالك معطيات الوثائقين 4 و 5، حدد مرادل التعاون الخالي المهدية لتشطط الكريات المنفحة وبين كيف تساهله العقد المتمامق في ذلك التعاون.