


هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma حلول تمارين الجيولوجيا

حل التمرين 1 :

الأدلة المؤيدة لوجود منطقة طمر في هذه الجهة:


- وجود منطقة تماّس بين الصفيحتين الصخريتين: صفيحة Tyrrhénienne في الشمال الغربي وصفيحة Ionienne في الجنوب الشرقي.
- وجود تضاريس تطابق البراكين البارزة للجزر أو البراكين التحبرية، في حين لا توجد أي إشارة في الوثيقة لوجود حفر.
- صهارى غنية بالسيلىس وهي مصدر البراكين.
- توزيع هندسى خاص للزلزال، فالبؤر الزلزالية تصبح أكثر عمّقاً كلما ابتعدنا عن منطقة التجاّبه واتجهنا نحو الشمال الغربي، كما أنها تتوزّع بشكل مائل مجسدة ما يسمى بمستوى Bénioff، وهو مستوى ما يتطابق انغراز صفيحة Ionienne في الرداء العلوي الساخن لصفيحة Tyrrhénienne.




حل التمرين 2 :

1) طيات وفوالق.

2) تمثل الرسوم التخطيطية التالية مختلف أنماط التشوّهات الفوالق وعناصرها:





3) نمط السلسلة الجبلية المميزة لمنطقة CUZCO هو سلسلة الطمر، والظاهرة الجيولوجية المسببة لها هي ظاهرة الطمر. والأدلة:


- نشاط بركاني وزلزالي هام يدل على وجود هامش نشيط على حدود الصفيحتين.
- وجود حفرة محيطية موازية للهامش النشيط.
- ارتفاع عمق البؤر الزلزالية مروراً من الحفرة المحيطية إلى القارة (مستوى Bénioff).

4) ينتج عن انغراز الصفيحة المحيطية تحت الصفيحة القارية تحرير الماء من الصفيحة المنغرة تحت تأثير الضغط والحرارة بالأعماق.

ينتشر هذا عبر الرداء فيصبح هذا الأخير تحت شروط الانصهار الجزئي ويعطي صهارة. تتعرض الصهارة الناتجة لتبريد بطيء قبل الوصول إلى السطح مكونة بلوتونات الكرانوديوريت. تتعرض الصخور التي تعلوها للحث فتستطع هذه الصخور الداخلية المنشأ.

رسم تخطيطي لظاهرة الطمر يبين:

- انغراز الصفيحة المحيطية تحت الصفيحة القارية.
- البركانية الأنديزية.
- تشكيل بلوتونات الكرانوديوريت في العمق.



⇒ تحليل الوثائق:

★ تحليل الوثيقة 1: تبين هذه الوثيقة تضاريس جد بارزة ذات اتجاه الشمال الغربي / الجنوب الشرقي في الحدود بين الصفيحة العربية والصفيحة الأوروآسيوية، نلاحظ أيضاً لازل محلية مختلفة الشدة على طول السلسلة الجبلية حيث البؤر الزلزالية القريبة من السطح توجد على عمق 110 كم تقريباً. هذه الوثيقة تمكناً من استخراج مؤشرات من طبيعة تكتونية وزلزالية حول النشاط الجيولوجي للمنطقة.

★ تحليل الوثيقة 2: نلاحظ في الجهة الشمالية الغربية للمقطع الجيولوجي قوساً صهارياً يتضمن الكرانوديوريت بعمر يتجاوز 65 مليون سنة، هذا النوع من الصخور يصدر عن صهارة تبلورت بشكل بطيء في الأعماق. تعبّر الأوفيليتات المتحولة الموجودة في المنطقة المتحولة عن صفيحة محيطية، وهي دليل على وجود محيط قديم في هذه المنطقة.

مختلف الوحدات الرسوبيّة المشوّهة في الجنوب الغربي وكذلك التماسات العديدة الغير عاديّة (MZT, HZF) دليل على قوى انضغاطية مسلطة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي أدت إلى تقصير القشرة.

★ تحليل الوثيقة 3، a: يضم الميتاكابرو معدني الكلوكوفان والجادايت، وهذين الأخيرين لا يتواجدان في الكابرو المحيطي أثناء تشكّله على مستوى الذروة.

★ تحليل الوثيقة 3، b: تشير إلى ظروف ظهور الكلوكوفان والجادايت. فوجودهما المتزامن خاص بالمنطقة C وفي عمق يتراوح بين 30 و40 كم، وفي درجة حرارة تتراوح بين 130°C و400°C. وهي شروط تتعرض لها القشرة المحيطية أثناء الطرmer. وما الميتاكابرو الموجود في أوفيليت Zagros إلا دليل على تعرض قشرة محيطية لتحولات عيدانية أثناء ظاهرة الطرmer.

⇒ الرابط بين معطيات الوثائق:

انطلاقاً من معطيات الوثائق يمكننا عرض أهم المراحل الجيولوجية لنشأة هذه السلسلة الجبلية الموجودة في حدود الصفيحتين العربية والأوروآسيوية.

نُتّجت هذه السلسلة عن تسلسل ظواهر عديدة أهمها:

- ✓ تتوّزع البؤر الزلزالية بشكل مائل (مستوى Bénioff) والذي يجسد بداية انغراز الصفيحة العربية تحت الصفيحة الأوروآسيوية.
- ✓ مع بداية انغراز القشرة المحيطية نسجل مجموعة من المظاهر الزلزالية والبركانية.
- ✓ خضوع صخور القشرة المنغرة لظروف ضغط وحرارة مختلفة تماماً عن تلك التي تشكّلت فيهما الشيء الذي نتّج عنه حدوث تحولات عيدانية وظهور معدني الكلوكوفان والجادايت.
- ✓ يؤدي الماء المحرر أثر تحول صخور القشرة المنغرة إلى تمييّه الرداء العلوي للصفيحة الراكبة الشيء الذي ينجم عنه بداية الانصهار الجزئي للبيريدوتيت وظهور الصهارة التي هي مصدر بلتونات الكرانوديوريت.
- ✓ يمكن عمر الكرانوديوريت من القول بأنّ الطرmer بدأ قبل (65MA).
- ✓ بعد الانغراز الكلي للقشرة المحيطية وانسداد المحيط، تدخل الصفيحتين القاريتين في اصطدام.
- ✓ تؤدي القوى الانضغاطية إلى تقصير عام للبنيات وظهور تراكبات كبيرة، بحيث أنّ جزءاً من الصفيحة الأوروآسيوية يركب فوق الصفيحة العربية مشكلاً السلسلة الجبلية.

حل التمرين 4:

⇒ دراسة الوثائق:

★ الوثيقة 1: تقع سلسلة جبال الهملايا في الحدود الواقعة بين الصفيحتين الصخريتين: الهندية في الجنوب الغربي والأوروآسيوية في الشمال الشرقي. بالانتقال في المقطع AA' من الجنوب في اتجاه الشمال نجد سلسلة من الأحداث التي تبيّن أصل سلسلة جبال الألب.

✓ نسجل أولاً تتابع ثلاثة تراكبات (MFT, MIT, MCT) وكذلك تضاريس عالية: "أنابورنا" 8091m، "افيريست" 8850m، إنها شواهد على ظواهر الاصطدام بين صفيحتين قاريتين.

- ✓ نلاحظ أيضا خيطة بها أوفيليت ورواسب بحرية. والأوفيليت هي جزء من القشرة المحيطية والرداة العلوي المكونة لصفحة محيطية قديمة والتي زحفت فوق القشرة القارية اثر اصطدام بين صفيحتين قاريتين. وبهذا يمكننا افتراض أن بحرا كان في هذه المنطقة يفصل بين الكتل القارية لصفحيتين الهندية والأوروآسيوية قبل تشكيل سلسلة جبال الهملايا. وما يؤيد هذه الفرضية وجود رواسب بحرية فوق كتل هذه السلاسل الجبلية.
- ✓ رواسب موشور التضخم تترجم حدوث طمر بين صفيحة محيطية وأخرى قارية. يتشكل موشور التضخم انطلاقا من رواسب القشرة المحيطية المنفرزة، والتي بفعل ضعف كثافتها لا تطمر بل تكشط وتتجمع في منطقة الحفر المحيطية.
- ✓ وجود كرانيت الطمر شاهد على وجود صهاريه خاصة بمناطق الطمر في هذه المنطقة. أثناء الطمر يؤدي تحول صخور الصفيحة المنفرزة التي تحرر الماء الذي يميه ببریدوتيت الرداء العلوي لصفحة الراكبة ويعطي صهاريه تتبلور في الأعماق لتعطي صخورا بلوتونية كالكرانيت.
- ✓ وجود الأوفيليت والرواسب البحرية دليل على وجود بحر بين الصفيحتين الصخريتين.
- ✓ وجود موشور التضخم وكرانيت الطمر يدلان على اختفاء لهذا المحيط اثر ظاهرة الطمر. ووجود تراكبات وتضاريس عاليه يؤيد فرضية اصطدام صفيحتين قاريتين الهندية والأوروآسيوية عند توقف الطمر.

★ الوثيقة 2: يبين المقطع الجيولوجي ما يلي:

- ✓ الطيات والفوالق المعكوسه مؤشرات على وجود قوى انضغاطية وبالتالي قوى تقارיבية.
- ✓ قشرة قارية مشوهه ومحولة دليل على قوى انضغاطية ، التي تؤدي إلى تغير ظروف الضغط والحرارة.
- ✓ استسطاح الكرانيت الذي يبين على أن القوى الانضغاطية ساهمت في صعود المادة العميقه إلى السطح.
- ✓ ترافق وحدات معزولة بتراكبات كبيرة والتي تخترق في بعض الأحيان القشرة والرداء، وهذا الترافق هو أصل تضخم القشرة القارية والتراكبات ذات الاتجاه جنوب شمال تعطي فكرة عن منحي طمر الصفيحة الهندية، حيث أن الجزء المحيطي انغرز بفعل الطمر وتوقف تحت الصفيحة الأوروآسيوية الراكبة.
- ✓ نلاحظ في المنطقة الأكثر علوا في سلسلة الهملايا وبالضبط في المنطقة المتعامدة مع الخيطة الأوفيليتية انقطاعا عميقا شيئا ما بين القشرة والرداء العلوي (حوالي 60 كلم) في حين أن انقطاع MOHO يوجد عادة على عمق 30 كلم تقريبا، لدينا ادن جذر هام. وعموما فان معطيات الوثيقة 2 تؤيد ما جاء في الوثيقة 1. المؤشرات المورفولوجية (التضاريس المرتفعة)، التكتونية (الطيات، الفوالق، والتراكبات)، والبنيوية (انقطاع MOHO، ترافق الوحدات) تعد أهم الخصائص والمميزات لاصطدام صفيحتين صخريتين اثر قوى انضغاطية والتي في حالة سلسلة جبال الهملايا لها اتجاه من الجنوب إلى الشمال. وتتعرض السلسلة حاليا لعوامل تمكن من استسطاح الصخور البلوتونية.

★ الوثيقة 3، a: توضح أن الميتاكابرو الموجود في الأوفيليت يحتوي على معندي الكلوكوفان والجادايت.

- ★ الوثيقة 3، b: نلاحظ على أن مجال استقرار الكلوكوفان والجادايت يوجد في المنطقة C أي في درجة حرارة تتراوح ما بين 100 و 400°C وضغط يتراوح ما بين 0.7 و 1.4 وهي تطابق عمقا يصل إلى 23 إلى 48 كلم. هذه المعادن تدل على أن الميتاكابرو والأوفيليت تشكلت في الأعماق الكبيرة اثر الطمر قبل أن يصل إلى السطح، وبذلك فان فرضية انسداد المحيط بفعل الطمر مؤكدة.

← خلاصة:

دلالات جيولوجية عديدة في منطقة الهملايا تبين وجود بحر قديم والذي احتفى اثر الطمر. فالمؤشرات التكتونية والأوفيليتية تدل على حدوث اصطدام اثر ظاهرة الطمر بين الصفيحتين الهندية والأوروآسيوية، وانغراز الأولى تحت الثانية مؤدية إلى نشوء سلسلة جبال الهملايا. وتتعرض حاليا هذه الأخيرة لعوامل التعرية الشيء الذي مكن من استسطاح الصخور التي تشكلت في الأعماق وساهم في صعودها الاصطدام.

حل التمرين 5:

- إن الكرانيت صخرة صهاريه بلوتونية، ونميز بين نوعين من الكرانيت حسب خاصية كل واحد منها.
- ★ **الكرانيت (أ):** يتميز بمساحة صغيرة وبهالة تحول تحيط به على شكل صخرة شيسية. كما أن حدوده تتنافر مع الصخور التي تحيط به كأنما هضم جزءا منها. ويسمى بالكرانيت الاندساسي.
- ★ **الكرانيت (ب):** وهو الكرانيت الأنانكتي، يتميز بمساحة شاسعة (مئات الكيلومترات المربعة) حدوده متوازية ومتطابقة مع الصخور المجاورة، خصوصا صخرة الغنائيس التي تضم من مكان لآخر كتلا من صخرة الميكماتيت.

إن الكرانيت الأناتكتي كرانيت ناتج عن ظاهرة الانصهار الذي تتعرض إليه الصخور السابقة الوجود تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة. بعد انخفاض هذه الأخيرة تتصلب الصهارة الكرانيتية في مكانها. وفي نفس الوقت يصاحب هذا الكرانيت تحولاً إقليمياً أو عاماً يتمثل في ظهور صخرة الغنائي والمكماتيت. أما إذا حدث وصادفت الصهارة الكرانيتية شقوقاً في الصخور فإنها تتسلب إليها وتتصعد إلى مستويات أعلى دون أن تصل إلى السطح. وخلال صعودها تتخض درجة حرارتها فتتصلب الصهارة مكونة الصخرة الكرانيتية المنسنة وسط الصخور الرسوبيبة. وبذلك يأخذ اسمه الكرانيت الاندساسي.

وبما أن هذه الصهارة التي أدت إلى تكوين هذا الكرانيت لا زالت درجة حرارتها مرتفعة نسبياً، فهذا يؤدي إلى ظهور صخرة تحولية وهي الشيست على شكل هالة تحيط بالكرانيت.

يتبع من كل ما سبق أن الكرانيت نوعان: اندساسي وأناتكتي، أصلهما نفس الصهارة لكن إذا تصلبت في مكانها فإن هذه الصهارة تعطي الكرانيت الأناتكتي، أما إذا تصلبت في مستوى أعلى أي غير مكان تكونها فإنها تؤدي إلى تكون كرانيت اندساسي. وكل واحد نوعي الكرانيت يتميز بخصائصه الجغرافية وكذا الصخور المتحولة المحيطة به.

حل التمرين 6:

★ الوثيقة 1:

إن كل مجموعة صخرية من المجموعات المتحولة تتحدر من نفس الصخرة الأصلية تشكل ما نسميه بالسلسلة التحولية أو الممتالية التحولية، فمثلاً الطين وهي صخرة رسوبيبة تتحول إلى شيست في درجة تحول ضعيفة ثم يصبح هذا الشيست ميكاشيسن ثم غنائي في درجة تحول أقوى. أما إذا كانت الصخرة الأصلية هي البازلت وهي صخرة صهارية فإن الصخور المتحولة التي ستحدر منها هي الشيست الأزرق ثم الأكلوجيت. ونفس الشيء بالنسبة للممتاليات الأخرى. إذن فكل سلسلة تحولية تتحدد من خلال نوع الصخرة الأصلية.

★ الوثيقة 2:

تمثل الوثيقة 2 ظاهرة الطمر والمتمثلة في انغراز الغلاف المحيطي تحت الغلاف القاري. وخلال انغرازها نلاحظ أن الصخرة الصهارية المكونة للقشرة المحيطية أي البازلت تتحول إلى شيست أزرق ثم بعده وفي مستوى أعمق إلى أكلوجيت. تصاحب ظاهرة الطمر هذه ظاهرة الانصهار الجزئي للغلاف الصخري المحيطي وكذا تشكل السلسلة الجبلية.

★ الوثيقة 3:

تبين هذه الوثيقة أنواع التحول وهي:

- تحول حراري: ويتميز بتدخل عامل الحرارة على الخصوص.
- تحول دينامي: وهو تحول ناتج عن تدخل عامل الضغط فقط.
- تحول دينامي حراري: تحول راجع لتدخل عامل الضغط والحرارة في نفس الوقت.


أما الرابط بين الوثائقين فيهدف إلى تحديد نوع التحول الذي تشهده منطقة الطمر. إن ظاهرة الطمر تنتج عن قوى انضغاطية يمارسها الغلاف المحيطي على الغلاف القاري أي تدخل عامل الضغط، فلهذا فإن السلسلة التحولية المتواجدة بالمنطقة هي سلسلة سببها ارتفاع الضغط وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتحول دينامي ونسميه أيضاً بتحول الطمر.

ختاماً فإن التحول ظاهرة تصيب صخوراً سابقة الوجود بتدخل عامل الضغط أو الحرارة أو هما معاً. وبذلك تتحدد السلسلة التحولية حسب الصخرة الأصلية وكذا العامل المتدخل في التحول.

حل التمرين 7:

تصاب التشكيلات الصخرية بتشوهات تكتونية، وحسب بنية وتركيب هذه الصخور وتموضعها في الغلاف الصخري يختلف رد فعلها فتظهر الطيات أو الفوالق. كما أنه لكل واحد من التشوهين عناصر يتميز بها ويعتمد عليها التصنيف. فعلى ماذا يعتمد في تصنيف هذين التشوهين وكيف يتكونان؟

★ يرتبط نمط التشوه التكتوني، بعوامل خارجية أهمها: العمق الذي يحدد تغيرات الضغط ودرجة الحرارة والزمن والحركات التكتونية. وعوامل داخلية أهمها: خصائص المرونة والميوية. أنظر الرسم أسفله:





نعتبر كل من الطيات والفالق تشوّهات تظهر على الصخور كنتيجة لقوى انتضاجطية أو تمددية بحيث أن الأولى تؤدي إلى تشكيل الطيات والفالق المعكوس. أما الثانية فإنها تؤدي إلى تشكيل الفوالق العادي.

وتختلف استجابة الصخور للضغوط التكتونية حسب العمق:

✓ على السطح تكون ظروف الضغط والحرارة منخفضة، فتكون الصخور هشة مما يجعل التشوّهات التكتونية من النوع الكسور. وتمثل أساساً في الفوالق المعكوس والسدائم المرتبطة بها.


✓ في العمق يزداد الضغط والحرارة مما يجعل الصخور مرنة، فتصبح التشوّهات التكتونية على شكل طيات متساوية السمك، ثم متغيرة السمك مع ارتفاع العمق.






★ قبل إبراز أنواع الفوالق والطيات لا بد من إبراز عناصرها أولاً:



★ أما تصنیف التشوّهين فيبرز أنواع كل واحد من التشوّهين كما يلي:

↳ الطيات: يعتمد التصنیف على الزاوية α التي تشكلها المساحة المحورية مع المستوى الأفقي.



				
فالق عادي - مساحة محورية مائلة - ابتعد الكتلتين a و b المشطورتين - ميلان الفالق نحو الكتلة المحفوظة.	فالق ممعكوس - مساحة محورية مائلة. - ابتعد الكتلتين a و b المشطورتين. - ميلان الفالق نحو الكتلة المرفوعة.	فالق عمودي - مساحة محورية عمودية.	انقلاب مياسر - الحركة النسبية للكتلتين a و b في اتجاه معاكس لعقاب الساعة.	انقلاب ميامن - الحركة النسبية للكتلتين a و b في اتجاه عقارب الساعة.

نستخلص مما سبق أن القوى الانضغاطية أو التمددية التي تصيب الصخور تؤدي إلى ظهور الطيات والفوائق حسب مرونة أو صلابة التشكيلات الصخرية وحسب تموسيعها في الغلاف الصخري.