

Définition

Soient f une fonction continue sur I et F une primitive de f sur I et a et b deux éléments de I

- L'intégrale de f de a à b est le nombre réel :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Propriétés

- $\int_a^a f(x) dx = 0$
- $\int_a^b k dx = k(b - a)$
- $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ (relation de Chasles)
- $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$ (la linéarité)
- $\int_a^b K f(x) dx = K \int_a^b f(x) dx$

L'intégrale et l'ordre

- $\forall x \in [a, b] \quad f(x) \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$
- $\forall x \in [a, b] \quad f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

La valeur moyenne

f une fonction continue sur I et a et b deux éléments de I tel que $b > a$

- Il existe un nombre c de $[a, b]$ tel que $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$
- Le nombre $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ appelé la valeur moyenne de f sur $[a, b]$

Intégration par parties

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$


- Le choix de u (fonction à dériver) se fait selon l'ordre de L vers S

L	P	E	S
$\ln$	polynôme	$\exp$	$\sin ; \cos ; \tan$


Calcul des aires

- L'air du domaine délimité par (C_f) et l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ est : $\left(\int_a^b |f(x)| dx \right) ua$

- ua est l'unité de l'air $ua = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$



- L'air du domaine délimité par (C_f) et (C_g) et les droites $x = a$ et $x = b$ est $\left(\int_a^b |f(x) - g(x)| dx \right) ua$



Calcul des volumes

- Le volume du solide engendré par la rotation de (C_f) autour de l'axe des abscisses un tour complet sur $[a, b]$ est donné par $\left(\int_a^b \pi (f(x))^2 dx \right) \times uv$

- uv est l'unité de volume $uv = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \times \|\vec{k}\|$

