

محور التماثل – مركز التماثل

نقطة الانعطاف

ذ. محمد الكيال

← محور التماثل:

يكون المستقيم الذي معادلته $x = a$ محور تماثل للمنحنى (C_f) إذا تحقق الشرطان التاليان:


$$\begin{aligned} \forall x \in D_f \quad (2a - x) \in D_f & \quad \bullet \\ \forall x \in D_f \quad f(2a - x) = f(x) & \quad \bullet \end{aligned}$$

← مركز التماثل:

تكون النقطة $I(a, b)$ مركز تماثل للمنحنى (C_f) إذا تحقق الشرطان التاليان:


$$\begin{aligned} \forall x \in D_f \quad (2a - x) \in D_f & \quad \bullet \\ \forall x \in D_f \quad f(2a - x) + f(x) = 2b & \quad \bullet \end{aligned}$$

← النقص – النحد – نقطة الانعطاف:




يكون منحنى دالة مقعرا على مجال إذا كان يوجد تحت جميع مماساته على هذا المجال

إذا كان: $\forall x \in I \quad f''(x) \leq 0$
فإن: المنحنى (C_f) يكون مقعرا على المجال I



يكون منحنى دالة محدبا على مجال إذا كان يوجد فوق جميع مماساته على هذا المجال

إذا كان: $\forall x \in I \quad f''(x) \geq 0$
فإن: المنحنى (C_f) يكون محدبا على المجال I



نقطة انعطاف منحنى دالة هي نقطة من المنحنى التي عندها يتغير تقعر هذا المنحنى

إذا كانت f'' تنعدم في x_0 مع تغيير الإشارة
فإن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف أفصولها x_0

إذا كانت f' تنعدم في x_0 دون تغيير الإشارة
فإن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف أفصولها x_0