

I- توجيه الفضاء
1- معلم موجه في الفضاء


ننسب الفضاء E إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$

$$\overrightarrow{OK} = \vec{k} \quad \overrightarrow{OJ} = \vec{j} \quad \overrightarrow{OI} = \vec{i}$$

لتكن I و J و K ثلات نقط حيث I و J نقطتان على خط OK و K نقطة في E .

« رجل أمبير » للمعلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ هو رجل خيالي رأسه في النقطة K قدماه على النقطة O و ينظر إلى I .

النقطة J إما توجد على يمين « رجل أمبير » أو على يساره .



تعريف :

الفضاء منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. . . لتكن I و J و K ثلات نقط حيث $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$.
نقول إن $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ معلم مباشر إذا وجدت J على يسار « رجل أمبير »
 $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ معلم غير مباشر إذا وجدت J على يمين « رجل أمبير » *

أمثلة * نعتبر $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ معلم مباشر


$(O; \vec{j}; \vec{i}; \vec{k})$ معلم غير مباشر

$(O; \vec{j}; \vec{k}; \vec{i})$ معلم مباشر

$(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$ مكعب $ABCDEFGH$ **

علماء مباشرون $(B; \overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BF})$

علماء غير مباشرين $(A; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AE})$ ، $(E; \overrightarrow{EA}; \overrightarrow{EF}; \overrightarrow{EH})$



2- الأسرة المعاشرة

يمكننا توجيه الفضاء V_3 ، اذا وجهنا جميع أساساته

تعريف

نقول إن الأساس المتعامد الممنظم $(o; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ مباشر ادا كان $(o; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ م.م.م. مباشر مهما كانت النقطة O من الفضاء

3- توجيه المستوى

ليكن (P) مستوى في الفضاء و \vec{k} متوجهة واحدية و منتظمية على (P) ، و O نقطة من المستوى (P) .
 $(O; \vec{i}; \vec{j})$ م.م.م. للمستوى (P)

لدينا $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ معلم متعامد ممنظم للفضاء E

يكون المعلم المتعامد الممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ في المستوى (P) معلمًا مباشراً إذا كان المعلم المتعامد

الممنظم $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ مباشراً

* يتم توجيه مستوى (P) بتوجيهه متوجهة منتظمة عليه.

* كل المستويات الموازية ل(P) له نفس توجيه المستوى (P)

II - الحداء المتحقق

1- تعريف

لتكن \vec{u} و \vec{v} متوجهتين من الفضاء V_3 و A و B نقطتين من الفضاء E بحيث $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ الجداء المتجهي للمتجهتين \vec{u} و \vec{v} في هذا الترتيب، هو المتجهة التي لها بـ $\vec{v} \wedge \vec{u}$ المعرفة كما يلي

* إذا كانتا \vec{u} و \vec{v} مستقيمتين فان $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

* إذا كانتا \vec{u} و \vec{v} غير مستقيمتين فان $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u}$ هي المتجهة التي تتحقق:

- $\vec{u} \wedge \vec{v}$ عمودي على كل من \vec{u} و \vec{v} .

- $(\vec{u}; \vec{v}; \vec{u} \wedge \vec{v})$ أساس مباشر.

$$\left[\widehat{AOB} \right] \quad \text{حيث } \theta \text{ قياس الزاوية} \quad \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$$

أمثلة * نعتبر $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ معلم متعامد ممنظم مباشراً

$$\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{j} \wedge \vec{j} = \vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0}$$

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k} \quad \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i} \quad \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k} \quad \vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i} \quad \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$$

* إذا كان \vec{u} و \vec{v} متوجهتين واحديتين و متعامدتين فان $(\vec{u}; \vec{v}; \vec{u} \wedge \vec{v})$ أساس مباشر.


$$\|\vec{u}\| = 5 \quad \|\vec{v}\| = 2 \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = -5 \quad (\vec{u}; \vec{v}) = \theta \quad \theta \in [0; \pi] \quad \text{حسب } \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \text{ علماً أن } \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$$

2- خصائص

أ- خاصية

إذا كانت A و B و C ثلاًث نقط غير مستقيمية من الفضاء فإن المتجهة $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ منتظمة على المستوى (ABC).

لتكن A و B و C ثلاًث نقط غير مستقيمية من الفضاء θ قياس الزاوية على $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ المسقط العمودي لـ C



$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = AB \cdot AC \cdot \sin \theta \quad HC = AC \sin \theta$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = AB \times HC$$

خاصية

مساحة المثلث ABC هو نصف $\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$

نسمحة

مساحة متوازي الأضلاع ABDC هي $\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$

د- خاصية

لتكن \vec{u} و \vec{v} متوجهتين من الفضاء يكون $\vec{u} \wedge \vec{v}$ منعدماً أداًء فقط كان \vec{u} و \vec{v} مستقيمتين

البرهان * \Rightarrow (بديهي - التعريف -)

$\Leftarrow *$

هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

$$\begin{aligned}
 \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} &\Leftrightarrow \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = 0 \\
 &\Rightarrow \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta = 0 \\
 &\Leftrightarrow \|\vec{u}\| = 0 \quad \vee \quad \|\vec{v}\| = 0 \quad \vee \quad \sin \theta = 0 \\
 &\Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0} \quad \vee \quad \vec{v} = \vec{0} \quad \vee \quad \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont liés}
 \end{aligned}$$

ملاحظة
ج- الحداء المتجهي والعمليات (نقيل)

$$\begin{aligned}
 \forall (\vec{u}; \vec{v}; \vec{w}) \in V_3^3 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad &(\vec{u} + \vec{v}) \wedge \vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{w} + \vec{v} \wedge \vec{w} \\
 &(\alpha \vec{u}) \wedge \vec{v} = \alpha (\vec{u} \wedge \vec{v}) \\
 &\vec{u} \wedge \vec{v} = -(\vec{v} \wedge \vec{u}) \\
 &\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0} \wedge \vec{u} = \vec{u} \wedge \vec{0} = \vec{0}
 \end{aligned}$$

تمرين

$(o; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ معلم متعامد ممنظم مباشر .

$$(2\vec{i} - \vec{j}) \wedge (3\vec{i} + 4\vec{j}) \quad (\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}) \wedge \vec{k} \quad (\vec{i} + 2\vec{k}) \wedge \vec{j} \quad \vec{i} \wedge 3\vec{j} \quad \text{أحسب}$$

تمرين

لتكن $\vec{a} \wedge \vec{c} = \vec{b} \wedge \vec{d}$; $\vec{a} \wedge \vec{b} = \vec{c} \wedge \vec{d}$

بين إن $\vec{b} - \vec{c}$ و $\vec{a} - \vec{d}$ مسنقيميتان

3- الصيغة التحليلية للحداء المتجهي في م.م.م مباشر.

$(o; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ معلم متعامد ممنظم مباشر

$$\begin{aligned}
 \vec{u}(x; y; z) \quad \vec{v}(x'; y'; z') \\
 \vec{u} \wedge \vec{v} = (\vec{x}\vec{i} + \vec{y}\vec{j} + \vec{z}\vec{k}) \wedge (\vec{x}'\vec{i} + \vec{y}'\vec{j} + \vec{z}'\vec{k}) \\
 = (yz' - zy')\vec{i} + (zx' - xz')\vec{j} + (xy' - yx')\vec{k}
 \end{aligned}$$

خاصة


الفضاء E منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ و $\vec{u}(x; y; z)$ و $\vec{v}(x'; y'; z')$ متجهتان

من V_3

إحداثيات الجداء المتجهي $\vec{u} \wedge \vec{v}$ بالنسبة للأساس $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ هو $(X; Y; Z)$ حيث

$$X = yz' - zy' \quad Y = zx' - xz' \quad Z = xy' - yx'$$

ملاحظة يمكن استعمال الوضعية التالية



$$C(1; 2; 1) \quad B(0; -3; 2) \quad A(1; 2; 1) \quad \vec{u}(1; 2; 0) \quad \vec{v}(-2; -1; 1) \quad \text{نعتبر}$$

أحسب مساحة المثلث (ABC)

حدد $\vec{u} \wedge \vec{v}$

مثال

III - تطبيقات الحداء المتجهي

لتكن C_1 و C_2 و C_3 ثلاط نقط غير مستقيمية من فضاء منسوب الى معلم متعمد ممنظم مباشر

$$M \in (ABC) \Leftrightarrow (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM} = 0$$

حدد معادلة المستوى (ABC)

مثال نعتبر $A(1;2;3)$ و $B(1;-1;1)$ و $C(2;1;2)$

2- تقاطع مستوى

نعتبر في فضاء منسوب الى معلم متعمد ممنظم مباشر

$$(P) : ax+by+cz+d=0$$

$$(P') : a'x+b'y+c'z+d'=0$$

لدينا $\vec{n}(a;b;c)$ منظممية لـ (P) و $\vec{n}'(a';b';c')$ منظممية لـ (P')

* اذا كان (P) و (P') متتقاطعين فان المستقيم (D) تقاطع (P) و (P') موجه بـ $\vec{n} \wedge \vec{n}'$

* اذا كان $\vec{n} \wedge \vec{n}' \neq 0$ فان (P) و (P') متتقاطعان وفق مستقيم موجه بـ $\vec{n} \wedge \vec{n}'$

تمرين

حدد تقاطع $4x-4y+2z-5=0$ و $x+2y-2z+3=0$

3- مسافة نقطة عن مستقيم

في الفضاء (D) مستقيم مار من A و موجه بـ \vec{u} ، M نقطة من الفضاء و H مسقطها العمودي على (D)

$$\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u} = (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HM}) \wedge \vec{u} = \overrightarrow{HM} \wedge \vec{u} \quad \text{Avec } \overrightarrow{AH} \text{ et } \vec{u} \text{ liés}$$

$$\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\| = \|\overrightarrow{HM} \wedge \vec{u}\| = HM \cdot \|\vec{u}\| \sin \frac{\pi}{2} = HM \cdot \|\vec{u}\|$$

$$HM = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

خاصية

في الفضاء (D) مستقيم مار من A و موجه بـ \vec{u} ، M نقطة من الفضاء.

$$d(M; (D)) = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} \quad \text{مسافة النقطة } M \text{ عن المستقيم } (D) \text{ هي}$$

تمرين

$$d(A; (D)) = ? \quad (D) : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad A(3;2;-1)$$

تمرين

في فضاء منسوب إلى معلم متعمد ممنظم مباشر نعتبر $(A(1;2;1), B(-2;1;3), C(1;2;3))$ المستقيم الذي

$$\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0 \\ 2x + 3y - z - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{معادلته}$$

1- حدد $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}$ ثم حدد معادلة ديكارتية للمستوى (OAB)

2- حدد $d(A; (D))$

3- أعط معادلة ديكارتية للفلكة (S) التي مركزها A و مماسة للمستقيم (D)