



## I. Dérivabilité d'une fonction en un point $x_0$ – dérivabilité à droite et à gauche en un point $x_0$ :

### A. Dérivabilité :

#### a. Définitions :

Soit une fonction  $f$  tel que son domaine de définition contient un intervalle ouvert  $I$  et  $x_0 \in I$ .

•  $f$  est dérivable au point  $x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell \in \mathbb{R} \cdot \left( \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \ell \in \mathbb{R} \right) \ell = f'(x_0)$  s'appelle le nombre dérivé de  $f$  en  $x_0$ .

•  $f$  est dérivable à droite de  $x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell_d \in \mathbb{R} \cdot \left( \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \ell_d \in \mathbb{R} \right) \ell_d = f'_d(x_0)$  s'appelle le nombre dérivé à gauche de  $f$  en  $x_0$ .

•  $f$  est dérivable à gauche de  $x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell_g \in \mathbb{R} \cdot \left( \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \ell_g \in \mathbb{R} \right) \ell_g = f'_g(x_0)$  s'appelle le nombre dérivé à gauche de  $f$  en  $x_0$ .

#### b. Propriété :

Soit une fonction  $f$ .

$f$  est dérivable au point  $x_0 \Leftrightarrow f$  est dérivable à droite et à gauche et  $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$ .

### B. interprétation géométrique des nombres dérivées $f'(x_0)$ et $f'_d(x_0)$ et $f'_g(x_0)$

#### a. Interprétation géométrique du nombre dérivée $f'(x_0)$ :

•  $f$  est une fonction dérivable au point  $x_0$ .

•  $(C_f)$  sa courbe représentative dans un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

❖ Le nombre dérivé  $f'(x_0)$  est le coefficient directeur de la droite tangente  $(T)$  à la courbe  $(C_f)$  de  $f$  au point  $A(x_0, f(x_0))$  ( le point  $x_0$  ).

❖ Equation cartésienne de la tangente  $(T)$  à la courbe  $(C_f)$  de  $f$  au point  $A(x_0, f(x_0))$  est  $(T): y = (x - x_0)f'(x_0) + f(x_0)$ .

❖ Si  $f'(x) = 0$  alors la tangente est parallèle à l'axe des abscisses .

#### b. Exemple :

1. Trouver équation de la tangente  $(T)$  à la courbe  $(C_f)$  de  $f$  au point  $x_0 = 1$  avec  $f(x) = 2x^2$ .

L'équation est  $(T): y = (x - 1)f'(1) + f(1)$  ou  $(T): y = (x - 1) \times 4 + 2$ .




D'où le coefficient directeur est  $m = 4$  et vecteur directeur est :  $\vec{u}(1,4) = 1\vec{i} + 4\vec{j}$

A partir du point  $A(1, f(1))$  avec  $f(1) = 2$

- On construit le point  $B$  tel que  $\overrightarrow{AB} = \vec{1i}$  et on construit le point  $C$  tel que :  $\overrightarrow{BC} = 4\vec{j}$ .
- D'où la droite  $(AC)$  est la tangente  $(T)$  à  $(C_f)$  au point  $A$ .
- Pour tracer la tangente il suffit de tracer un segment dans les extrémités on met des flèches son milieu est  $A$ .

c. Interprétation géométrique des nombres dérivées  $f_d'(x_0)$  et  $f_g'(x_0)$  :




- Si  $f$  est dérivable à droite de  $x_0$  on a une demi-tangente à droite de  $x_0$  de coefficient directeur  $f_d'(x_0)$ .
- équation du demi tangente à droite de  $-x_0$  est  $(T_d) : y = (x - x_0)f_d'(x_0) + f(x_0)$  avec  $x \geq x_0$ .
- Si  $f$  est dérivable à gauche de  $x_0$  on a une demi-tangente à droite de  $x_0$  de coefficient directeur  $f_g'(x_0)$ .
- équation du demi tangente à gauche de  $-x_0$  est  $(T_g) : y = (x - x_0)f_g'(x_0) + f(x_0)$  avec  $x \leq x_0$ .
- Si  $f_d'(x_0) \neq f_g'(x_0)$  donc  $f$  n'est pas dérivable en  $x_0$  et le point  $A(x_0, f(x_0))$  est appelé point anguleux.

d. Exemple :


soit  $\begin{cases} f(x) = (x+3)^3 + 2 & ; x \geq -2 \\ f(x) = -(x+3)^2 + 4 & ; x < -2 \end{cases}$  on a  $f_d'(-2) = 3$  et  $f_g'(-2) = -2$

- équation du demi tangente à droite de  $-2$  est  $(T_d) : y = (x+2)f_d'(-2) + f(-2)$  avec  $x \geq -2$ .
- équation du demi tangente à gauche de  $-2$  est  $(T_g) : y = (x+2)f_g'(-2) + f(-2)$  avec  $x \leq -2$ .

Demi tangente à droite




Demi tangente à gauche



Demi tangente en  $-2$  le point

$A(-2, 3)$

est un point anguleux






e. Remarque :

- si  $f$  n'est pas dérivable à droite ( c.à.d.  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$  ) dans ce cas on a demi tangente à droite de  $x_0$  parallèle à l'axe des ordonnées
- si  $f$  n'est pas dérivable à gauche ( c.à.d.  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty$  ) dans ce cas on a demi tangente à gauche de  $x_0$  parallèle à l'axe des ordonnées .

f. Exemple : exemple  $f(x) = \sqrt{(x+1)(x+2)}$  .

❖ à droite de  $x_0 = 1$  on a :  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \infty$ . donc  $(C_f)$  admet demi tangente verticale ( parallèle à l'axe des ordonnées ) à droite du point  $M(1, f(1))$



à gauche de  $x_0 = -1$  on a :  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = f(-1)$  et  $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \infty$ . donc  $(C_f)$  admet demi tangente verticale ( parallèle à l'axe des ordonnées ) à gauche du point  $M(-1, f(-1))$

g. Approximation affine d'une fonction dérivable en un point .

**II. Dérivabilité sur un intervalle – fonction dérivée première – dérivée seconde – dérivée  $n^{\text{ème}}$  d'une fonction :**

**A. Dérivabilité sur un intervalle :**

a. Définition :

- $f$  est une fonction dérivable sur  $I = ]a; b[$  si et seulement si  $f$  est dérivable en tout point  $x_0$  de  $I$  .
- $f$  est une fonction dérivable sur  $[a; b[$  si et seulement si  $f$  est dérivable sur  $I = ]a; b[$  et  $f$  est dérivable à droite du point  $a$  .
- $f$  est dérivable sur  $]a, b]$   $\Leftrightarrow$   $f$  est dérivable sur  $]a, b[$  et  $f$  est dérivable à gauche de  $b$
- $f$  est dérivable sur  $[a, b]$   $\Leftrightarrow$   $f$  est dérivable sur  $]a, b[$  et  $f$  est dérivable à droite de  $a$  et à gauche de  $b$  .

**B. La fonction dérivée première d'une fonction – la fonction dérivée seconde – dérivée  $n^{\text{ème}}$  d'une fonction:**

a. Définition :

$f$  est une fonction dérivable sur un intervalle  $I$  .

- La fonction  $g$  qui relie chaque élément  $x$  de  $I$  par le nombre  $f'(x)$  s'appelle la fonction dérivée de  $f$  et on note :  $g = f'$  . Ou encore  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$   $x \rightarrow g(x) = f'(x)$   $g$  s'appelle la fonction dérivée de  $f$  on note :  $g = f'$  .
- La fonction dérivée de  $f'$  sur  $I$  s'appelle la fonction dérivée seconde ( dérivée d'ordre 2 ) on note  $f''$  ou  $f^{(2)}$
- En général : la dérivée d'ordre  $n$  de  $f$  est la fonction dérivée de  $f^{(n-1)}(x)$  ( la dérivée de la fonction dérivée d'ordre  $n-1$  ) et on note  $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$  .



### III. Les opérations sur les fonctions dérivables :

#### a. Propriété :

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions dérivables sur  $I$ . on a :

- La fonction  $f + g$  est dérivable sur  $I$  et  $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ .
- La fonction  $\alpha f$  est dérivable sur  $I$  et  $(\alpha f)'(x) = \alpha f'(x)$  avec  $\alpha \in \mathbb{R}$
- La fonction  $f \times g$  est dérivable sur  $I$  et  $(f \times g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ .
- La fonction  $\frac{1}{g}$  est dérivable sur  $I \setminus \{x \in I, g(x) \neq 0\}$  et  $\left(\frac{1}{g}\right)'(x) = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$ .
- La fonction  $\frac{f}{g}$  est dérivable sur  $I \setminus \{x \in I, g(x) \neq 0\}$  et  $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$ .

### IV. Dérivabilité des fonctions : polynomiales – rationnelles - $f^n(x)$ - fonctions trigonométriques :

#### a. Propriété :

- Toute fonction polynomiale est dérivable sur son ensemble de définition  $D_f = \mathbb{R}$  et  $(ax^n)' = nax^{n-1}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ .
- Toute fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définition  $D_f$ .
- $f$  est une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .
  - ✓ La fonction  $f^n$  avec  $n \in \mathbb{N}^*$  est dérivable sur  $I$  et on a :  $(f^n)'(x) = nf^{n-1}(x)f'(x)$ .
  - ✓ Si pour tout  $x$  de  $I$  ;  $f(x) \neq 0$  on a la fonction  $f^p(x)$  avec  $p \in \mathbb{Z}^*$  est dérivable sur  $I$  et  $(f^p)'(x) = pf^{p-1}(x)f'(x)$ .
- La fonction  $f(x) = \cos(x)$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  avec  $f'(x) = (\cos(x))' = -\sin(x)$ .
- La fonction  $f(x) = \sin(x)$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  avec  $f'(x) = (\sin(x))' = \cos(x)$ .
- La fonction  $f(x) = \tan(x)$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$  avec  $f'(x) = (\tan(x))' = 1 + \tan^2(x)$  ou encore  $f'(x) = (\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2 x}$ .

**b. Exemple :** Calculer :  $g'(x)$  pour  $g(x) = (-2x^4 + 5x^2 + x - 3)^7$ .

$$\text{On a : } g'(x) = [(-2x^4 + x - 3)^7]'.$$

$$= 7(-2x^4 + x - 3)^6 (-2x^4 + x - 3)'$$

$$= 7(-2x^4 + x - 3)^6 (-8x^3 + 1)$$

Niveau: 2 P.C. + 2 S.V.- COURS



dérivation – étude des fonctions page



## VII. Dérivabilité de la composée de deux fonctions :

### a. Théorème :

$f$  dérivable en  $x_0$  et  $g$  est dérivable en  $f(x_0)$  alors la fonction  $g \circ f$  est dérivable en  $x_0$  et on a :

$$(g \circ f)'(x_0) = f'(x_0) \times g'(f(x_0)).$$

### b. Application :

- $\left(\sqrt{f(x)}\right)' = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}} ; x \in D_{f'} \text{ et } f(x) > 0.$
- $(\sin(ax+b))' = a \times \cos(ax+b) ; \text{ sur } \mathbb{R}.$
- $(\cos(ax+b))' = -a \times \sin(ax+b) ; \text{ sur } \mathbb{R}.$
- $(\tan(ax+b))' = a \times [1 + \tan^2(ax+b)] = a \times \frac{1}{\cos^2(ax+b)} \text{ avec } ax+b \neq \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}.$

## V. La fonction dérivée de la fonction réciproque :

### a. Théorème :

Soit  $f$  une fonction continue et strictement monotone sur  $I$  et  $f(I) = J$ ,  $f^{-1}$  est la fonction réciproque de la fonction  $(x_0 \in I) ; x_0 \mapsto f(x_0) = y_0 ; (y_0 \in J)$

$f$  est dérivable en  $x_0$   
 $f(x_0) \neq 0$

alors la fonction  $f^{-1}$  est dérivable en  $y_0 = f(x_0)$  et  $(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$

ou encore  $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ .

### b. Applications :

$n \in \mathbb{N}^*$  et  $r \in \mathbb{Q}^*$  et  $f$  est une fonction strictement positive et dérivable sur  $I$

$$g'(x) = \left(\sqrt[n]{x}\right)' = \left((x)^{\frac{1}{n}}\right)' = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1} ; n \in \mathbb{N}^*$$

$$\left(\sqrt[n]{f(x)}\right)' = \left((f(x))^{\frac{1}{n}}\right)' = \frac{1}{n} \times f'(x) \times (f(x))^{\frac{1}{n}-1}$$

$$g'(x) = (x^r)' = rx^{r-1} ; r \in \mathbb{Q}^*$$

$$([f(x)]^r)' = r \times f'(x) \times [f(x)]^{r-1} ; r \in \mathbb{Q}^*$$

### c. Exemple :

1. Calculer la fonction dérivée  $f'$  de  $f$ .

$$f(x) = \sqrt[5]{x} \text{ et } f(x) = \sqrt[5]{x^2+1} \text{ et } f(x) = \sqrt[5]{(x^2+1)^7}$$

On a :



$$\bullet \quad f'(x) = \left[ \sqrt[5]{x} \right]' = \left[ x^{\frac{1}{5}} \right]' = \frac{1}{5} x^{\frac{1}{5}-1} = \frac{1}{5} x^{\frac{-4}{5}} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{\sqrt[5]{x^4}} .$$

$$\bullet \quad f'(x) = \left[ \sqrt[5]{(x^2+1)} \right]' = \left[ (x^2+1)^{\frac{1}{5}} \right]' = \frac{1}{5} (x^2+1)' (x^2+1)^{\frac{1}{5}-1} = \frac{14}{7} x (x^2+1)^{\frac{4}{5}} = \frac{14}{7} x \sqrt[5]{(x^2+1)^4} .$$

$$\bullet \quad f'(x) = \left[ \sqrt[5]{(x^2+1)^7} \right]' = \left[ (x^2+1)^{\frac{7}{5}} \right]' = \frac{7}{5} (x^2+1)' (x^2+1)^{\frac{7}{5}-1} = \frac{14}{7} x (x^2+1)^{\frac{2}{5}} = \frac{14}{7} x \sqrt[5]{(x^2+1)^2}$$

## VII. Tableau des fonctions dérivées des fonctions usuelles :

La fonction $f$	$D_f$ Domaine de définition de $f$	La fonction dérivée $f'$	$D_{f'}$ Domaine de définition de $f'$
$f(x) = a$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$D_{f'} = \mathbb{R}$
$f(x) = x$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = 1$	$D_{f'} = \mathbb{R}$
$f(x) = x^n$ $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$D_{f'} = \mathbb{R}$
$n \in \mathbb{Z}^* \setminus \{1\} : f(x) = x^n$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$D_{f'} = \mathbb{R}^*$
$f(x) = \sqrt{x}$	$D_f = [0, +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$D_{f'} = ]0, +\infty[$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$D_f = \mathbb{R}^*$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$D_{f'} = \mathbb{R}^*$
$f(x) = \sin x$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = \cos x$	$D_{f'} = \mathbb{R}$
$f(x) = \cos x$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = -\sin x$	$D_{f'} = \mathbb{R}$
$f(x) = \tan x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi ; k \in \mathbb{Z}$	$f'(x) = 1 + \tan^2 x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$f(x) = \sqrt{g(x)}$	$x \in D_g / g(x) \geq 0$	$f'(x) = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$	$x \in D_g / g(x) > 0$
$f(x) = a$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$D_{f'} = \mathbb{R}$
$f(x) = x$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = 1$	$D_{f'} = \mathbb{R}$
$n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\} : f(x) = x^n$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$D_{f'} = \mathbb{R}$
$n \in \mathbb{Z}^* \setminus \{1\} : f(x) = x^n$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$D_{f'} = \mathbb{R}^*$

## VII. Applications de la fonction dérivée première :

Remarque :

- dans le reste de ce chapitre  $f$  est une fonction numérique de la variable réelle  $x$ .
- $(C_f)$  est sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .



## A. La monotonie d'une fonction et le signe de sa fonction dérivée :

### a. Propriété :

$f$  est une fonction dérivée sur un intervalle  $I$ .

- Si la fonction dérivée  $f'$  est strictement positive sur  $I$  alors la fonction  $f$  est strictement croissante sur  $I$ .  
( même si  $f'$  s'annule en un points fini de  $I$  ne change pas la monotonie de  $f$  )
- Si la fonction dérivée  $f'$  est strictement négative sur  $I$  alors la fonction  $f$  est strictement décroissante sur  $I$ .  
( même si  $f'$  s'annule en un points fini de  $I$  ne change pas la monotonie de  $f$  )
- Si la fonction  $f'$  est nulle sur  $I$  ( sur  $I$  tout entier ) alors  $f$  est constante .

### b. Exemple :

Etudier les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  avec  $f(x) = (2x+4)^2$ .

- On calcule :  $f'$ .

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[ (2x+4)^2 \right]' \\ &= 2(2x+4)'(2x+4) = 2 \times 2(2x+4) = 8x+16 \end{aligned}$$

- Signe de  $f'$  :

$$\text{On a } f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 8x+16 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x \geq -2$$

Donc :  $f'$  est positive sur  $[-2, +\infty[$  et négative sur  $]-\infty, -2]$ .

- Tableau de variation de  $f$  :

$x$	$-\infty$	$-2$	$+\infty$
$f'$	–	0	+
$f$	$+\infty$	$\searrow$	$+\infty$

$f(-2) = 0$

## B. Extremums d'une fonction dérivable :

### a. Propriété :

$f$  est une fonction dérivée sur un intervalle ouvert  $I$ ,  $a$  est un élément de  $I$ .

Si  $f$  est dérivable au point  $a$  et admet un extremum au point  $a$  alors  $f'(a) = 0$ .


Remarque : Si  $f'(a) = 0$  ne signifie pas que  $f(a)$  est un extremum de la fonction  $f$ .

### b. Exemple :

$f(x) = 2x^3$  on a  $f'(x) = 6x^2$  d'où  $f'(0) = 0$  mais  $f(0)$  n'est pas un extremum de la fonction  $f$ .

La fonction

$$f(x) = 2x^3$$





**c. Propriété :**

$f$  est une fonction dérivée sur un intervalle ouvert  $I$ ,  $a$  est un élément de  $I$ .

Si  $f'$  s'annule au point  $a$  et  $f'$  change de signe au voisinage de  $a$  alors  $f(a)$

est un extremum de la fonction  $f$

**VII. Applications de la fonction dérivée deuxième :**

**A. Position relative de la tangente et la courbe – la concavité :**

**a. Propriété et définition :**

$f$  est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle  $I$ .

$\forall x \in I : f''(x) > 0$  ( la fonction dérivée seconde ) alors :

• La courbe  $(C_f)$  de  $f$  est située au dessus des tangentes des points  $x$  tel que  $x \in I$ .

Dans ce cas on dit que la courbe  $(C_f)$  de  $f$  est convexe ( ou sa concavité est dans le sens des ordonnées positives . on note 

$\forall x \in I : f''(x) < 0$  ( la fonction dérivée seconde ) alors :

• La courbe  $(C_f)$  de  $f$  est située au dessous des tangentes des  $x \in I$ .

Dans ce cas on dit que la courbe  $(C_f)$  de  $f$  est concave ( ou sa concavité est dans le sens des ordonnées négatives . on note 

**b. Exemple :**

**Exemple 1 :**


La figure ci-contre représente la courbe d'une fonction  $f$ .

• Sur l'intervalle  $[1, +\infty[$  : la courbe  $(C_f)$  de  $f$  est convexe.

( ou sa concavité est dans le sens des ordonnées positives ).

• Sur l'intervalle  $]-\infty, 1[$  : la courbe  $(C_f)$  de  $f$  est concave.

( ou sa concavité est dans le sens des ordonnées négatives ).



**Exemple 2 :**

Le tableau ci-contre représente le signe de la fonction dérivée seconde de  $f$  et la concavité de la courbe  $(C_f)$  de  $f$

$x$	$-\infty$	$-5$	$-1$	$2$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+	-	0
Concavité de $(C_f)$					



## B. Points d'inflexions :

### a. Propriété et définition :

$f$  est une fonction dérivable deux fois sur un intervalle ouvert  $I$  et  $x_0 \in I$ .


Si la fonction dérivée seconde  $f''$  s'annule en  $x_0$  et  $f''$  change de signe au voisinage de  $x_0$  alors le point d'abscisse  $A(x_0, f(x_0))$  est un point d'inflexion au courbe  $(C_f)$  ; dans ce cas la tangente au point  $A(x_0, f(x_0))$  coupe (ou traverse) la courbe.

### b. Exemple :

#### Exemple 1 :

- Soit la fonction  $f$  définie par :  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ .
- $(C_f)$  est sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

#### Exemple 2 :



Le tableau suivant représente le signe de la fonction dérivée seconde de  $f$  et la concavité de la courbe  $(C_f)$  de  $f$

x	$-\infty$	-5	-1	2	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+	-	0
Concavité de $(C_f)$	↑	↓	↑	↑	↑

- Le point d'abscisse  $x_0 = -5$  est un point d'inflexion au courbe  $(C_f)$  de  $f$  car  $f''(-5) = 0$  et  $f''$  change de signe au voisinage de  $x_0 = -5$ .
- Le point d'abscisse  $x_1 = 2$  n'est pas un point d'inflexion au courbe  $(C_f)$  de  $f$  car  $f''$  change de signe au voisinage de  $x_1 = 2$ .

## VIII. Centre de symétrie – axe de symétrie de la courbe d'une fonction :


### A. Centre de symétrie de la courbe d'une fonction :

#### a. Propriété :

Soit  $(C_f)$  la courbe représentative d'une fonction définie sur  $D_f$  dans un plan  $(P)$  est rapporté à un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Le point  $I(a, b)$  est centre de symétrie au courbe  $(C_f)$   $\Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in D_f ; 2a - x \in D_f \\ \forall x \in D_f ; f(2a - x) + f(x) = 2b \end{cases}$

**b.** Exemple :




**B.** axe de symétrie de la courbe d'une fonction :

**a.** Propriété :

Soit  $(C_f)$  la courbe représentative d'une fonction définie sur  $D_f$  dans un plan  $(P)$  est rapporté à un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

La droite d'équation  $D : x = a$  est axe de symétrie au courbe  $(C_f)$   $\Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in D_f ; 2a - x \in D_f \\ \forall x \in D_f ; f(2a - x) = f(x) \end{cases}$

**b.** Exemple :



**IX.** Branches infinies d'une fonction :

**A.** Branches infinies :

Niveau: 2 P.C. + 2 S.V.- COURS



dérivation – étude des fonctions page



### a. Définition :

Soit  $(C_f)$  la courbe représentative d'une fonction définie sur  $D_f$  dans un plan  $(P)$  est rapporté à un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Si au moins une des coordonnées d'un point  $M$  de la courbe de  $(C_f)$  tend vers l'infinie on dit que la courbe  $(C_f)$  admet une branche infinie.

### B. Asymptote verticale :


#### a. Définition :

Soit  $(C_f)$  la courbe représentative d'une fonction définie sur  $D_f$  dans un plan  $(P)$  est rapporté à un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Si  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$  alors la droite d'équation  $x = a$  est une asymptote verticale à  $(C_f)$  (à droite de  $a$  ou à gauche de  $a$ ).

#### b. Exemple :

Exemple : asymptote verticale d'équation  $x = 1$ .



### C. Asymptote horizontale


#### a. Définition :

Soit  $(C_f)$  la courbe représentative d'une fonction définie sur  $D_f$  ( tel que  $([a, +\infty[ \subset D_f \text{ ou } ]-\infty, a[ \subset D_f)$  dans un plan  $(P)$  est rapporté à un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$  ( ou  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = c$  ) alors la droite d'équation  $y = b$  ( ou  $y = c$  ) est une asymptote horizontale à  $(C_f)$  au voisinage de  $+\infty$  ( ou  $-\infty$  ).

#### b. Exemple :

Asymptote horizontale d'équation  $y = 2$  au voisinage de  $\pm\infty$ .



### D. Asymptote oblique :

#### a. Définition :

• Soit  $(C_f)$  la courbe représentative d'une fonction définie sur  $D_f$  ( tel que


$([a, +\infty[ \subset D_f \text{ ou } ]-\infty, a[ \subset D_f)$  dans un plan  $(P)$  est rapporté à un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

•  $a \in \mathbb{R}^*$  ( $a \neq 0$  et  $a \neq \pm\infty$ ) et  $b \in \mathbb{R}$

Si  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - (ax + b) = 0$  alors la droite d'équation  $y = ax + b$  est une asymptote oblique à  $(C_f)$  au voisinage de  $\pm\infty$ .

#### b. Exemple :

Soit  $f(x) = x + 3 - \frac{(x+7)}{(x-1)}$ .



$(C_f)$  admet une asymptote oblique la droite d'équation  $y = x + 3$  voisinage de  $\pm\infty$

#### c. Propriété :

Si la droite d'équation  $y = ax + b$  est une asymptote oblique à  $(C_f)$  au voisinage de  $\pm\infty$ , donc pour déterminer  $a$  et  $b$  on calcule les limites suivantes :

- Pour déterminer  $a$  on calcule :  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$  ( c.à.d.  $a \neq 0$  et  $a \neq \pm\infty$  ), donc on a deux cas particulières .
- Pour déterminer  $a$  on calcule :  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$  ( c.à.d.  $b \neq \pm\infty$  ) . donc on a la troisième cas particulière .

#### • Les cas particulières


- 1<sup>ère</sup> cas particulière :  $a = \pm\infty$  on dit que  $(C_f)$  admet une branche parabolique de direction ( B.P.D ) l'axe des ordonnées .
- 2<sup>ème</sup> cas particulière :  $a = 0$  on dit que  $(C_f)$  admet une branche parabolique de direction ( B.P.D ) l'axe des abscisses .
- 3<sup>ème</sup> cas particulière :  $b = \pm\infty$  avec  $a \in \mathbb{R}^*$  , on dit que  $(C_f)$  admet une branche parabolique de direction ( B.P.D ) la droite d'équation  $y = ax$  .

les cas particuliers ( Remarque : B.P.D= branche parabolique de direction )

cas particulier 3 :  $a \in \mathbb{R}^*$  et  $b = \pm\infty$

$(C_f)$  admet une B.P.D la droite  $y = ax$  au voisinage de  $\pm\infty$


Exemple  $f(x) = x + \sqrt{x-3}$



cas particulier 2 :  $a = 0$

$(C_f)$  admet une B.P.D l'axe des abscisses


Exemple  $f(x) = \sqrt{x}$



cas particulier 1 :  $a = \pm\infty$

$(C_f)$  admet une B.P.D l'axe des ordonnées

Exemple  $f(x) = x^3$



**X.** Approximation affine d'une fonction dérivable en un point .( complément )

a. Définition :

$f$  est une fonction dérivable au point  $a$

- La fonction  $u$  tel que :  $u : x \rightarrow f(a) + (x-a)f'(a)$  ( ou encore  $(x-a=h)$ ;  $v : h \rightarrow f(a) + hf'(a)$  ) est appelée la fonction affine tangente à la fonction  $f$  au point  $a$ .
- Quand  $x$  est très proche de  $a$  le nombre  $f(a) + (x-a)f'(a)$  est une approximation affine de  $f(x)$  au voisinage de  $a$  on écrit :  $f(x) \approx f(a) + (x-a)f'(a)$  .
- Ou encore le nombre  $f(a) + hf'(a)$  est approximation affine de  $f(a+h)$  au voisinage de zéro on écrit  $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$  avec  $x-a=h$  .

**C.** Exemple :

❖ Exemple 1 :

1. Trouver une approximation affine du nombre  $f(1+h)$  avec  $f(x) = x^2$  et  $a = 1$ .

Correction :

$f$  est une fonction dérivable au point 1 avec  $f'(1) = 2$  approximation affine de  $f(1+h)$  est :

$$f(1+h) \approx hf'(1) + f(1) \approx 2h + 1.$$

$$\text{Conclusion : } f(1+h) = (1+h)^2 \approx 2h + 1.$$

Application du résultat :

$$\text{On prend } h = 0,001 \text{ d'où : } f(1,001) = f(1+0,001) \approx 2 \times 0,001 + 1 \text{ donc } f(1+0,001) \approx 1,002.$$

$$\text{On vérifie : } f(1,001) = (1,001)^2 = 1,002001 \text{ donc } 1,002 \approx 1,002001.$$



Technique de calcul :  $(1+h)^2$  avec  $h$  très proche de zéro on calcule  $2h+1$ .

❖ Exemple 2 :

1. Trouver une approximation affine du nombre  $\sqrt{9,002}$ .

Correction :

On pose  $f(x) = \sqrt{x}$  et  $a = 9$  et  $h = 0,002$  d'où  $\sqrt{9,002} = f(9+0,002)$ .

On calcule le nombre dérivé de  $f$  en 9 on a :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(9+h) - f(9)}{h} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{f(x) - f(9)}{x - 9} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\cancel{\sqrt{x}-3}}{(\cancel{\sqrt{x}-3})(\sqrt{x}+3)} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{\sqrt{x}+3} = \frac{1}{6} \in \mathbb{R}$$

D'où :  $f$  est dérivable au point 9 et le nombre dérivé en 9 est  $f'(9) = \frac{1}{6}$ .

On trouve une approximation affine du nombre  $\sqrt{9,002}$ .

On a :  $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$  d'où  $f(9+0,002) \approx f(9) + 0,002 \times f'(9)$ .

Donc :  $f(9+0,002) \approx \sqrt{9} + 0,002 \times \frac{1}{6}$  par suite  $f(9+0,002) \approx 3,000333333$ .

On remarque que  $\sqrt{9,002} \approx 3,000333333$  la calculatrice donne :  $\sqrt{9,002} \approx 3,000333315$  d'où la précision est  $3 \times 10^{-8}$ .

I. Remarque :

- Pour la fonction :  $f(x) = x^2$  et  $a = 1$  on a :  $f(1+h) = (1+h)^2 \approx 1+2h$ .
- Pour la fonction :  $f(x) = x^3$  et  $a = 1$  on a :  $f(1+h) = (1+h)^3 \approx 1+3h$ .
- Pour la fonction :  $f(x) = \sqrt{x}$  et  $a = 1$  on a :  $f(1+h) = \sqrt{1+h} \approx 1 + \frac{h}{2}$ .
- Pour la fonction :  $f(x) = \frac{1}{x}$  et  $a = 1$  on a :  $f(1+h) = \frac{1}{1+h} \approx 1-h$ .

XI. Résumer des branches infinies :


## Les branches infinies

### Asymptote horizontale

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a$$

$(C_f)$  admet une asymptote horizontale c'est la droite d'équation  $y = a$  au voisinage de  $\pm\infty$

Exemple : asymptote horizontale d'équation  $y = 2$  au voisinage de  $\pm\infty$



$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - (ax + b) = 0$$

### Asymptote oblique et les trois cas particuliers

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$$


$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = \pm\infty$$

$(C_f)$  admet une asymptote oblique la droite d'équation  $y = ax + b$  au voisinage de  $\pm\infty$

$$\text{Exemple } f(x) = x + 3 - \frac{(x+7)}{(x-1)}$$




Rq : position relative de  $(C_f)$  et  $(D)$  on étudie le signe de  $f(x) - (ax + b)$

### Asymptote verticale

$$\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$$

$(C_f)$  admet une asymptote verticale c'est la droite d'équation  $x = a$

Exemple : asymptote verticale d'équation  $x = 1$




$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$$

cas particulier 3 :  $a \in \mathbb{R}^*$  et  $b = \pm\infty$

$(C_f)$  admet une B.P.D la droite  $y = ax$  au voisinage de  $\pm\infty$


$$\text{Exemple } f(x) = x + \sqrt{x-3}$$



cas particulier 2 :  $a = 0$

$(C_f)$  admet une B.P.D l'axe des abscisses


$$\text{Exemple } f(x) = \sqrt{x}$$



cas particulier 1 :  $a = \pm\infty$

$(C_f)$  admet une B.P.D l'axe des ordonnées

$$\text{Exemple } f(x) = x^3$$



les cas particuliers ( Remarque : B.P.D= branche parabolique de direction )