



I. $z = [1, \alpha] = \cos \alpha + i \sin \alpha$ Approche sur l'ensemble des nombres complexes :

a. Activité :

1. On considère l'équation $x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 = 0$.

Cette équation n'a pas de solution dans \mathbb{R} . Qui impose au mathématicien d'utiliser le nombre i qui n'est pas réel mais c'est un nombre imaginaire tel que : $i^2 = (-i)^2 = -1$ par suite l'équation admet 2 solutions i et $-i$ mais dans un autre ensemble appelé ensemble des nombres complexes, noté \mathbb{C} tel que \mathbb{C} est muni des deux opérations l'addition notée $+$ et la multiplication notée \times et qui ont mêmes propriétés de l'addition et de la multiplication dans \mathbb{R} .

2. On considère l'équation : $(E) : x^2 - 2x + 2 = 0$.

- Vérifie que l'équation (E) s'écrit de la forme suivante : $(E) : (x-1)^2 + 1 = 0$.
- Vérifie que $1+i$ et $1-i$ sont solutions de (E) .

b. Vocabulaire et notation :

- Les nombres $1+i$ et $1-i$ sont appelés nombres complexes.
 - En général : un nombre complexe est écrit de la forme $z = a + bi$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$.
 - Le nombre complexe : $z' = a - bi$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ est appelé le nombre complexe conjugué de z noté \bar{z} d'où $\bar{z} = a - bi$
- Exemple : $z = 2 + 5i$ et $z' = -7 - 3i \Rightarrow \bar{z} = \overline{2 + 5i} = 2 - 5i$ et $\bar{z}' = \overline{-7 - 3i} = -7 + 3i$
- L'écriture $z = a + bi$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ est appelée l'écriture (ou la forme) algébrique de z .
 - Le réel a est appelé la partie réelle et on note $\text{Re}(z) = a$. Exemple : $\text{Re}(2 + 3i) = 2$.
 - Le réel b est appelé la partie imaginaire et on note $\text{Im}(z) = b$. Exemple : $\text{Im}(2 + 3i) = 3$.

c. Définition :

- Un nombre complexe est un nombre tel que son écriture est de la forme $z = a + bi$ avec a et b de \mathbb{R} , i est un nombre imaginaire avec $i^2 = -1$.
- Les nombres complexes constituent un ensemble est appelé ensemble des nombres complexes, on note \mathbb{C} .
- L'ensemble \mathbb{C} est muni des deux opérations l'addition notée $+$ et la multiplication notée \times et qui ont mêmes propriétés de l'addition et de la multiplication dans \mathbb{R} (commutativité - associativité).
- $a + bi = a' + b'i \Leftrightarrow (a = a' \text{ et } b = b')$.

II. Opérations dans l'ensemble \mathbb{C} :

a. Opérations :

$z = x + yi$ et $z' = x' + y'i$ de \mathbb{C} avec x et y et x' et y' de \mathbb{R} . on a :

❖ **Addition dans \mathbb{C} :** $z + z' = x + yi + x' + y'i = (x + x') + (y + y')i$. x, y, x' et $y' \in \mathbb{R}$

❖ **Multiplication dans \mathbb{C} :** $z \times z' = (x + yi) \times (x' + y'i) = (xx' - yy') + (xy' + yx')i$.

cas particulier $k \in \mathbb{R}$: $k \cdot z = k \cdot (x + yi) = kx + kyi$.



❖ **L'inverse de $z = a + bi \neq 0 ((a, b) \neq (0, 0))$** : $\frac{1}{z'} = \frac{1}{x'+y'i} = \frac{1 \times \bar{z}'}{z' \bar{z}'} = \frac{1 \times (x'-y'i)}{(x'+y'i)(x'-y'i)} = \frac{x'}{x'^2+y'^2} - \frac{y'}{x'^2+y'^2} i$

❖ **Le quotient de z par z'** : $\frac{z}{z'} = \frac{x+yi}{x'+y'i} = \frac{z \times \bar{z}'}{z' \times \bar{z}'} = \frac{1}{z' \times \bar{z}'} \times z \times \bar{z}'$
 $= \frac{1}{x'^2+y'^2} \times (x+yi)(x'-y'i) = \frac{xx'+yy'}{x'^2+y'^2} + \frac{yx'-xy'}{x'^2+y'^2} i$

b. Applications :

❖ $z+z' = 1+5i + 2-3i = 3+2i$.

❖ $z \times z' = (1+5i) \times (2-3i)$

$$= 1 \times 2 + 5i \times (-3i) + (1 \times (-3) + 5 \times 2)i$$

$$= 17 + 7i$$

❖ $-3 \times z = -3 \times (1+5i) = -3 - 15i$ et $(2+3i) \times \overline{(2+3i)} = 2^2 + 3^2 = 13$.

❖ $\frac{1}{z'} = \frac{1}{2-3i}$

$$= \frac{2+3i}{(2-3i) \times (2+3i)}$$

$$= \frac{2}{2^2+3^2} + \frac{3}{2^2+3^2} i$$

$$= \frac{2}{13} + \frac{3}{13} i$$

❖ $\frac{z}{z'} = \frac{1+5i}{2-3i}$

$$= \frac{(1+5i)(2+3i)}{(2-3i) \times (2+3i)}$$

$$= \frac{1 \times 2 + 5i \times 3i}{2^2+3^2} + \frac{5i \times 2 + 1 \times 3i}{2^2+3^2}$$

$$= \frac{-13}{13} + \frac{13}{13} i$$

$$= -1 + i$$

❖ $z_1 = 2+5i - (-4+2i) = 2+4+(5-2)i = 6+3i$

❖ $z_2 = 2+5i - 3i(-4+2i) = 2+5i+12i+6 = 8+17i$.

❖ $z_3 = (2+5i)(-4+2i) = 2 \times (-4) + 5i \times 2i + (2 \times 2 + 5 \times (-4))i = -18 - 16i$.

❖ $z_4 = \frac{1}{1+3i} = \frac{1 \times (1-3i)}{(1+3i) \times (1-3i)} = \frac{1-3i}{1^2+3^2} = \frac{1}{10} - \frac{3}{10} i$.



$$\diamond z_5 = \frac{2+3i}{5-i} = \frac{(2+3i)(5+i)}{(5-i)(5+i)} = \frac{10-3+(2+15)i}{5^2+1^2} = \frac{7+17i}{26} = \frac{7}{26} + \frac{17}{26}i$$

c. Remarque :

$$\begin{aligned} \diamond (a+bi)^2 &= a^2 + 2abi + (bi)^2 = a^2 + 2abi - b^2. \\ \diamond (a-bi)^2 &= a^2 - 2abi + (-bi)^2 = a^2 - 2abi - b^2. \\ \diamond (a+bi)(a-bi) &= a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2. \end{aligned}$$

III. Présentation géométrique d'un nombre complexe :

a. Activité :

Le plan (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$.

- A tout nombre complexe $z = x + yi$ de \mathbb{C} on lui associe le point $M(x, y)$ de (P) càd :

$f : \mathbb{C} \rightarrow (P)$

$z = x + yi \mapsto f(z) = f(x + yi) = M(x, y)$ (ou bien $\overrightarrow{OM} = \vec{xu} + \vec{yv}$)

❖ Dans ce cas :

- Le plan (P) est appelé le plan complexe.
- le point $M(x, y)$ est l'image du complexe $z = x + yi$.
- on note M_z ou $M_{(x+y)i}$ on lit le point M d'affixe z . de même pour le vecteur \overrightarrow{OM}_z .
- on note aussi z_M on lit z est l'affixe de M . de même pour $z_{\overrightarrow{OM}}$.
- Si $z = a \in \mathbb{R}$ alors M est sur l'axe des abscisses sera nommé axe réel.
- Si $z = bi$, ($b \in \mathbb{R}$) alors M est sur l'axe des ordonnées sera nommé axe imaginaire.


b. Propriétés des affixes :

$A(z_A)$; $B(z_B)$; $C(z_C)$ et $I(z_I)$ sont trois points du plan complexe (P) .

- ❖ Le vecteur \overrightarrow{AB} a pour affixe $z_B - z_A$.
- ❖ Le vecteur $k\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $k(z_B - z_A)$.
- ❖ Le point I milieu de $[A, B]$ a pour affixe $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

❖ $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$; ($k \in \mathbb{R}$) càd $z_C - z_A = k(z_B - z_A)$ ou bien $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = k \in \mathbb{R}$ d'où les points A et B

et C sont alignés (avec $z_B - z_A \neq 0$)



c. Application :



On considère $C(z_C = 5 + xi)$; $B(z_B = -2 + i)$; $A(z_A = 2 + i)$ et $I(z_I)$ quatre points du plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Déterminer $z_{\overrightarrow{AB}}$ l'affixe du vecteur \overrightarrow{AB} .
2. Déterminer z_I affixe du point I milieu du segment $[AB]$.
3. Déterminer k tel que A et B et C sont alignés.

Correction :


1. ..
2. ..
3. ..

IV. Conjugué d'un nombre complexe $z = x + yi$:

a. Définition :

Le nombre complexe $z' = x - yi$ est appelé **le conjugué du nombre complexe $z = x + yi$** on note $z' = \bar{z} = x - yi$.

b. Interprétation géométrique :



c. Applications :

- ❖ $z = 1 + 5i$ on a : $\bar{z} = \overline{1 + 5i} = 1 - 5i$.
- ❖ $z = -1 - 3i$ on a : $\bar{z} = \overline{-1 - 3i} = -1 + 3i$.
- ❖ $z = 1$ on a : $\bar{z} = \overline{1} = 1$.
- ❖ $z = 2i$ on a : $\bar{z} = \overline{2i} = -2i$.
- ❖ $z = -6i$ on a : $\bar{z} = \overline{-6i} = 6i$.

d. Propriétés :

Soient : $z = x + yi$ et $z' = x' + y'i$ de complexes de \mathbb{C} avec x, y, x' et y' de \mathbb{R} on a :

- $z + \bar{z} = 2x = 2\operatorname{Re}(z)$ et $z - \bar{z} = 2yi = 2\operatorname{Im}(z)i$.
- $z = z$ et $z \times \bar{z} = x^2 + y^2$ et $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$ et $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$

• ($z' \neq 0$) ; $\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \frac{1}{\overline{z'}}$; $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$ et $\overline{z^p} = (\overline{z})^p$; $p \in \mathbb{Z}$ (avec $z \neq 0$ si $p \in \mathbb{Z}^-$).

e. Application :

- ❖ $\overline{\overline{2+3i}} = 2+3i$.
- ❖ $\overline{(2+3i)+1-2i} = \overline{2+3i} + \overline{1-2i} = 2-3i + 1+2i = 3-i$.
- ❖ $\overline{(2+3i) \times (1-5i)} = \overline{2+3i} \times \overline{1-5i} = (2-3i)(1+5i)$.
- ❖ $\overline{\left(\frac{1}{1-5i}\right)} = \frac{1}{\overline{1-5i}} \frac{1}{1+5i}$.
- ❖ $\overline{\left(\frac{2+3i}{1-5i}\right)} = \frac{\overline{2+3i}}{\overline{1-5i}} = \frac{2-3i}{1+5i}$.
- ❖ $\overline{(2+3i)^n} = (2-3i)^n$.

f. Remarque :

- ❖ $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \overline{z} = z$ (c.à.d. z est un réel pur) .
- ❖ $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \overline{z} = -z$ (c.à.d. z est un imaginaire pur) .

V. Module d'un nombre complexe $z = x + yi$:

a. Activité :

$M_{(z=x+yi)}$ est un point du plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Calculer : $z \times \overline{z}$.
2. Donner les coordonnées du vecteur \overrightarrow{OM} dans le repère $(0, \vec{i}, \vec{j})$.
3. Calculer : $\|\overrightarrow{OM}\|$, que peut-on déduire ?

b. Définition :

Soit $z = x + yi$ de \mathbb{C} avec x et y de \mathbb{R} .

Le nombre réel positif $\sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$ s'appelle le module de z sera noté $|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$.

c. Application :

- ❖ $|5| = |5 + 0i| = \sqrt{5^2 + 0^2} = 5$ et $|-7| = |-7 + 0i| = \sqrt{(-7)^2 + 0^2} = 7$.
- ❖ $|2i| = |0 + 2i| = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2$ et $|-2i| = |0 - 2i| = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = 2$.
- ❖ $|1+i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ et $|1+i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = \sqrt{4} = 2$

d. Interprétation géométrique du module de z :

On a : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \|\overrightarrow{OM}\|$ avec M d'affixe $z = x + yi$. D'où : $\|\overrightarrow{AB}\| = AB = |z_B - z_A|$.



e. Remarque :

Soient $z_A = x_A + y_A i$ et $z_B = x_B + y_B i$ et $z_C = x_C + y_C i$ les affixes des points A et B et C avec $z_A \neq z_C$

- $AB = |z_B - z_A| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

- $\left| \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \right| = \frac{AB}{AC}$ donc si on a $\left| \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \right| = \frac{AB}{AC} = 1$ alors le triangle ABC est isocèle en A .

f. Application :

Soient A($z_A = 1+i$) ; B($z_A = -1+i$) et C($z_C = 3i$) trois points du plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Calculer les longueurs des côtés du triangle ABC .

2. En déduit la nature du triangle ABC .

Correction :

1. les longueurs des côtés du triangle ABC :

on a ;

- $AB = |z_B - z_A| = |-1+i - (1+i)| = |-2| = 2$.

- $AC = |z_C - z_A| = |3i - (1+i)| = |-1+2i| = \sqrt{5}$.

- $CB = |z_B - z_C| = |-1+i - 3i| = |-1-2i| = \sqrt{5}$

2. la nature du triangle ABC :

on a : $CB = AC = 2$ d'où : le triangle ABC est isocèle en C.

g. Propriétés du module d'un nombre complexe :

$ z = -z = z = \bar{z} $	$ z + z' \leq z + z' $	$ z = 0 \Leftrightarrow z = 0$
$\left \frac{1}{z'} \right = \frac{1}{ z' } ; \left \frac{z}{z'} \right = \frac{ z }{ z' } \quad (z' \neq 0)$	$ z \times z' = z \times z' $	$ z^p = z ^p, p \in \mathbb{Z} \text{ et } z \neq 0$

h. Application :

- $|1+i| = |-1-i| = |1+i| = \sqrt{2}$ et $|(1-i) \times (2+3i)| = |1-i| \times |2+3i| = \sqrt{2} \times \sqrt{13} = \sqrt{26}$.

- $\left| \frac{1+i}{2} \right| = \frac{|1+i|}{|2|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $|(1+i)^6| = |1+i|^6 = (\sqrt{2})^6 = 8$ et $|-i+i| \leq |-i| + |i| \Leftrightarrow 0 \leq 1+1$.

i. Exercice :

Calculer les modules des nombres complexes suivants :

- $z_1 = -5 + 3i$ et $z_2 = 4i(-2+3i)$ et $z_3 = 1+i\sqrt{3}$ et $z_4 = 5+i5\sqrt{3}$.

- $z_5 = \frac{7}{1-i\sqrt{3}}$ et $z_6 = \frac{4(1+i)}{2i(-5-i5\sqrt{3})}$ et $z_7 = \frac{4(1+i)^2}{2i(-5-i5\sqrt{3})^2}$.




VI. Argument d'un nombre complexe non nul $z = x + yi$:

a. Activité :

Le plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$. $M_{(z)}$ avec $z = 2 + 2i$

1. Construire le point M dans le plan complexe (P) .

2. Donner une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$, puis toute les mesures .



b. Vocabulaire :


- $\frac{\pi}{4}$ est une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$, on l'appelle aussi argument du nombre complexe $z = 2 + 2i$
- Aussi toute mesure parmi les mesures $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$; ($k \in \mathbb{Z}$) de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ est appelé aussi argument du nombre complexe non nul $z = 2 + 2i$.
- Argument du nombre complexe non nul $z = 2 + 2i$ est noté $\arg(z) \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ $[2\pi]$ ou $\arg(2 + 2i) \equiv \frac{\pi}{4}$ $[2\pi]$.
- En général si $z \in \mathbb{C}^*$ et $(\vec{u}, \overrightarrow{OM}) \equiv \alpha$ $[2\pi]$ on écrit $\arg(z) \equiv \alpha$ $[2\pi]$ ou encore $\arg(z) = \alpha + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$.
- On préfère de prendre $\alpha \in]-\pi, \pi]$ (c.à.d. la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ avec $M \neq O$.
- Le nombre complexe non nul $z = 0$ n'a pas d'argument ($\overrightarrow{OM} = \vec{0}$ d'où l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ n'est pas déterminé) .

c. Définition :

$M_{(z)}$ ($M_{(z)} \neq O$ donc $z \neq 0$) est un point du plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$.

Toute mesure α de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ s'appelle argument du nombre complexe non nul z .


On note : $\arg(z) = \alpha$ $[2\pi]$; d'où $\arg(z) \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ $[2\pi]$ ou $\arg(z) = \alpha + 2k\pi$; $k \in \mathbb{Z}$



d. Remarque :

- $z = a > 0$ alors $\arg(z) \equiv 0 [2\pi]$ et $z = a < 0$ alors $\arg(z) \equiv \pi [2\pi]$.
- $z = bi$; $b > 0$ alors $\arg(z) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ et $z = bi$; $b < 0$ alors $\arg(z) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]$.
- $\arg(-z) \equiv \pi + \arg(z)[2\pi]$ et $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z)[2\pi]$ (sans oublier $z \neq 0$).

e. Exemples :



f. Exercice :

1. Dans le plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(0, \vec{u}, \vec{v})$ construire les points suivants : $M_1(z_1=2)$ et $M_2(z_2=-3)$ et $M_3(z_3=2i)$ et $M_4(z_4=-3i)$ et $M_5(z_5=1+i)$ et $M_6(z_6=1-i)$ et $M_7(z_7=2+2i)$ et $M_8(z_8=-1-i)$.
2. En déduire les arguments des affixes des points précédents.

g. Propriétés des arguments :

z et z' deux complexes non nuls	
$\arg(z \times z') \equiv \arg z + \arg z' [2\pi]$	$p \in \mathbb{Z} ; \arg(z^p) \equiv p \times \arg z [2\pi]$
$\arg\left(\frac{1}{z'}\right) \equiv -\arg z' [2\pi]$	$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z' [2\pi]$
Si $k > 0$ alors $\arg(kz) \equiv \arg(z) [2\pi]$	Si $k > 0$ alors $\arg(kz) \equiv \pi + \arg(z) [2\pi]$



h. Application :

Argument des nombres complexes suivants : $z_1 = 1+i$ et $z_2 = 4i(1+i)$ et $z_3 = (1-i)$ et $z_4 = (1-i)(1+i)^8$

- $\arg(1+i) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

- $\arg(4i(1+i)) \equiv \arg(4i) + \arg(1+i) [2\pi]$ et $\arg(1-i) \equiv \arg(1+i) [2\pi]$
 $\equiv \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} [2\pi]$
 $\equiv -\arg(1+i) [2\pi]$
 $\equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$
 $\equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$

- $\arg(4i(1+i)) \equiv \arg(4i) + \arg(1+i) [2\pi]$ et $\arg((1-i)(1+i)^8) \equiv \arg(1-i) + \arg(1+i)^8 [2\pi]$
 $\equiv \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} [2\pi]$
 $\equiv -\frac{\pi}{4} + 8\arg(1+i) [2\pi]$
 $\equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$
 $\equiv -\frac{\pi}{4} + 8 \times \frac{\pi}{4} [2\pi]$
 $\equiv -\frac{\pi}{4} + 2\pi [2\pi]$
 $\equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$

VII. écriture trigonométrique (forme trigonométrique) D'un nombre complexe non nul :

a. activité :

Le plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v}) .

- On considère un nombre complexe non nul z et le point M d'affixe z (donc $M \neq O$).
- On pose $\arg(z) \equiv (\vec{i}, \vec{OM}) \equiv \alpha [2\pi]$.
- (C) est le cercle trigonométrique lié au repère (O, \vec{u}, \vec{v}) coupe la demi droite $[O, M]$ au point M_0 de coordonnées $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ donc l'affixe de M_0 est $z_0 = \cos \alpha + i \sin \alpha$.
- On a les points O et M_0 et M sont alignés et les vecteurs \vec{OM} et \vec{OM}_0 ont même sens d'où $\vec{OM} = k \vec{OM}_0$ avec $k > 0$ (car $M \neq O$).
- Affixe du vecteur \vec{OM} est $z = x + yi$ et du vecteur \vec{OM}_0 est $z_0 = \cos \alpha + i \sin \alpha$.
- Puis que : $\vec{OM} = k \vec{OM}_0$ avec $k > 0$ (car $M \neq O$) donc $z = kz_0 \Leftrightarrow x + yi = k(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ (1).
- On détermine k : on a $z = kz_0$ d'où : $|z| = |kz_0| \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = |k| |z_0| \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = |k| = k$.
- On obtient : (2) : $k = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- D'après (1) et (2) on obtient la relation $z = x + yi = \sqrt{x^2 + y^2} (\cos \alpha + i \sin \alpha) = |z| (\cos \alpha + i \sin \alpha)$.

b. Vocabulaire :

L'écriture : (3) : $z = |z| (\cos \alpha + i \sin \alpha)$ s'appelle la forme (ou l'écriture) trigonométrique du nombre complexe non nul $z = x + yi$.

c. Définition et propriété :

Soit $z = x + yi$ un nombre complexe non nul tel que $\arg(z) = \alpha [2\pi]$ et $r = |z|$.

• Le nombre complexe non nul z s'écrit de la forme suivante : $z = |z|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ ou

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} (\cos \alpha + i \sin \alpha) \text{ ou } z = [|z|, \arg(z)] = [r, \alpha].$$

Chaque écriture précédente est appelé la forme (ou l'écriture) trigonométrique du nombre complexe non nul $z = x + yi$.

d. Application :

On donne la forme (ou l'écriture) trigonométrique :

$$\bullet z_1 = 2 = 2(1 + 0i) = 2(\cos 0 + \sin 0) = [2, 0]. \quad z_2 = -5 = 5(-1 + 0i) = 5(\cos \pi + \sin \pi) = [2, \pi].$$

$$\bullet z_3 = 7i = 7(0 + i) = 7\left(\cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2}\right) = \left[7, \frac{\pi}{2}\right].$$

$$\bullet z_4 = -\frac{3}{5}i = \frac{3}{5}(0 - i) = \frac{3}{5}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = \left[\frac{3}{5}, -\frac{\pi}{2}\right].$$

$$\bullet z_5 = 1 + i = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = \sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right) = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right].$$

e. Remarque :

• $z = a > 0$ alors $z = [a, 0]$, $z = a < 0$ alors $z = [-a, \pi]$.

• $z = bi$; $b > 0$ alors $\left[b, \frac{\pi}{2}\right]$, $z = bi$; $b < 0$ alors $\left[b, -\frac{\pi}{2}\right]$.

• Si $z = [r, \alpha]$ alors $-z = [r, \pi + \alpha]$ et $\bar{z} = [r, -\alpha]$ et $-\bar{z} = [r, \pi - \alpha]$.

f. Application :

$$\bullet \text{exemple : } z = 3 = [3, 0] \text{ et } z = -3 = [3, \pi]. \quad z = 3i = \left[3, \frac{\pi}{2}\right] \text{ et } z = -3i = \left[3, -\frac{\pi}{2}\right].$$

$$\bullet \text{exemple : on a : } z = 1 + i = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right] \text{ alors } \bar{z} = \left[\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right] \text{ et } -z = \left[\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4} + \pi\right] = \left[\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}\right].$$

$$\bullet \text{cas particulier : } 1 + i = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right] \text{ et } 1 - i = \left[\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right] \text{ et } z_3 = 1 + i\sqrt{3} = \left[2, \frac{\pi}{3}\right] \text{ et } z_4 = 1 - i\sqrt{3} = \left[2, -\frac{\pi}{3}\right].$$

VIII. Opérations sur les formes trigonométriques :

a. Activité :

z et z' deux complexes non nuls tel que :

$$z = [r, \alpha] = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) \text{ et } z' = [r', \alpha'] = r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha').$$

• Le produit de $z \times z'$:

On a :




$$\begin{aligned}
 z \times z' &= r(\cos \alpha + i \sin \alpha) \times r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha') \\
 &= rr'(\cos \alpha \cos \alpha' + \cos \alpha \sin \alpha' + i \sin \alpha \cos \alpha' + i \sin \alpha \sin \alpha') \\
 &= rr'(\cos \alpha \cos \alpha' - \sin \alpha \sin \alpha' + i(\cos \alpha \sin \alpha' + \sin \alpha \cos \alpha')) \\
 &= rr'(\cos(\alpha + \alpha') + i \cos(\alpha + \alpha')) \\
 &= [rr', \alpha + \alpha']
 \end{aligned}$$

b. Propriété :

z et z' deux complexes non nuls tel que :

$z = [r, \alpha] = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ et $z' = [r', \alpha'] = r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')$ on a :

Les opérations	$z = [r, \alpha] = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, $z' = [r', \alpha'] = r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')$
Produit : $z \times z'$	$z \times z' = [r, \alpha] \times [r', \alpha'] = [r \times r', \alpha + \alpha']$ ou $z z' = r(\cos \alpha + i \sin \alpha) \times r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')$ $= rr'(\cos(\alpha + \alpha') + i \sin(\alpha + \alpha'))$
Produit : $\underbrace{z \times z \times \dots \times z}_{n \text{ fois}} = z^n$	$z^n = [r, \alpha]^n = [r^n, n\alpha]$ $z^n = (r(\cos \alpha + i \sin \alpha))^n = r^n(\cos n\alpha + i \sin n\alpha)$ Cas particulier $r = 1$: $[1, \alpha]^n = [1^n, n\alpha] = [1, n\alpha]$ ou encore $(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = (\cos n\alpha + i \sin n\alpha)$ formule de MOIVRE
Formule de MOIVRE	Données clés <u>26 mai 1667</u> <u>Vitry-le-François (France)</u> <u>27 novembre 1754</u> (à 87 ans) <u>Londres (Angleterre)</u> Angleterre <u>Français</u> <u>Mathématiques</u> <u>Royal Society</u> <u>Académie de Saumur</u> <u>Formule de Stirling</u> <u>Théorème de Moivre-Laplace</u> - <u>Formule de Moivre</u>  Abraham de Moivre en 1736
Inverse	$\frac{1}{z'} = \frac{1}{[r', \alpha']} = [r', -\alpha']$ ou $\frac{1}{z'} = \frac{1}{r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')} = \frac{1}{r'}(\cos(-\alpha') + i \sin(-\alpha'))$
Quotient	$\frac{z}{z'} = \frac{[r, \alpha]}{[r', \alpha']} = \left[\frac{r}{r'}, \alpha - \alpha' \right]$ ou $\frac{z}{z'} = \frac{r(\cos \alpha + i \sin \alpha)}{r'(\cos \alpha' + i \sin \alpha')} = \frac{r}{r'}(\cos(\alpha - \alpha') + i \sin(\alpha - \alpha'))$

c. Remarque :

Si $z = [r, \alpha] = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ alors :

- ❖ $-z = -1 \times z = [1, \pi][r, \alpha] = [r, \alpha + \pi] = r((\cos(\pi + \alpha) + i \sin(\pi + \alpha)))$.
- ❖ $\bar{z} = \overline{r(\cos \alpha + i \sin \alpha)} = r(\cos \alpha - i \sin \alpha) = r(\cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha)) = [r, -\alpha]$.